





14243/B D. IV. b₁₈

4 plates + folding
table

£1. 15s

£123

6 at 7b-136

PHILIPPI ADOLPHI BOEHMERI
MEDICINAE DOCTORIS EIVSDEMQUE ET
ANATOMIAE PROFESSORIS IN REGIA
FRIDERICIANA PVBLICI ORDINARIII
IMPERIAL. ACADEM. NATVR.
CVRIOS. COLLEGAE

INSTITVTIONES
OSTEOLOGICAE

IN
VSVM PRAELECTIONVM
ACADEMICARVM

CVM
ICONIBVS ANATOMICIS.



HALAE MAGDEBVRGICAE
IN OFFICINA LIBRARIA RENGIERIANA.

M D C C L I



V I R O
I L L V S T R I S S I M O
A T Q V E
E X C E L L E N T I S S I M O
D O M I N O
C A R O L O
L V D O L P H O
S. R. I. LIBERO BARONI
DE DANCKELMANN
DYNASTAE IN LODERSLEBEN OPHAVSEN
ROGENHORST STEINRADE
CETERA
POTENTISSIMO BORVSSORVM
REGI AB INTIMIS STATVS
MINISTERIIS
NEC NON
A SANCTIORIBVS REI PVBLICAE
BELLICAEQVE CONSILIIIS
VT ET
CONSISTORII IN TERRIS PRVSSICIS
SVPREMI CAVSSARVMQVE GALLICARVM
CIVILIVM ET ECCLESIASTICARVM
GVBERNATORI

NEC MINVS
DIRECTORII TEMPLI CATHEDRALIS
PRAESIDI
ACADEMIARVM OMNIVM
SCHOLARVMQVE
BIBLIOTHECAE REGIAE TECHNOPHYLACII
AC NUMOPHYLACII REGII
CVRATORI SVPREMO

IVSTITIAE AC LITERARVM STATORI
DOMINO SVO
INDVLGENTISSIMO

VITAM ET SALVTEM

PHILIPPVS ADOLPHVS BOEHMER,



x quo tempore, IL-
LVSTRISIME
DOMINE, ad
gratiam clientelamque
TVAM adspirare felici mi-
hi concessum fuit, tanta me
indulgentia prosequi haud
dedignatus es, vt auden-
dum existimauerim, tenue
hocce opusculum, tanquam
exiguum humillimi cultus
pignus, TIBI deuotissima
mente offerre. Quamquam

me, hoc officium praestare cupientem, ipsius libelli tenuitas, et argumenti, quod tractavi, ratio ab hoc consilio fere reuocarent; istius tamen a veneratione proficiscentis fiducia veniam ab insigni, quo liberales artes omnes complecteris et tue- ris, fauore eo facilius me impetraturum confido, quod magis meum esse agnosco, demandati muneris cona- tuumque, quibus REGIAE FRIDERICIANAE ciuibus per decennium inferuire contendi, rationes TIBI explicare, DOMINE IN- DVLGENTISSIME. Et

CU

cui potius me meaque literarum studia commendarem, quam TIBI, GRATIOSE MAECENAS, qui in iisdem iuuandis et protegendis dudum propensum declarasti animum. Itaque pro ea, qua soles, benignitate suscipias, obsecro, perexiguum libellum, qui ab ILLUSTRISSIMO NOMINE TVO tutelam et commendationem sibi pollicetur, cum TE Academiae flori tuendo, totiusque rei literariae incrementis promouendis, POTENTISSIMI ET SAPIENTISSIMI REGIS praeesse ius-

fit auctoritas. Quod ergo
felicitatis publicae caussa si-
mul precor, SUPREMVV
NVMEN TE saluum fospi-
temque seruet quam diutis-
sime, et ILLVSTRISSI-
MAM GENTEM DAN-
CKELMANNIANAM in
omne aeuum saluam prae-
stet et florentissimam. Ita
vt valeas, DOMINE IN-
DVLGENTISSIME, atque
gratia TVA me in poste-
rum indignum haud iudices,
est, quod omnium maxime
precor deuotissimus. Scri-
psi in REGIA FRIDERICIA-
NA a. d. XVI. Iunii clō MCC LI.

PRAE-

PRAEFATIO.

Artificiosissima corporis humani machina amplissimum solertissimis naturae scrutatoribus aperit campum, ut, quamuis innatum illis sit sciendi desiderium, quicquid tamen ambitu suo complectitur, perfectissime intuendi, nec vitae breuitas, nec limitata mentis cognitio concedant.

Ex tam profundo naturae penu SCELETVM HVMANVM *in praesenti scrutandum et explicandum suscipio.*

Vocabulum ΣΚΕΛΕΤΟΣ antiquissimum est, quo PLVTARCHVS iam usus fuit, quando de Aegyptiorum ritibus, atque ligneis defunctorum simulacris, quae partim in ditiorum aedibus asser-

P R A E F A T I O.

uabantur, partim in conuiuia inferri solebant, loquutus fuit.

Si autem mentem PLVTARCHI rite perspicias atque consideres, vocabulum σκελετός idem ipsi valere, quod νεκρός, si narrata eius compares cum illis, quae in antiquioris Historici HERODOTI scriptis leguntur, si cum B. SCHVLZIO obserues, technicam Sceleti notionem nouam in Graecia fuisse, nullumque exemplum in ullo auctore Graeco, qui ante Alexandri M. tempora scripsit, obuium dari posse; facile inde colligere poteris, nec HERODOTVM nec PLVTARCHVM de Sceleto, quod nostro aeuo sic appellatur, cogitasse.

Tantum itaque abest, ut ex intempestiuo PLVTARCHI interpretis glossemate culturam osteologiae et sceletopoeiae inde comprobare, eam-

P R A E F A T I O.

eamque ad ultimam antiquitatem trahere valeamus; ut potius affirmemus, sic dicta Aegyptiorum sceleta signa mortuorum tantum fuisse, siue imagines funeri per omnia similes, nec ante conditam Alexandriam vlla in Aegypto exstitisse compaginata ossium systemata.

Par quoque ratio est Sceleti, quod ab HIPPOCRATE profectum, inter donaria Apollinis templo illatum fertur. Si enim PAUSANIAM audias, sensumque totius narrationis probe intelligas, constabit, illum omnem de Sceletis exclusisse cogitationem, Sceletumque sic dictum HIPPOCRATICVM nihil aliud fuisse, quam aereum quoddam signum, hominis, ad extremam maciem redacti, imaginem referens.

Nolo autem in diffusum excurrere campum historicum, nec culturam

P R A E F A T I O.

*turam ac vestigia osteologiae hic
prosequi, cum, quae ad stabilien-
dam osteologiae antiquitatem
pertinent, priuatis potius insti-
tutionibus reseruanda iudicem.
Sufficiat, me paucis tantum osten-
disse, antiquissimis temporibus
proprium et technicum scele-
ti sensum adhuc incognitum
fuisse.*

*Iam Tibi B. L. systema ossium
corporis humani sisto, quo, prae-
ter Diuinae maiestatis miseriae-
que tuae contemplationem, reli-
quiarum, post longas fatorum vi-
ces remanentium, sedula indaga-
tione, artis seruandi mortales
certior reddaris, atque cognoscas,
quam necessaria sit firmissimarum
et solidissimarum partium corpo-
ris humani cognitio, sine qua
nemo perfectam eius scientiam si-
bi acquirere potest; quam utilis
et*

P R A E F A T I O.

et proficua, si ad medicinae et philosophiae usum suscipiatur.

Haud ignoro, a pluribus discipulorum absolutiorem hanc anatomiae partem neglectui maxime dari, indeque non mirum, qui fiat, ut, cum caeteris omnibus fundamenti loco inseruiat, eius destituti cognitione parum omnino, difficillimo licet studio, in reliquis proficiant. Quo itaque laborem hunc iisdem iucundum facilioremque redderem, eorumque insimul succurrerem memoriae, has conscripsi INSTITUTIONES OSTEOLOGICAS, quas, si limites compendii forsitan excessisse putent, velim iudicent, me magna Dei opera primis tantum gustasse labiis.

Operam autem maxime dedi, ut summum Dei artificium, quo fundamenta aedificii humani construxit, ususque, quos ossa tam
uni-

P R A E F A T I O.

uniuersa, quam singula, eorumque partes exerunt, breuiter complecterer, insimulque ostenderem, quem ortum habeant? quae indiuerfis eorum conditio? qualis conformatio atque structura? quam mirifice iuncta sint? quis naturalis eorum status? quidue praeter naturam ipsis euenire soleat?

Ducem in conscribendo libello ipsam mihi elegi ossium compagem, pictorum instar, qui ad praesens quoddam obiectum imagines adcurate exprimere conantur. Iconibus etiam non vulgaribus, nec fictis, sed ad naturam exacte delineatis, libellum ornandum curavi, quibus partim, quae ad genesin ossium spectant, illustrantur, partim perfecta quaedam ossa, in nexu nondum rite delineata, exquisite exprimuntur.
Ad-

P R A E F A T I O.

Addidi quoque in fine tabulam, omnes ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ossium species complectentem. Quum enim veteres et recentiores immensum varient, et in quibusdam doctrina de articulationibus confuse proponatur, indeque discentibus labor difficilissimus reddatur; operae pretium esse duxi, constitutas antiquitus articulationum species, adiectis nonnullis, conueniente ordine ad genus summum reducere, easdemque omnes speciali in capite illustrare.

Praeterea, finita cuiusuis ossis descriptione, in quantum licuit, musculorum principia et insertiones indicaui, quo discentibus potissimum via ad myologiam monstretur, ipsique adspectu meorum praeparatorum, et in sceletis exsiccatorum musculorum, vel ad praelectiones myologicas praepararen-

P R A E F A T I O.

rentur, vel, quae in recentibus cadaveribus iam demonstrata fuerunt, ex parte in animum rursus reuocent.

Tandem vero, quo summa huius doctrinae utilitas in foro etiam practico pateret, atque cognosceretur, quam proficua maxime sit ad medicinae praxin et ossium vitiatorum, fractorum, et luxatorum curationem; diuersas hinc inde adieci cautelas et observationes practicas.

Omnia igitur eo intueamur animo, opto, ut exinde mortis faciem quam longissime euitare discamus, aduentantem nec optemus, nec timeamus, donec rerum omnium creator, sceleta nostra terrae reddita, nouis inductis musculis integumentisque, nec non inspirata anima, viuificabit.

EX-



EXPLICATIO LITERARVM

TABVLAE I.

FIG. I. et II. *caput embryonis IV. fere mensium praeparatum diuersis sistunt superficibus.*

FIG. I.

- a. Pars capitis altissima gibbosa cum fonte pulsatili.
- b. Structura ossis frontis.
- c. Os bregmatis eiusque punctum ossificationis.
- d. Posterior CASSERII fontanella.
- e. Interstitium membranaceum, defectum ossificationis ossis occipitis ex parte indicans.

Reliquorum ossium v. g. squamosi & quorundam

rundam faciei, ipsius quoque maxillae inferioris structura, nec non imperfectus orbitae status, cuius plana & vnguis ossa adhuc membranacea sunt, in quantum lateralis figurae delineatio permittit, in oculos statim incidunt.

FIG. II.

posteriore et inferiore facie, partim in punctis

f.f.f. defectum ossificationis, partim

g.g.g.g. quatuor distinctas ossis occipitis partes, partim

h.h. ossa squamosa, et cum quovis iunctum annulum, inque illo extensam tympani membranam, nec non transparentem maiorem mallei processum indicat.

His in nexu accessit delineatio maxillae inferioris, in medio distinctae, totius palati et ossis sphaenoidalis adhuc imperfecti, ac frustatim exterius tantum conspiciendi.

FIG. III.

anterius repraesentat sceleton embryonis sex circiter hebdomadam.

Incrementum corporis cum fiat statis-
tem-

temporibus, ita imperfectum huius sceleti
 statum et incrementi primordia tam ex
 praesenti, quam reliquis figuris optime il-
 lustrare valemus. Obseruamus autem in
 sceleto, FIG. III. expresso, maximam capi-
 tis partem membranaceam; anterius os
 frontis bifidum, orbitas membranaceas,
 superioris autem faciei ossa et maxillam
 inferiorem ex parte perfectiora; corpora
 spinae dorsii, exceptis punctis ossificatio-
 nis albicantibus anterius adparentibus, et
 posterioribus incipientibus partibus latera-
 libus, mere cartilaginea; arcus costarum
 osseos circa extrema cum osse pectoris
 membranam crassam aemulari; ilii ossa,
 exceptis marginibus, ischii et pubis ossibus,
 utpote cartilagineis, perfectiora esse; epiphy-
 ses omnes, patellas, carpum et tarsum vtrim-
 que ad cartilagineas figura et natura acce-
 dere; scapulas uero ex parte, clauiculas,
 omnia ossa fistulosa, exceptis eorum extre-
 mitatibus, naturam iam induisse osseam. Sed
 omnia haec voce quauis literisque clarius
 explicabunt oculi, praecipue si non mi-
 rabilem tantum totius sceleti compositio-
 nis rationem in compendio quasi intue-
 aris, verum capitis diuerso situ separatim
 delineati adspicias partes. Nimirum



FIG. IV.

caput quoad maximam partem *superius*
posterius, inferiusque

i. membranaceum sistit.

FIG. V.

inferiore superficie quatuor repraesentantur
ossis occipitis portiones, quarum

k. maximam exprimit;

reliqua frustra tam ad os occipitis, quam
sphaenoidis pertinent, ossiumque squamo-
forum primordia, nec non partes quasdam
maxillarum et palatinorum ossium indicant.

Quam celeri autem passu natura ad ex-
tensionem partium progrediatur, reliquae,
quae ordine ac numero sequuntur, probant
figurae. Vix enim octo dies crescendo
implevit conceptus embryo, quem ses-
quimensis dextra tenet, vel qui a mem-
branis et liquore amnii tanquam in maiori
ouulo adhuc reclusus, atque sceleti mani-
bus ope capillorum adfixus haerens,
vtraque facie repraesentatur. Ex his

FIG. VI.

eiusmodi embryonis structuram ostendit,
et quidem quoad

l. caput et truncum, nec non

** distinctas extremitates, ac

m. funem vmbilicalem cum circumuoluta circa illum portione chorei amniique. Quo autem praedicti *oui foecundati* structuram probe perspicimus,

FIG. VII.

exquisita cura delineatam exhibet *superficiem vesiculae oblongae, in qua parvus conceptus continetur, superiorem ac posteriorem.*

n. n. Villosa ipsius superficies cum

o. placenta, quae vtero contigua fuit.

FIG. VIII.

anterius circa peripheriam eiusdem vascula ante oculos ponit; pars reliqua pellucida membranam tenuissimam, ac per illam

p. transparentem liquorem, praesertim

q. embryonem, atque

r. placentam cum fune vmbilicali distincte exprimit.

EXPOSITIO LITERARVM

TABVLAE II.

Qui huius *trimestris embryonis* ossa comparabit cum sceleto, TAB. I. FIG. III. delineato, obseruabit, illum a praesenti pro ratione aetatis duplo maiori superari proportionem et magnitudine, haud multum tamen quibusdam in partibus ossificatione differre hinc successiuam tacitamque quasi esse naturae in perficiendo corporis aedificio progressum. Necesse autem fuit hunc delineare sceletum, quo generalis omnium naturaliter sibi vnitorum ossium compages clarius perspiceretur. Singula vero ossa literis designare superfluum duximus, quum eadem hic notanda, quae iam in explanatione TAB. I. FIG. III. praemisimus. Interea

FIG. I.

- a. distincte indicat fontem pulsatilem, e
- b. b. b. puncta ossificationis vertebrarum spinae dorsi paullulum maiora.

FIG. II.

ostendit structuram imperfectam eiusdem sceleti a facie posteriore.

c. De

- c. Defectus quidam ossificationis inter bregmatis et occipitis ossa, in quo nasci solet ossiculum Wormianum.
- d. Punctum ossificationis ossis occipitis.
- e. e. Laterales totius canalis ossei partes, quarum in explicatione generali TAB. I. FIG. III. mentionem fecimus, a se inuicem distantes, et membrana unitae,
- f. f. Posteriora costarum extrema imperfecta.

Scapulae hic conspicuae structura parum differunt ab illis, quae in delineatione scheleti embryonis sesquimensis TAB. I. FIG. III. exprimi non potuerunt. Etenim cavitatis cuiusvis infraspinata tenuissima est, inque illa defectus ossificationis adhuc obseruatur; margines uero, in primis posterior, angulique, atque processus adhuc cartilaginei sunt.

DESCRIPTIO FIGVRARVM

TABVLAE III.

quibus diuersa ossa ratione internae et externae structurae in statu ossium perfecto et imperfecto repraesentantur.

b 4

FIG.

FIG. I.

*ostendit portionem ossis femoris adulti
hominis dissectam, praeprimis disse-
rentem illius crassitiem*

g. in superiore et

h. media trunci parte, nec non

i. lamellas osseas perpendiculares, sibi
inuicem contiguas.

Versus extremitatem superiorem adparet

k. substantia reticularis et spongiosa;
in media autem cauitate, pro medulla septis
non nunquam diuisa,

l. tunica interior corrugata, et

m. hinc inde perforata.

Idem nobis intueri licet in

FIG. II.

utpote quae non externam solum por-
tionis ossis femoris structuram, ve-
rum etiam interioris eiusdem sub-
stantiae rugosae, diuersis forami-
nulis pertusae, fibrasque reticula-
res osseas emittentis texturam per-
spicue tradit.

FIG.

FIG. III.

n. n. n. *externam linearem, et versus extrema porosam designat tibiae foetus maturi structuram.*

o. o. *Loca distinctionis et accretionis epiphygium cum trunco tibiae.*

p. p. *Extremitates adhuc cartilagineae.*

FIG. IV.

internam eiusdem ossis, secundum longitudinem diuisi, demonstrat texturam.

q. q. *Interna cartilaginea epiphygium substantia.*

r. r. r. *Diuerfa ossis in medio et extremis crassities.*

s. *Interior spongiosa et reticularis textura.*

t. *Cauitas tibiae media.*

FIG. V.

Superficiem externam ossis bregmatis perfecti foetus adumbrat.

v. *Punctum albicans centrale siue ossificationis.*

w. Squamulae siue bracteae sibi inuicem incumbentes.

x. x. Fibrae osseae, quae instar radiorum ad peripheriam ossis feruntur.

FIG. VI.

internam eiusdem ossis concavam superficiem indicat, in qua

y. y. diuersa fibrarum, lamellas componentium, adparet longitudo, nec non

z. punctum ossificationis, circa quod exigua conspiciuntur foraminula.

ILLVSTRATIO FIGV-
RARVM

TABVLAE IV.

FIG. I.

os squamosum coniunctum cum petroso et tuba EVSTACHII, tympanum eiusque contenta, nec non iunctum ipsi labyrinthum, exquisita cura in *dextro osse temporum pueri aliquot annorum* praeparata, a facie interna exhibet. Idem quodammodo adumbrasse videtur, omisfis nonnullis additisque musculis, CAECILIUS FOLIVS

FOLIVS in *noua auris internae delineatione*: interea figuram illius a nostra cum ratione situs et praeparationis, tum etiam intuitu ossiculorum, reliquorumque connexarum, etsi minimarum, haud infimae tamen utilitatis, sed scitu maxime necessariorum partium differre, illi optime diiudicabunt, qui sublimiori et subtiliori anatomiae se tradere, opus in re medica non superfluum, sed iucundum, utile et necessarium esse ducunt. Ne vero copiosis literis vivae huius figurae delineatio obnubilatur, praecipua paucis attingam.

- a. a. Margo ossis squamosi semicircularis internus et externus, interstitium et distantiam laminae internae ab externa determinans. Reliqua interna huius ossis superficies leuiter concava eminentias et impressiones, a gyris cerebri factas, nec non sulcum pro arteria durae matris monstrat.
- b. Portio petrosae partis, mediante qua os temporum osi bregmatis et occipitis iungitur.
- c. Tympani cavitates, ad
- d. sinuositatem mammillarem usque aperta, quo eo melius membranae tympani internam superficiem, eiusque firmam cum
- e. pro-

- e. processu mallei maiore cohaesione, reliquorum ossiculorum inter se nexum, atque omnes eorum partes, immo
- f. processus Rauiani situm rite intueri valeamus. Vbi crus tenue longumque incudis mediante orbiculari ossiculo apicem stapedis recipit, chorda tenuis albicans, infra canalem semicircularem externum e proprio canalis, in posteriore cavitatis tympani parte siti, ostiolo, distincte hic conspiciendo, prouenit, tendinemque musculi stapedis ad apicem illius progredientem indicat. Crura stapedis ultra dimidiam partem tantum protuberant; delineatio enim labyrinthi in coniunctione cum tympano impedit, quo minus basis stapedis, foramini ouali adhuc insistens, et fenestra rotunda exprimi potuerint. Iam ordine sequitur tam
- g. canalis osseus pro musculo EVSTACHII, quam
- h. tuba EVSTACHII cartilagineo membranacea, cuius orificium amplum ad fauces directum, angustius vero parti posteriori canalis ossei adnexum est.

Inter labyrinthi partes referimus canales
femicirculares

i. superiorem,

k. inferiorem,

l. externum,

uti et

m. cochleam, ac

n. vestibulum, lamina ossea adhuc te-
ctum.

Meatum auditorium internum ingreditur

o. portio mollis et crassa,

p. dura ac tenuis.

FIG. II.

*praecipue membranae tympani tensionem
in osse temporum adulti hominis mon-
strat.*

Quoniam directio meatus ossis externi in
adultis non sit rectilinea, sed quodam-
modo flexuosa, opus fuit, parietem qui a
media et inferiore extremitate provenit,
separare. Obseruamus igitur

q. tympani membranam arcte fulco et
apici processus mallei maioris trans-
parentis adhaerentem, ac in centro,
ubi radii sonori concurrunt, ab ipso
retra-

retractam, binasque meatus extremitates,

- r. anteriorem et superiorem, nec non
- s. posteriorem et superiorem, quatenus exterius productae ad formationem canalis externi auditorii conferunt.

FIG. III.

os temporum foetus sex circiter mensium ab externa facie sistit.

- t. t. Os s. squamosi externa superficies et structura.
- v. Processus zygomaticus, infra cuius radicem
- w. cavitas cernitur, mobilitati maxillae inferioris inseruiens.

Extremitas annuli

- x. anterior et superior,
- y. posterior et superior.
- z. Punctum ossificationis processus styloidei.
- A. Processus styloides annulo subiacens.
- B. Tympani membrana sulco annuli laxae cohaerens.

C. Spu-

C. Spuria lamella tympani membranam obducens.

D.D. Pars petrosa.

FIG. IV.

praecedentis ossis partes in genere, in specie vero

" crassam membranam, a

** tympani membrana separatam et revolutam distincte exprimit.

FIG. V. et VI.

os ethmoidale completum duplici facie repraesentant.

FIG. V.

E. E. laminam quidem perforatam,

F. cristam galli, et praeter ossa plana, nonnihil lateraliter adparentia,

G. G. processus minores, siue posteriores, fibris osseis ossi adunatos, eorumque superficiem, sinibus ossis sphaenoidalis incumbentem, patefacit.

Parte ossis vero narium caua replente et augente

FIG. VI.

H. septum osseum, et

I.I. cir-



I. I. circumuolutiones ossium turbina-
torum superiorum, nec non laxum

K. K. processuum posteriorum ope fi-
brillarum cum iisdem nexum de-
lineat.

FIG. VII.

*connexionem ossis ethmoidalis cum sphae-
noidali*, ab EVSTACHIO obscure ex-
pressam, adcurate ostendit. Superfluum
autem foret, omnia hic indicare velle,
quae externa ossis multiformis facies ex-
hibet, cum intuitu ossis ethmoidalis par-
tim adnotata in FIG. V. et VI. huius
tabulae huc quoque referenda sint, par-
tim ossi sphaenoidali tantum illustratur,
quomodo processus ossis ethmoidalis po-
steriores, tanquam officula minima tur-
binata, cum illo proprie cohaereant. In
coniunctione itaque binorum ossium con-
spicimus

L. L. processus posteriores ossis cribro-
si, sinibus ossis sphaenoidalis natura-
liter incumbentes.



FIG. I.




FIG. II.




FIG. III.




FIG. VI.




FIG. VII.




FIG. VIII.



FIG. IV.



FIG. V.



FIG. I.





FIG. II.











FIG. III.





caussarum mouentium, motus excitentur, peragantur, determinantur.

§. II.

Earum divisionis.

Ex his *molliores* ad *sarcologiam* pertinent, reliquae vero, vel *rigidiores*, vel *mediae consistentiae*, ad *ossium recensitum* et *exsiccatorum* contemplationem referuntur, adeoque pro praesenti instituto adcuratori scrutinio, missis prioribus, ad examen physico-anatomicum reuocandae sunt.

§. III.

Compositio ex diuersis fibris.

Solida corporis humani *corpuscula* componuntur ex *fibrillis*, vel membranaceis vel osseis, mutuo nexu sibi inuicem iunctis et intertextis. *Fibrae*, quas visus attingit, in vniversum referunt lineas cum modica latitudine, et in duo genera diuidi solent. *Priorum* particulae elementares in linea perpendiculari vicinis parallelae iacent, minoresque maioribus lineares existunt, teste ossium, musculorum, ligamentorum, tendinumque inspectione: *posteriorum* vero latitudo maior cum minori longitudine iuncta est, iisdemque, pro ratione modi compositionis diuersaeque directionis, vel lata plana, vel coni et cylindri fiunt

§. IV.

§. IV.

Maior minorue partium soliditas ab arctiori vel laxiori particularum cohaesione oritur. Quo propius itaque corpuscula ad se inuicem accedunt, eo firmitus cohaerent ; hinc fibram osseam rigidamque ex compacta et intima molecularum sibi inuicem contiguarum et speciei propriarum adunatione fieri obseruamus. Magis vero a se inuicem recedentia minuunt puncta contactuum, ossaque leuiora, flexilia, et infirmiora reddunt ; vtraque tamen ad stabilitatem et leuitatem corporis, variosque motus exercendos atque determinandos aptissima et necessaria sunt.

Differentia fibrarum ossearum pro ratione cohaesionis particularum.

§. V.

Horum cognitionem discimus in *ὀσσεολογία*, quae scientia de ossibus in genere vocatur. In specie *osteologia corporis humani* scientiam humanorum ossium complectitur, atque vi definitionis cognitionem modi generationis structurae, situs, figurae, nexus, ususque exposcit theoretico-practicam.

Osteologia quid?

§. VI.

Obiectum itaque *osteologiae corporis humani* ossa humana sunt (§.V.), quae

Illius obiectum.

vel *exsiccata*, vel *recentia*, *adultorum* et *infantum*, firmissimas, maxime stabiles, albicantes, sensus expertes, variisque ex lamellis, perreptantibus hinc inde neruulis vasculisque, artificiosissime contextas corporis denotant partes.

§. VII.

Utilitas of-
fium.

Fulcimenta corporis vocantur, quum ob basin atque firmitatem, quam corpori praestant (§. VI.), mollia defendant, robori inferuiant, ad staturam speciemque constantem toti corpori praestandam conferant, atque motibus figuratis certis edendis, formandis receptaculis, cauitatibus et meatibus, pro particulari vsu diuersis, aptissima sint.

§. VIII.

Divisio in
perfecta et
imperfecta.

Sunt autem vel *perfecta* vel *imperfecta*. *Priora* inuoluunt consensum essentialium omnium (§. VI.), *posteriora* vero indicant defectum, immo dissensum quorundam notabilium, ad completam structuram tam internam quam externam pertinentium.

§. IX.

Cartilagi-
num defini-
tio.

Imperfectis adnumeramus *cartilagineas*, siue partes albicantes, ossibus analogas, flexiles magis et elasticas, particulis

ticulis terrestribus oblongis, politis, interiectis cellulis diuersis, compositas, ad flexibilitatem machinae nostrae absolute necessarias.

§. X.

Flexibilitas in cartilaginibus dependet a figura laeuium et politarum particularum, iusto earum positu et determinato ordine, mediante quo extrema earum, quae certo flexionis gradui respondent, ab inuicem distinctae manent, nec sine continui solutione ac interruptione cedunt. Contrarium in rigidis ossibus notamus, quum earum moleculae ita figuratae sint, ut nec ab inuicem recedere, nec propius ad inuicem accedere queant (§. IV.).

cur ossibus flexiores sint?

§. XI.

Interea *aemulam cum ossibus imperfectis habent naturam* (§. IX.), et in articulis plus minus mobilibus absolute necessariae sunt (§. VII.), ad extensionem debitam perfectorum ossium, succi medullofi collectionem et nutritionem conferunt (§. XCI.), nec non principia generationis ossium spongiosorum (§. XLVIII.), apophysium (§. LXXXIV.), epiphysiumque (§. LXXXIX.) constituunt. Merito itaque ossium doctrina earum comple-

aemula earum cum ossibus natura.

ctitur notitiam; melius in recentioribus, quam exsiccatis ossibus addiscendam, reliquorumque huc pertinentium et ab Anatomicis referri solitorum obiectorum, ligamentorum scilicet, perioestii, medullaeque indagationem exposcit.

§. XII.

Cognitio ossium duplex.

Cognitio ossium est vel theoretica vel practica (§. V.). In theoria denominationis rationem, magnitudinem, situm, figuram, externam conformationem, usum perpendimus; practica vero consideratione interiorem structuram, modum compositionis et unionis examinamus, partes separare et praeparare discimus, separatas rursus unimus; easdemque certo usui destinamus, immo ex ossilegiis, pro ratione vel naturalis vel praeternaturalis conformationis, figurae, magnitudinis, et perfectionis ossium, diuersa artificiose exstruimus sceleta.

§. XIII.

Sceleti notio.

Sceleti notione proprie intelligitur ossium omnium compositorum syntaxis, a σκέλλω arefacio. Improperia vocabuli denominatio competit etiam simulacris vel figuris, cadaueribus emaciatis per omnia similibus, et arte pictorian

ctoria confectis, (per praemissa in praefamine.)

§. XIV.

Naturale dicitur series ossium omnium absque coctione, ablatis tantum integumentis, carnibus, vasculis, membranis, cet. exsiccatorum et per speciei propria vincula inter se adhuc cohaerentium. (TAB. I. FIG. III. et TAB. II. FIG. I. II.) Quum vero eiusmodi praeparatio non in adultis sed illis suscipitur, quorum ossa hinc inde adhuc imperfecta sunt, *naturale* *skeleton imperfectum* quoque adpellari solet.

§. XV.

A coniunctione ossium exsiccatorum, naturali simili, ope filorum metallicorum in adultis suscepta, fit *skeleton artificiale*, aliis quoque *perfectum* (§. VIII), re ipsa vero ob defectum ligamentorum et cartilaginum naturali imperfectius.

§. XVI.

Quamvis autem in *imperfecto ossium statu* ad extruendum eiusmodi aedificium osseum, et conseruationem ligamentorum, sola maceratio, ablatio inutilium, et debita exsiccatio sufficiant; in *perfecto* tamen ossium separationes, magnorum fistulosorum perfora-

Modus praeparandi diuersa *skeleta*.

tiones, maceratio, reiteranda nonnunquam coctio, exsiccatio et repositio in locum situmque naturalem, subiuncta artificiali vnione, institui debent. Totius enim rei cardo in eo vertitur, vt, ablatis omnibus externis internisque, oleum medullosum, et quicquid peregrini adhuc in cellulis cavitatibusque ossium latitat, per poros transfuset, et tam per artificialia, quam naturalia foramina quouis modo expellatur.

§. XVII.

In speciali sceleti humani contemplatione ad differentiam praecipue attendimus, quae intercedit inter *qualitates* et *quantitates ossium*. Per *qualitates ossium*, quae pro indiuidui aetate, et naturali ac praeternaturali constitutione obueniunt, vi definitionis, proprias eorum adfectiones significamus, quatenus ab vnione, figura, pressura, motu concretorum intus corporum, siue substantia oriuntur, temporisque successu mutantur.

Quid qualitates ossium significant?

§. XVIII.

Diuidicamus illas *mutua perfectorum et imperfectorum ossium diuersorum, tam ad interiorem, quam exteriorem texturem, relatione*, qua conuincimur, quomodo hinc inde diuisae partes pro aetatibus

quomodo pro diuersorum ossium relatione diuidi cari possint?

tis et indiuidui ratione concreſcant, aliam naturam et formam induant, ſtrictius laxiusue moueantur, tenuia craſſiora fiant, cartilagineſ et membranae oſſeſcant, ac in vniuerſum oſſa a primo conceptionis momento ad vltimum vitae terminum mutantur.

§. XIX.

Concludimus inde in *ſtatu naturali* ad poſſibilitatem et impoſſibilitatem extensionis partium, nouarum molecularum adpoſitionis, earundem ſub frictionis motu deſtructionis; in *praeternaturali*, iudicamus, cur ſub incuruatura extremae elaeſticae particulae diſtinctae manentes ſine interruptione cedere nequeant? quomodo in fracturis earundem ſolutio fiat, iisdemque vi quadam ad interſtitia inter extrema a latere proxime adiacentia corpuscula adigantur? qua ratione in exfoliatione lamellae ſecedant (§. XXXV.), et quaenam vi loci adfecti pro aetatis ratione, oſſium conſtitutione, laeſionisque gradu, poſſibiles inſtitui poſſint debeantque operationes?

Concluſio ad diuerſas in oſſibus naturaliter et praeternaturaliter poſſibiles mutationes.

§. XX.

Ad *quantitatem* vero oſſium reſpicimus, dum vel numeri, ſiue oſſium multitudinis, vel magnitudinis, ſiue

Reſpectus oſſium ratione quantitatis.

partium multitudinis, in diuersae aetatis sceletis rationem habemus.

§. XXI.

Quid ad cognitionem differentiae ossium in genere requiratur?

Quo itaque *specialia qualitatis et quantitatis in perfectis et imperfectis ossibus obuenientia discrimina* rite intelligantur, opus est inquirere, quae nam a principio ossificationis ad statum perfectionis, illis contingant mutabilia et notabilia?

§. XXII.

Osteogenia quid?

Scientia eorum, quae modum generationis ossium, eorundemque successuum perfectionis statum completur, *osteogenia* vocatur.

§. XXIII.

Ossium inchoamenta.

Stamina totius corporis, quae in animalculo praeexistunt, non excludunt ossium inchoamenta. TAB. I. FIG. VI. Tibi sistit C. L. embryonem octo circiter dierum, VII et VIII vero ouulum impraegnatum eiusdem fere aetatis. In his omnibus partes corporis maiores conspicuae adhibita litterarum explicatione fient clariores: quare Te verbis non morabor, quo tanto diutius adspectui possis immorari.

§. XXIV.

§. XXIV.

Eadem insimul illustrant, quae MAL-
 PIGHIVS ex tam obscuro et profun-
 do naturae penu, collegit, et in demon-
 stratione formationis pulli in ovo opti-
 me inter alios docuit, quomodo sex
 horarum spatio in incubatis gallinae
 ovis cicatricula augeatur, vt disrupto
 folliculo, caput cum adparente verte-
 brarum ordine incipiat erumpere, et
 post integrum diem pullus cum capitis
 et spinae dorsi candido inchoamento,
 inferiora versus recuruo, in colliqua-
 mento, alis crucis in modum exten-
 sis, innatare soleat? nec non quae-
 nam pullo successiuo incremento ad
 gradum perfectionis et exclusionis ex
 ovo accadat mutatio?

MALPIG-
 HII obser-
 uationes cir-
 ca formatio-
 nem pulli in
 ovo.

§. XXV.

*Natura ossium initio fluida est. Flui-
 ditas autem eorum consistit in gelati-
 noso quodam principio, cuius partes
 propriae, leuiter cohaerentes, solubiles
 intermixtas habent particulas. Hanc
 variae ossium testantur solutiones.*
 HAVERSIUS ossa redegit in gelatinam
 per solutionem in aqua forti, eandem-
 que post refrigerationem priorem du-
 ritiam, quamuis fragilem, adsumsisse
 vasisque lateribus instar glutinis adhae-
 sisse

Natura os-
 sium initio
 fluida est.

fisse testatur. Digestor Papinianus ossa emollit. Celeber. ALBINVS ossa in foetu aliquamdiu gelatinosa ac viscosa obseruauit, ipsimetque aliquoties vidi mucosos quasi embryones vnius vel duorum mensium, qui in tepida aqua dissolui incipiebant.

§. XXVI.

*praeexisten-
tes particu-
lae terrestres,
pro ratione
cohaesionis,
ossa plus mi-
nus firmiora
reddunt.*

Quando *particulae terrestres* expulsa interiacente fluiditate, *propius ad se inuicem* propelluntur, compositae ex illis *partes* sensim fiunt *duriores* et *compactiores*, ossa quae (§. IV.) pro cohaesionis ratione vel *duriora*, crassiora et opaca, vel *infirmiora*, pellucida, tenuia, porosa et leuia redduntur.

§. XXVII.

*Qualem ossa
in principio
habeant na-
turam?*

Verum enim vero opus non est, vt ossa omnia initio naturam *cartilagineam*, materiamque generationi cartilaginum aptam referant, quum fistulosa omnia planaue tantum *membranescent*, et iuxta fibrarum directionem citius indurescant (TAB. I. FIG. IV, V.); spongiosa vero a concreto et coagulato spisso succo opaca reddita, tardius perfecta fiant. Patet igitur in genesi ossium diversam illorum iam adparere naturam.

§. XXVIII.

§. XXVIII.

Quo autem *differeus ossium natura*, *interne et externe con-*
 modusque fiendi melius pateat, tam *sideranda*
interna quam *externa* eorum structura *sunt.*
 curatius paululum indaganda erit.

§. XXIX.

Intuitu *externae* texturae ossa variae *Externa eo-*
 magnitudinis et figurae ex *squamulis* la- *rum stru-*
 mellisque diuersimode formari, et suc- *ctura.*
 cessiuis incrementis, teste MALPIGHIO,
 noua fibrarum plana superinduci, quae
 praeexistenti lamellae osseo agglutinata
 succo, debitam molem et firmita-
 tem excitant, satis inter Anatomicos
 constat.

§. XXX.

Modus artificialis naturali aemulus *Illustratio*
 Illustrat squamulas osseas adinuicem *modi compo-*
 colligi similiter, ac tenues laminae ob- *sitionis squa-*
 longae seu quadratae sibi superimponi *mularum.*
 et ita quidem superimponi solent, vt ex-
 teriores vel longiores, latioresque sint
 interioribus, successiue decrefcentibus,
 vel externae pedetentim breuiores
 iant, ac in centro, vbi omnes con-
 currunt, ossis crassitiem augeant, in-
 ternae vero longitudine reliquas
 omnes superent latiusque in perime-
 ro ossis sese extendant.

§. XXXI.

§. XXXI.

definitio lamellarum.

Per *lamellas* siue *bracteas osseas* intelligitur congeries diuersarum fibrarum ossæarum (§. III.), conueniente numero et ordine vnitarum, quarum originem cum MALPIGHIO GAGLIARDI a neruosis filamentis deduxit, easdemque beneficio concrescibilis cuiusdam succi, gypseam habentis naturam, intime sibi inuicem iungi, sicque in solidas lamellas transmutari, affirmauit.

§. XXXII.

Modus generationis diuersorum ossium.

Ex indagine similium suspicari omnino licet, affundi *mollioribus initio fibris peculiarem quemdam succum gypseum*, qui replendo spatia fibras omnes inter se colligit et ossa solidiora, compactiora, grauioraque reddit, qualia sunt *fistulosa et plana*, vel *mucum quemdam*, terrestribus scatentem moleculis, sub generatione et perfectione firmarum partium ita extendi, vt, relictis ope reticularis texturæ cauernulis quam plurimis, exterior insimul pars in solidam abeat substantiam, licet hinc inde porosam, sicque ob immunitam partium cohaesionem (§. IV.) eiusmodi ossa fiant *spongiosa* et reliquis specificè leuiora.

§. XXXIII.

§. XXXIII.

Optime inter alia *modus petrificatio-* Illustratio
ossificationis
per modum
petrificatio-
nis.
nis lignorum ossificationem membrana-
cearum partium illustrat. Filamenta
enim, quae in petrificatione fibrarum
lignearum gypsiue productione primo
tenuissima et crySTALLINA sese pro-
dunt, affuso vltiori succo planorum
contexturam formant. Hinc MAL-
PIGHIVS *ossum* inquit *filamenta cras-*
sa et tendinosa probabiliter e vasis et
praecipue sanguineis, quae frequentia
intercurrunt, percolant osseum illum et
petrificum succum, qui interstitiis af-
fusus et innatans, longo transpiratu so-
lidescit.

§. XXXIV.

Similiter aberrat nonnunquam natu- ossum lapi-
defactio.
ra tam in *ossum lapidefactione*, quo-
rum moles tunc aggregatum esse vide-
tur ex diuersis guttis ossei petrifici et
marmorei quasi succi concretis et fer-
ruminatis, quam *partium membrana-*
cearum ossificatione et incrustatione tar-
tarea. Sic teste MALPIGHIO succus
osseus, in animantibus ab ipsis ossibus
et tendinibus effluens, in harum par-
tium fracturis laesionibusque saepius
luxuriat. GAGLIARDI tenacissimam
et gypseam materiam in vna parte vs-
que

que ad maioris digiti latitudinem coaceruatam, siue offei succi, paullatim transfudati, concretam et induratum portionem in effracti sed non bene reaptati ossis femoris coalitu circa fracturae situm oculari inspectione percepit. In gallinaceis circa articulos ab ossibus exsudans ichor consimiles producit appendices tophosque. Qui arthritide fixa laborant, intra articulos, saepius materiam generant tophaceam calcareamque. Vesica urinaria in calculosis crusta tartarea nonnunquam obducitur. Aliquando glandulae lapidescunt, aliisque in partibus et visceribus, calculi generantur, ex quibus inter praeparata vterum asseruo humanum, in cuius interiori et laterali pariete haud paruae molis concrementum osseo-lapideum, capsula membranacea inclusum, obseruavi. Vasa quoque arteriosa, quamuis in continuo motu sint, iisdem tamen fatibus obnoxia sunt. Memini enim me aliquoties osficula in arcu aortae invenisse et iliacas insimul arterias, partemque cruralium, cartilagineas vidisse. Similes observationes adduxit MALPIGHIVS, qui in vno aortam, ad sex fere digitorum latitudinem dilatatam, atque interiorius pene squamis osseis siue lamellis gracilioribus et cinereis contextam, examini

mini subiecit physico - anatomico, parumque absimilem in altero defuncto miratus est, vtpote in quo arteria, ad latitudinem quatuor digitorum diducta, sub interiori tunica sistebat bracteas osseas, squamarum instar, albas, planas, inaequalis magnitudinis et figurae.

§. XXXV.

Inexistunt itaque liquido animali principia solidi corporis constitutiva, succusque generandis perficiendisque ossibus aptus, qui a reliquis solubilibus particulis separatus, debito loco, iusta quantitate et qualitate, nec non determinato modo per vasa, eorum diametris respondentia, aduehitur; adponitur, et transfudante per poros vasaque euehente subtiliori adhuc materia, crassiores particulas in motum fluiditatis abripiente, successiue indurescit; in variis vero ossium excrescentiis, totumque his, aliisque morbosis afflictionibus, a ferro aduentitio, ferruminato, aut ab impuro venereo, acri, vellicante, lachrymas osseas rursus dissolvente, intuitu qualitatis locique adfecti alteratur et mutatur.

Liquido animali principia solidi corporis constitutiva inexistunt.

§. XXXVI.

Perspecto nunc possibili et actuali modo generationis solidi in et ex fluido,

Differentia ossium ratione compositionis

tionis et di-
uisio illorum
in plana, fi-
stulosa et
spongiosa.

do, facillime *differentia ossium* ratio-
ne *compositionis* et *directionis* fibra-
rum ostendi poterit. Dantur ossa
quae lineari fibrarum directione vel la-
ta plana, vel conuoluta, cylindros co-
nosue faciunt (§. III.), vel quorum
fibrae ita cursum mutant, vt interiores
obliquae, rectae, et transuersales sese in-
tersecant, tam inter se, quam exte-
riori tenuiori et poroso integumento
osseo cohaerentes, diuersa spatia relin-
quant (§. XXXII.), atque differentis
figurae, staturae tamen et speciei conue-
nientia efficiant ossa *spongiosa*, a prio-
ribus *planis* et *fistulosis* structura et figu-
ra differentia.

§. XXXVII.

consideratio
eorum che-
mica.

Omnia *chemice* prius examinata
ignisque torturae subiecta, vel *natura-*
lia constitutiva, vel *artificialia* suppe-
ditant principia. In genere ex illis
phlegma, spiritus, sal volatile et oleum,
remanente terra, plus minus cohaeren-
te, pro gradu ignis, et ratione ossium
exsiccatorum recentiorumque, in ma-
iore minoreque quantitate extrahuntur.
Maximam eorum partem subministrant
terreae particulae, vel crudiores, vel
subtiliores eiusmodi, quae ad sublime
quidem ferri, inque aqua dissolui pos-
sunt

sunt, in connubio tamen cum crudioribus fixae manent : reliquae partes, spiritus scilicet, phlegma, oleum, aduentitiae sunt, et tam ex vasculis, interstitiis ossium interiacentibus, quam ex oleoso et medullosa, in cavis haerente succo, et per poros ossium transudante, sub destillatione eliciuntur ac mutantur ; hinc propriae, ossiumque constitutivae dici nequeunt.

§. XXXVIII.

Particulae ossium naturaliter constitutae, si physice et anatomicè considerantur, extremitatibus versus se inuicem directis, in longitudinalia filamenta a centrali ossis parte ad perimetrum et extrema extendi observantur. Vbi compositae ex iis lamellae concentrantur, pars ossis principalis fit, quae, quam primum ossescit, punctum ossificationis, et medium ossis, ob maiorem, quod affectat, soliditatem, corpus siue Διάφραγμα vocantur.

Contemplatio anatomica.

§. XXXIX.

Ab hoc centro fibrae vergunt *radio-um* instar ad *perimetrum* et *extremitates ossium*, in quantum eorum figura concedit. In cranii ossibus elasticae, planae, expansaeque circa futuras in peripheria a se inuicem discedunt

directio fibrarum pro differentia ossium variat.

(TAB. III. FIG. V. x. x et FIG. VI. y. y.), in fistulosis parallelae excurrunt, (TAB. III. FIG. I. i. e. III. n. n. n.), aliae ad binas eorum extremitates, aliae iisdem appropinquantes hinc distinctas non habent terminationes, sed vel longiores, vel breuiores sunt.

§. XL.

qualis in fistulosis?

Directionem fibrarum linearem in fistulosis ossibus indicat TAB. III. FIG. I. et III. n. n. n. quarum *exteriores* lamellam longissimam, ad extremitates sese vsque extendentem, monstrant: *interiores* vero decrescetes successive breuiores fiunt, et ubi in medio omnes incipiunt atque coeunt, partem ossis reddunt crassissimam (TAB. III. FIG. II. h. et FIG. IV. r.), firmissimam, magisque compactam (§. XXXVII.); extremitates autem respectu huius longe tenuiores (TAB. III. FIG. I. g. et FIG. IV. v. v.). Concludimus inde ossa in medio maiorem quidem vim ferre posse ac in extremis; laeso vero puncto ossificationis, omnes insimul laedi lamellas.

§. XLI.

series fibrarum et lamellarum in planis.

Seriem fibrarum, atque ex illis *compositas bracteas in planis* demonstrat TAB.

TAB. III. FIG. V. et VI. Lamellae *externae* tenues, instar squamularum sibi inuicem superimpositae aut superstratae (TAB. III. FIG. V. w. x. x.), versus centrum ossis successive breviores fiunt, brevisimaeque ipso in centro (TAB. III. FIG. V. v.) adparent; subiacentes vero *internae*, ad circumferentiam ossis vergentes, longiores amplioresque externis euadunt, donec intima (TAB. III. FIG. VI. y. y.) radiis distinctis ad perimetrum feratur, eademque os in ambitu tenue et pelucidum reddat.

§. XLII.

Lamellae in imperfectis ossibus distinctae (TAB. III. FIG. V. w.), vel quae ex parte sub exfoliatione in perfectis aliquando secedunt, diuersis superficiebus mutuo contactu arcte cohaerent, relictis hinc inde interstitiis porisque, pro transitu vasorum et ossium nutritione necessariis. Contactus hicce perfectus squamulis coaptantibus ac colligendis sufficit, sicuti iuxta BOYLIANA experimenta in laeuigatis, exere, vel alia densa materia confectis laminis, firmam cohaesionem solo contactu produci posse, constat.

*Lamellae ossis
sae mutuo
contactu in-
time cohae-
rent.*

§. XLIII.

qualis ex
mente GA-
GLIAR-
DI unio-
nis modus?

Hunc quidem vnionis modum non plane negauit GAGLIARDI; sed ad validius connectendas lamellas naturam *osficulis* vti putauit, quibus a forma, et consimili modo, squamulas connectendi officio, *clauiculorum osseorum* denominationem imposuit.

§. XLIV.

clauicula-
rum species.

Varias inde finxit eorum *species*, tam *internas* quam *externas*. *Externos* clauiculos diuisit in *perpendiculares acutos*, *perpendiculares capitatos*, *oblique situatos*, et *inflexos*, *angulum efformantes*. *Internos* distinxit in *osficula ad formam clauiculorum sine cuspidē*, *ramusculorum rescissorum*, et *breuiora*, atque pro indigentia partis, modo plura, modo pauciora, in vtraque ossum substantia inueniri sibi persuasit.

§. XLV.

Eiusmodi
clauiculi ar-
tis producta
sunt.

Verum enim vero *haud naturaliter* existunt, sed *artis* tantum producta sunt. Propter cohaesionem (§. XLII.) enim integrae squamulae separari nequeunt, quin remaneant festucae, siue abrupta filamenta, diuersae figurae, auctori citato sub praeparatione tanquam proprii ossum clauiculi visa.

§. XLVI.

§. XLVI.

Lamellae hinc inde inueniuntur *peruiae*, non vt ficti per interstitia intrudantur clauiculi, sed vt *pore* vel *longitudinales* vel *transuersi* medullae transudationi inseruiant, vasisque illam discernentibus et ossa insimul nutrientibus, nec non superfluum reuehentibus, viam concedant liberam: plurimi autem in osmium imperfectorum extremis et cellulosis numerantur, pauciores in adulatorum ossibus reperiuntur.

§. XLVII.

Iam quod *cellulorum osmium naturam* a prioribus (§. XL. XLI.) omnino differentem attinet, ex cancellis paruulis composita sunt, fauum mellis perbelle repraesentantibus. Gaudent enim paucioribus *externis*, plurimis vero *internis*, tenuioribus, friabilibus, in filamenta reticularia abeuntibus lamellis, quae, relictis cauernulis, diuersis externis sibi inuicem contiguis lamellis porositas adhaerent.

§. XLVIII.

Initio *cartilagine* referunt, quae in ipso ossificationis statu e parte interiori media centrali ita quidem indurascunt, vt in imperfectis ossiculum,

crusta cartilaginea adhuc obductum,
cartilaginemque obscurans, adpareat.

§. XLIX.

Diuisio la-
mellarum of-
searum ad-
mentem
GAGLI-
ARDI.

Lamellarum internarum diuersa cau-
formantium GAGLIARDI tres prima-
rias potissimum constituit classes. Pri-
ma complectitur *corrugatas*, altera *per-*
foratas, et tertia *reticulares*.

§. L.

definitio cor-
rugatarum.

Per *corrugatas* seu *incrispatas* intel-
lexit internas plurimarum fibrarum of-
searum contiguarum series, quae ru-
gis prominentiisque variis inaequali-
bus plus minus complicatae sint.

§. LI.

quomodo in-
ternae la-
mellae cor-
rugantur?

Harum figura ab ipso, quo includun-
tur, prouenit spatio. Laminae enim in-
teriores, oblongatae quasi, prorsus ex-
pansae non sunt, sed fibrae hinc inde
corrugantur, plicasque ad instar tuni-
cae internae villosae intestinorum
figura referunt, quae secundum osium
eiusmodi cylindricorum cauitates tor-
quentur, et pro maiore minoreue ele-
uatione ac tortuositate, magis minusque
corrugationem laminarum augent.

§. LII.

§. LII.

Peruias siue *cribriformes* nominavit peruiarum definitio.
compagem filamentorum, sibi inuicem
intertextorum, et ad formam cribri,
relictis hinc inde interstitiis et forami-
nibus *ordinatis, inordinatis, maioribus,*
minoribus, diuersimodeque configura-
tis, expansorum.

§. LIII.

Reticulatas demum appellauit te- reticulata-
rum descri-
ptio.
nuisissima, in miram spongiositatem de-
ficientia, lata rotundaque filamenta, sub-
limi artificio ad formam reticuli con-
cinnata; easdemque adeo saepius cum
cribriformibus confundi, confusasque
reperiri credidit, vt ex his quam pluri-
mae aliae differentiae, diuersaeque os-
sium cellulae producerentur.

§. LIV.

Vt autem quid de his lamellis prae- quid de his
sentiendum?
ter exposita iam (§. LI.) sentiendum,
breuibus indicem, negandum quidem
non est, reperiri interius maxime in
ossibus partes lamellarum corrugatas,
perforatas, reticulatasque (TAB. III.
FIG. I. l. m. k. k.); hae vero nequa-
quam pro distinctis a se inuicem ha-
bendae, sed tanquam confluentes in-
imeque adunatae considerandae sunt,
B 5 quae

quae vnicam tantum referre compagem, hinc inde corrugari, alio loco perforari et circa extrema maxime, vel in spongiosis ossibus, in reticulatum opificium confundi distincte TAB. III. FIG. II. docet: qua propter etiam iuxta cohaesionis leges clauiculis, supra (§. LXIV.) memoratis, in adunandis eiusmodi lamellis internis opus non fuit.

§. LV.

Nutritio ossium eiusdemque cum generationis actu nexus.

Perspecto iam, quantum necesse fuit, modo generationis ossium, progredimur nunc ad *nutritionis* statum, cum generationis actu ita connexum, ut vnus sine altero subsistere nequeat. Generatio enim, vi definitionis, supponit nutritionem, qua praeexistentes partes continuo succi laudabilis nutritii adfluxu successtue euoluuntur, et ad determinatas dimensiones, definitum incrementi terminum, conuenientemque consistentiam perducuntur.

§. LVI.

nutritio ossium quid?

Itaque *nutritio ossium* ille dicendus est actus, quo adfluxu succi medullofi et nutritii per poros (§. XLVI.) consistentia ossium acquiritur et conseruatur. Talis autem necessaria, qualem perfectio

etio requirit, et quae consistente aetate acquiritur.

§. LVII.

Nutritio, quae post accretionis tempora ossibus contingit, quando scilicet animal ad suae speciei conuenientem et ordinariam magnitudinem adoleuit, valde limitata est, neque fit particularum nouarum successiua adpositione, sicuti in imperfectis, sed adfluxu succi laudabilis, poros et interstitia replentis, particulasque a frictione destructas restituentis.

nutritio ossibus post accretionis tempora eueniens valde limitata est.

§. LVIII.

In necessaria solidae substantiae reparatione, in confractis et terebratis ossibus amissae adsimilatae ipsis particulae, vel *citius*, vel *tardius*, pro ratione aetatis, subiecti, succi laudabilis quantitate et qualitate, locique adfecti constitutione, adponuntur, earum beneficio defectus suppletur, succusque osseus ad deficientium loca adfertur.

Solidae substantiae reparatio pro subiectorum differentia diuersimode contingit.

§. LIX.

Idem accidit in sic dictis *gummatibus* seu *nodis*, quales in superficiebus ossium, lue venerea infectorum saepissime generantur. Soluta enim fibrarum, a materia acri et corrosiua, continuitate, effluit

quomodo nodi in ossium superficiebus generentur?

effluit succus nutritius, extrauasatus induratur, pressione extra confinia ossis exterminatur et accrescit; effusio autem ipsius in naturali statu ob partium integritatem cohibetur.

§. LX.

quatenam
mutationes
ossibus in rachitide contingant?

In rachitide ossa incuruantur et tubercula hinc inde ac nodositates generantur. Hic enim morbus, tam a partium solidarum laxitate, quam inaequali succi nutritii distributione oritur; hinc fit, ut in vna ossis parte adpositio particularum ossium lente procedat, in alia citius, fortius, maioriq[ue] inclinatione promoueat[ur]: quare, quum in infantili et puerili aetate vi laxitatis partium, copiosus humidae materiae ad articulos fiat affluxus, maior ad partium vnionem indispositio, minorque partium resistentia, inclinationes ossium variae, diuersaeque extensiones et inaequalitates contingunt.

§. LXI.

debita ossium nutritio in quo consistat?

Hae quidem mutationes in praeternaturali et morbosa ossium constitutione accidunt. *Naturaliter* in iusta temperie et consistentia conseruantur, si quanta et qualis oportet, fiat additio eorum quae deficiunt, et ablatio eorum, quae excedunt.

§. LXII.

§. LXII.

Iam quod ad *succum nutritium medullosum* attinet, fecernitur atque colligitur vel in *maioribus cavitatibus* (TAB. III. FIG. I. l. et IV. t.), vel *minoribus cellulis* (TAB. III. FIG. I. k. k. et IV. f.). Quatenus iisdem inexistit, consistencia aut *medullam* ipsam, aut *medullae analogum* refert. *Medullosus succus* ob interiectas plures oleosas particulas fluidior est *consistente medulla*, natura sebacea. Ille intra planorum tabulas, extremis ossium, et spongiosis continetur, *haec* vero caua fistulorum maiora replet.

Quaenam
cavitates vel
succum nu-
tritium me-
dullosum, vel
medullam
ipsam conti-
neant?

§. LXIII.

Est igitur *medulla* particularum sanguinis oleosarum et pinguedinosarum coagulum, quod vel liquefactum oleum animale, vel induratum principium sulphureum a coniunctione particularum salinarum fixum sistit.

medulla
quid?

§. LXIV.

Partes illius continentes membranaeae sunt, vesiculosae et vasculosae, tennerrimae, nitido et subtilissimo reticulo persimiles. Ex his conflati tubuli, furculique medullares ratione figurae et diametrorum, pro ossium diuersitate disse-

partes illam
continentes.

differunt, exilesque eorum folliculi separando et recipiendo oleo medullari inferuiunt.

§. LXV.

*Communica-
tio vesicula-
rum.*

Loculamenta eorum cellulosa inter se communicant. Exiguum enim frustum teste HAVERIO, quando oleum induratum est, ope microscopii inspectum repraesentat *racemum margaritarum exilium*, quarum una alteri adhaerescit. Hinc vel in ossibus residuae et ab euaporatione olei exsiccatae vesiculae ad spongiae naturam accedunt, eademque fere forma visui sese offerunt, vel a durissima medullae parte super igne liquefacta et successiue exsudata exinanitae, cellulas inter se communicantes, repraesentant.

§. LXVI.

*earum ortus,
modus secre-
tionis succi,
medullosi et
usus,*

Originem ducunt ab ingredientium vasorum arteriosorum extremis tunicis earundemque intertextis elongatis filamentis, concurrente interno periosteo. Vasa intra substantiam diffeminata medullae induunt vel rubicundum, vel rubellum colorem. Ab arteriosis separatur et intra cellulas deponitur; superfluum ab extremis venarum resorbetur. Continuo hoc circulo

culo, internaue agitatione et propul-
sione partes conseruantur et appositio-
ni aptissimae redduntur. Fit vero il-
la simplici mechanismo, dum vel po-
litae lubricae particulae faciliorem ro-
tationem subeant, vesiculaeque elatti-
cae, spongiae ad instar turgidae, sic com-
primantur, vt oleum ex vno lobulo in
alterum transeat, vel per poros tegu-
menti proprii in transuersos laminae
internae cogatur poros, inque osium
substantia ad debitam ipsi praestandam
consistentiam et firmitatem mirifice
dispensetur.

§. LXVII.

Consideratio tunicae internae osfi-
bus propriae, quatenus insimul con-
fert ad formationem vesicularum me-
dullae (§. LXVI.) nos ducit ad specia-
liorem illius indagationem. Haec *perio-*
steum dicitur, tenuissimum illud,
acutissimo sensu praeditum rete vascu-
osum, osibus omnibus, exceptis vel
super gingiuas eminente dentium sub-
stantia, vel locis, quibus tendines mu-
sculorum inseruntur, et ligamenta
capsulaeque recipiuntur, tam super ex-
tensum, quam eorum caua obducens.

pereostem.
quid?

§. LXVIII.

§. LXVIII.

ipsius origo
et extensio in
exteriore ca-
pitis super-
ficie.

Fibrae periosteum componentes partim a lamina durae matris externa, partim a tendinum filamentis externis, partim ab ingredientibus arteriis, in rete intricatis, oriuntur. Dura mater in duas lamellas diuidua *externam* per futuras, in recens natis adhuc deficientes, emittit, quae in adultis earum ferris firmiter adnata, ossibus cranii proprium integumentum largitur; a vertice descendens vaginam vtrinque temporalis musculi facit, osi zygomatice inferitur, inque cauitate iugali, vel eminentiae transuersali dicti processus adcrefcit, vel in progressu margini cartilaginis mobilis, maxillae inferioris condylo vtrinque superimpositae, iungitur, ac non solum ad ligamentum capsulare maxillae inferioris accedit, verum ipsam quoque inuestit.

§. LXIX.

posterior di-
stributio.

Cum hac concurrat *productio*, quae per fissuras irregulares foramenque opticum egrediendo, orbitarum parietes obducit, et maxillam superiorem obtegit. Dummodo autem dura mater in continuatione per foramen magnum occipitis progreditur, externe ac interne

terne vertebris, costis, sterno, partibusque connexis propriam largitur tunicam.

§. LXX.

Periosteum in genere ita dictum (§. LXVII.) pro differentia partium, quas inuestit, vocatur vel *perichondrium*, siue membrana cartilagine obducens, vel *pericranium*, tunica cranio superstrata, vel *periorbita*, lamella ossibus, orbitas componentibus, super expansa, vel *peridesmium*, quatenus tendines et ligamenta involuit.

diuersa eius pro differentia partium denominatio.

§. LXXI.

In *partibus* maxime, a *capite remotis*, ad formationem tunicae huius nervorum concurrunt fibrae tendineae musculorum, ligamentorumque capsularum, ab vno versus alterum extensae articulum.

quaenam in locis a capite remotis ad illius formationem concurrant partes?

§. LXXII.

Modus autem, quo periosteum in et externum diuersis superficiebus utrinque adhaeret, variat. Vel enim in ossium substantiam fibrillae penetrant, vel per lamellam in interiorem cauitatem feruntur, ibidemque concursu membranarum, ab ingredientibus vasis depositarum (§. LXVI.), augentur, atque in latam

modus adhaesionis periostei tam internae quam externae ossium superficiei

latam, tenuissimam, nerueam membranam expansae, periosteum internum constituunt, vel membrana immediate corpora contingit vnione difficillime solubili, quae eo firmior, quo maior magisque inaequalis in- et externa superficies, quemadmodum circa extrema maxime incisuras, eminentias, sinus, foveas, cavitates superficiales cet. vim vnionis periostei cum osse augere animaduertimus. Praeterea vi compositionis illud ipsum, fibris tendinum et ligamentorum propagatis, et in progressu vndiquaque occurrentibus (§. LXXI.), nexu intimo iungitur, atque in statu imperfecto, dum gelatinosae ossium partes indurescunt et ossescunt, successiue extenditur, imo cum ossibus concrescit, sicuti id observationes HAVERSIANAE, de visa in *imperfectis vitulorum ossibus periosteum inter et os*, materia gelatinosa, testantur.

§. LXXIII.

*multiplex
eius utilitas.*

Quoad multiplicem, quem praestat utilitatem, proprium efficit integumentum ossium (§. LXVII.), firmiores reddit circa futuras illorum cohaesiones (§. LXVIII.), concurrit ad formationes vesicularum medullarium (§. LXVI.), in vniendis epiphysibus et cartilaginibus

bus plurimum valet (§. LXXXVII.),
 ossium mensuram in tantum determi-
 nat, in quantum cum aliis, limites
 eorum augmento et extensioni ponen-
 tibus caussis, conspirare videtur, ipsa-
 que demum a variis defendit iniu-
 riis, quum a laesione illius ossium
 morbi, v. c. exostoses, topi, ca-
 ries cet. prouenire soleant.

§. LXXIV.

Haec quidem de periosteo, cauitati-
 bus ossium internis, inque illis conten-
 tis dixisse sufficiat. *Aliae* adhuc exa-
 minandae supersunt internae, a priori-
 bus ratione figurae, structurae, vsus-
 que longe diuersae, immo variae, vna
 cum eminentiis in *externis ossium su-
 perficiebus* occurrentes, *cauitates*. Ni-
 mirum internis, vtriusque tympani ca-
 uitatem, alueolos dentium, sinusque
 osseos adnumeramus, atque in genere
 notamus, caua haec eorum vtique pro-
 priis interioribus integumentis obdu-
 cta, diuersisque partibus formandis,
 continendisque destinata esse, ceu in
 specialiori ossium explicatione indica-
 bitur, praeprimis vero in sic dictis
 sinuositatibus osseis nec medullam nec
 medullosum succum, sed mucum tan-
 tum separari, qui partes internas na-

*Quaenam
 sint reliquae
 internae a
 prioribus
 differentes
 cauitates.*

rium illiniens, a siccitate, sub continua inspiratione aeris metuenda, defendit, particulasque sulphureas odoriferas inuoluit, quo in naribus ad tempus retineri, atque filamentorum nerueorum extremis exceptae ad sensorium commune deferri possint.

§. LXXV.

*diuersae ad-
huc externae
earumque
differentes
denomina-
tiones expo-
nuntur.*

Externae in tantum, tam in generali, quam speciali ossium scrutinio notandae, in quantum vel in concursu cum aliis ossibus foramina ampla constituunt, (qualia sunt v. g. orbitae, narium, reliqua), vel ossibus propria existunt, vel pro differente figura, foueas, sinus, incisuras, sulcos, canales, impressiones, ductus etc. efficiunt, vasorum neruorumque progressui, tendinumque insertioni, membranarumque aequae ac ligamentorum firmiori adhaesioni interuientes, ceu ex speciali consideratione manifestum erit.

§. LXXVI.

*quales articulationum
caussa factae sint?*

Praeter internas et externas, dantur adhuc *cavitates, articulationum caussa* factae. In genere incrustantur cartilaginibus atque profundae, superficiales, planiores, simplices, bifidaeque, plus minus

minus profundae, ouales, semisphaericae, angulosae cet. sunt. Inter *profundas*, magnum caput recipientes, acetabulum, maius quidem, cotyla seu cotyle, Gr. κοτύλη, πύξις, referendum, v. g. cavitates ossis coxendicis, caput ossis femoris excipiens. *Cavitas* vero non adeo profunda, sinuosa, sed *superficialis* magis, caput alterius ossis fouens, vocatur glene, Gr. γλήνη vel γληνοειδής, ut v. c. adparet in *scapula*, in qua caput ossis humeri articulatur, alias ut taceam, de quibus infra capite VI. de articulationibus.

§. LXXVII.

In omnibus totius corporis articulis mobilibus principium quoddam *albicans mucosum* inuenitur, e glandulis, quas HAVERSIUS primum detexit, et respectu partium, in quibus locantur, quarumque vñsibus inseruiunt, *articulares mucilaginosasque* dixit, separatim, nmo ex vasculis ligamentorum, tendinumque lymphaticis, interpositis pinquedinis particulis, forte etiam a transudato per poros extremitatum medulloso succo, collectum.

§. LXXVIII.

Organa secretoria glandulosa ad mentem auctoris corpora sunt mollia, rubicunda

glandulae muciparae in articulis secernunt mucum.

definitio harum glandularum.

cundi coloris, diuersis membranulis vesiculisque, vt plurimum rotundis, fibique inuicem contiguis composita.

§. LXXIX.

carum pos-
tus et ma-
gnitudo.

Diuersa gaudent *magnitudine*, pro ratione loci, quo continentur, et in finibus ossium, eorumque interstitiis implantatae ab interpositis pinguedinis particulis, secretioni oleosi muci insimul inferuientibus, defenduntur, nullamque a compressione patiuntur iniuriam, sed ita locatae sunt, vt partibus in motu constitutis, perpetuo proportionatus praesenti exigentiae existat, atque indefinenter exprimatur succus.

LXXX.

naturalis et
praeternatu-
ralis muti-
tam ratione
qualitatis,
quam quan-
titatis con-
stitutio.

Secretus liquor albumini ouorum perquam similis est, naturaliter ex particulis aqueis, gummosis, oleosis, terrestribusque compositus. Praeternaturaliter ab impura spissa humorum massa vel nimis tenax, vel salinus, acris, et erodens redditur, vel quantitate deficit, vel excedit. In fungo praeprimis, et hydrope articulorum, nimium viscidum serum, circa iuncturas stagnans, siue partem articuli, siue totum occupans, tumorem excitat, mobilitatem destruit, et ligamenta rela-
xando

xando debilitat. Morbus paedarthro-
cace dictus, seu caries cum dolore
obscuro et adparente tumore circa ar-
ticulos puerorum, maxime rhachitico-
rum, frequentius quam in adultis os-
sibus accidere solet, inque illo acris
et erodens materia spongiosam et mol-
liorem ossium substantiam facilius ero-
dit, quam perfectiorum compactiorem
atque firmiorem texturam destruit.

§. LXXXI.

Si liquidum in *debita temperie* spe- debita illius
ctes, bene monente HAVERGIO, *olei* temperies et
lubricitatem mucilago adauget, oleum usus.
mucilaginem conseruat, ne inspissetur,
aut gelatinae contrahat consistentiam.
Sic cartilagines, extrema ossium ob-
ducentes, atque sub articulationibus,
relicto pauco interstitio, sese attingen-
tes, lubricae conseruantur, actiones
partium, in quibus ossa locantur, fa-
cilitantur, ossa articulata ab attritu fri-
ctione et incalescentia praeferuantur,
fibraeque et tendines musculorum lu-
bricantur.

§. LXXXII.

Ratione modi articulationis ossium Praeter ca-
inter se, praeter cavitates differentes uitates ad
in vna parte, diuersae in altera articulatio-
nes mobiles
C 4 requi- diuersae quo-
que ossium

requiruntur
eminentiae.

requiruntur *eminentiae*; hinc eae potissimum considerandae, quae ossibus vel adponuntur, vel in externa ossis facie diuersis ex locis producuntur. Priores vocantur *epiphyses*, posteriores *apophyses*.

§. LXXXIII.

Apophysis
quid?

Ἀπόφυσις dicitur ab ἀποφύω produco, germ. *Auswachs*, *Fortsatz*, et in strictiori sensu proprie significat enatam ex ossis substantia excrescentiam, intus cellulosam; siue partem ossis continuam, vltra planam superficiem prominentem.

§. LXXXIV.

Ipsius synonyma et cognomina.

Accepit pro figurae locique ratione diuersa *synonyma* et *cognomina*. Appellari enim solet processus, productio, protuberantia, eminentia, tuberositas, proiectura etc. et a *cognominibus* πτερυγοειδής, μαστοειδής, κορακοειδής, ὀδοντοειδής, γραφιοειδής, συλοειδής, processus zygomaticus, τροχαντήρ, obliquus, transuersus, spinosus, caput, collum, κόνδηλος, κορώνη, margo, labrum etc.

§. LXXXV.

diuisio.

Diuidi autem solent apophyses in *veras* et *spurias*. *Verae* cum definitione

tione conueniunt (§. LXXVIII.), *spu-
riae* sunt excrescentiae, quae epiphy-
sium in modum ossibus quidem adhæ-
rent, successu tamen temporis cum il-
lis ita coalescunt, vt structura figura
vsuque *veras* mentiantur.

§. LXXXVI.

Vsum praestant *multiplicem*. In ge-
nere succurrunt articulationibus, luxa-
tiones impediunt, ligamentis, tendi-
nibus, musculis etc. locum fixum in-
sertionis præbent, eorum vim augent,
aliasque defendunt partes.

§. LXXXVII.

Ἐπιφύσις v. g. TAB. III. FIG. III. *Epiphysis,*
p. p. adpellatur osficulum extremitati-
bus, vel lateribus ossis adnatum, et in-
ceruiente periosteo vnitum, ab ἐπι-
φύω accresco, germ. *Anwachs, Ansatz,*
at. appendix, additamentum, adnaf-
centia. *eiusque sy-
nonyma?*

§. LXXXVIII.

Coniunctio ipsius cum osse fit per in-
dentationem. Excipiunt enim se inui-
cem non planis, sed inaequalibus su-
perficiebus, in quibus parua capitula
diuersis minoribus recipiuntur sinu-
lis, *commisura
illius cum
osse fit per
indentatio-
nem.*

lis, quorum mutuo ingressu et inosculatione firmior redditur coalitus.

§. LXXXIX.

*omnes epiphy-
ses initio
cartilagineae
sunt.*

Omnes epiphyse initio cartilagineae referunt, successive indurescunt, ac more ossium cellulosorum perfectam induunt naturam (§. XLVII.). Interior earum structura (TAB. III. FIG. IV. q. q.), delineatur.

XC.

Medium distinctionis illarum ab ossibus, quibus adhaerent, et mutatio in apophyses spurias.

Medium distinctionis illarum ab ossibus, in statu ossium imperfecto, *periosteum* est (§. LXXXVII.), (TAB. III. FIG. IV. l. o. o.), quod prouti ossa successive perfectiora fiunt, a cartilagine amplius distingui nequit, sed ita cum illa concrescit, ut linea intermedia *cartilaginea* ad tempus usque pubertatis maneat, ossaque quasi interuentu cartilaginum ab epiphysibus distincta appareant; perfectioribus autem redditis partibus omnibus ossibus, *medium* distinctionis *evanescit*, et additamenta ob continuitatem cum ipsis ossibus *apophyses* quidem, sed *spuriae* fiunt.

§. XCI.

usus epiphysium.

Quum vero magna earundem pars extrema ossium fistulosorum constituat,

tuat, omnes autem succesſive in apophyſes mutantur (§. XC.), vſu inſimul cum illis conueniunt (§. LXXXVI.); hinc amplitudine articulationibus famulantur, muſculorum, tendinum, ac ligamentorum inſertionibus, cohaeſioni firmiori, debitae oſſium extensioni et nutritioni, medullae collectioni, firmiori inceſſui, oſſium leuitati, impediendisque fracturis inſeruiunt, nec non vaſis minimis, liberum ingreſſum, et egreſſum concedunt.

§. XCII.

Haec quidem *generalia* ſunt *generationis, nutritionis et perfectionis oſſium principia*, quorum *adplicationem, ſpecialis* requirit *pertractatio*. Hanc vero a capite ad calcem ita proſequemur, vt, tradita partium omnium corporis humani cognitione theoretico-practica, coronidis loco de articulis et commiſſuris ſimus acturi.

Praemiſſa generalia principia oſſibus in ſpecie adplicanda ſunt.



DIFFERENTIIS Sceleti
PERFECTI VIRILIS ET FE-
MININI

NEC NON

DE

CAPITE Sceleti.

§. XCIII.

*Sceleti di-
uisio.*

S*celetus diuiditur in caput, truncum et extremitates.* Partes hae ita coordinatae, atque regulis mechanismi conformiter locatae sunt, vt truncus columnam erectam referat, cui caput globi ad instar superimpositum est, in fine colli lateraliter e regione costarum superiorum pendeant brachia, pedibusque tanquam columnis, in partem praelongam latamque, qua in terra stabili vestigio insistimus, desinentibus, suffulciatur.

§. XCIV.

*Differentia
sceleti viri-
lis et femi-
nini intuitu
thoracis, cla-
vicularum et
acromiorum.*

Est vel *virilis* vel *femininus*, aliqua-
tenus a se inuicem differens. In vni-
uersum *femininus* tenerior et infirmior
est *virili*. In specie *thorax feminini sce-
leti* superius angustior est, circa medium
leuiter fornicatus, inferius depressior,
latior-

lteriorque virili, et iuxta RVYSCHIVM costae crassiores, rotundioresque. *Claviculae* in femininis rectiores abscondunt colli foueas, in viris inflexae easdem magis conspicuas reddunt. *Acromiorum* distantia in viris magna, in feminis minor est. SANTORINVS *obseru. anatom. cap. VII. §. XVII. p. 137. in feminis praeter caeterarum partium, quae voci datae sunt, exiguitatem non modo amplam minus palati cavitatem, sed ne in profundioris fornicis quidem modum compositam, qualis in uiris obseruari plurimum solet, animaduertit.*

§. XCV.

Inter alia notabilis *sceletorum utriusque sexus circa coxas et os sacrum* obseruatur discrepantia. Ossa coxarum naturaliter in mulieribus tenuiora et ampliora sunt, magisque a se inuicem distant, quam in viris. Hinc peluis sub ossium pubis symphisi patentiorem habet hiatum, quem auget ossium schii exteriora versus inclinatio, angulusque inter vtraque ossa maior factus. Ilium autem amplitudine et reupinatione, infima abdominis pars capacior redditur; quid quod ossis sacri et coccygis minor incuruatura vna cum reliquis spatium auget, vteroque
conti-

Quaenam respectu ossium pelvis in utroque sexu obseruetur discrepantia?

continendo, gestando et enitendo foetu commoda maxime est, maior autem utriusque ossis in viris inflexio peluim angustat. Iuxta voluminis ossium in feminis extensiones et maiorem acetabulorum distantiam, collum ossis femoris utrimque extrorsum magis vergit, angulumque rectum, cum corpore ossis auget.

§. XCVI.

Definitio capitis sceleti.

Caput sceleti humani dicitur pars suprema fere globosa (§. XCVII.), ex ossibus cranii et faciei, nec non maxilla inferiori mirifice composita, et collo superimposita.

§. XCVII.

Diuerfa ipsius figura.

Magnitudine seu voluminis extensione, et *crassitie* siue substantiae augmento, respectu reliquorum sceleti ossium proportionatis, pro individui constitutione, et aetatis ratione differt: hinc *figura* ipsius vel in globum extuberat, vel oualis est, rarius caput in vertice accuminatum, anterius posteriusque planum et rhomboideum inuenitur. Obseruandum interea, diuersam capiti sub partu operoso artificialiter, immo praternaturalem post natiuitatem, a manuali et artificiali compressio-

pressionem, fasciarum constrictionem, lamellarum ad ossa frontis et occipitis adplicationem induci posse, qualis barbaris quibusdam gentibus, forsan stupidis inde, ac melancholicis familiaris esse solet.

§. XCVIII.

Capitis fabrica optima et ad speciem pulcherrima est. Praeter ordinatum enim ossium positum, quibus cranium eiusque cauum formatur (§. CII.), proportionata est ossium faciei coordinatio. *Frons* duobus protuberat tuberculis. Sub his duorum digitorum circiter spatio *orbitae* marginibus siue sic dictis *superciliis* eminent. Infra illas *maxillae immobilis ossa* teneriora, crassiora, maiora, minora et gibbosa, circa os successive deprimuntur et acuminantur. Lateraliter extenduntur latiora et eleuata *ossa malae*, cum *maxillaribus* proprie sic dictis *genas*, cum *temporalibus* vero *caua magna* formantia. Processibus nasalibus antrorsum retrorsumque *patentes* inhaerent *nares*, ipsisque subiacet *palatum*. *Maxilla inferior* cum osse temporum articulatur, et mediantibus *dentibus inferioribus* ad *superiores* admouetur, in medio autem *bulbus* minus prominula *mentum* facit.

Quaenam sit
ossium cranii
et faciei dis-
positio ac co-
ordinatio?

§. XCIX.

§. XCIX.

*Vsus fabri-
cae capitis in
genere.*

*Multis praeterea modis, cum ratio-
ne firmitatis, tum defendendarum
nobilissimarum partium, recipiendo-
rum diuersorum muscutorum, vaso-
rum, neruorum, et continendorum
organorum sensuum cet., quibus omni-
bus locum et stabilitatem praestat, *figu-
ratum est*, partesque omnes a supre-
mo rerum omnium artifice, mirifice et
concinne inter se adaptatae, atque in
summo collocatae sunt, vt caput sit sen-
sationum internarum et externarum do-
micilium, respirationis, masticationis,
vocisque instrumentum, nec non pul-
chritudinis totius corporis documen-
tum certissimum; hinc iuxta illud
Ouidii:*

*Pronaque cum spectent animalia
caetera terram,*

*Os homini sublime dedit, coelum-
que tueri*

*Iussit, et erectos ad sidera tollere
vultus.*

§. C.

*Cranium
quid?*

Quo vero caput totum cerebrum rite
fouere atque munire possit, tam insignis
et amplissima cauitas ex concursu ossium
cranii facta, illud excipit, quam firmis-
simum,

simum, capacissimum et fornicatum
 ossium integumentum, *cranium* in-
 quam, sese habens veluti *κεράς*,
 galea, propugnaculi vices praestat, in-
 iurias arcet, et naturalem cerebri ca-
 lorem conferuat.

§. CI.

*Ossa, quae ad cranium, eiusque cavi-
 tatem conficiendam conspirant, cranii
 ossa vocantur.* Horum octo numeran-
 tur. Anterius *os frontis* vnicum ad
 priora superius eleuatum, inferius le-
 uiter acuminatum, interius basi pro-
 spicit. *Duo lateralia* ad interiora quo-
 dammodo depressa, et superius gib-
 bosa sunt. *Occipitis* vnum posterius
 rotundum globosum, capacissimum, sed in
 fundo planius, maximam cavitatis par-
 tem efficit. *Duo temporum* lateraliter
 posita, inferius angustata, superius
 autem leuiter conuexa, aures conti-
 nent, et ad basin conferunt. *Ethmoi-
 dale* vnicum anterius in basi perfora-
 tum est, vltimumque in medio reliquis
 instar cunei infixum, et alis lateraliter
 extensum, *sphenoidale* dicitur.

*Quaenam
 ossa cranium
 eiusque cavi-
 tatem for-
 mant?*

§. CII.

Iuxta diuersum horum ossium posi-
 tum et figuram (§. CI.) *caluaria regio-
 nibus*

*Descriptio
 regionum
 capituli.*

nibus quibusdam distinguitur. Sinciput, tanquam pars frontis et caluariae superior et anterior, ad finem sagittalis suturae excurrit. Huic opponitur posteriorum latius et capacius *os occipitis*, collo insistens, in quo locus, quem *nucham* dicunt, notandus. *Occiput* igitur *sincipite* depressius est. Superiorem vero altissimam, gibbosam et *verticosam* partem ossa lateralialia, inferius autem vtrimque angustatam, *tempora* determinant.

§. CIII.

*Distinctio
ossium cranii
in propria et
communia.*

Omnia coeunt vel inter se, vel cum ossibus faciei insimul vniuntur. Priora nominantur *ossa cranii propria*, posteriora vero *communia*.

§. CIV.

*Structura
cranii.*

Pars ossium cranii superior (§. C.), in specie calua siue caluaria dicitur. Constat ex ossibus cranii instar galeae fornicatis, figurae maxime oualis, diuersaeque magnitudinis et crassitiei. Duas potissimum *superficies*, *externam* conuexam et aequalem, *internam* vero inaequalem et concauam sistit, in quibus pro ratione ossium iuniorum et adultorum futurae, vel praesentes, vel deficientes, defectus ossificationis, im-

pressio.

pressiones, foueae, sulci, foramina, plus minus profunda, cet. inueniuntur. Praeterea vi compositionis *duas tabulas* et interiacentem cellulofam exhibet substantiam, quam a διπλόω, duplico, *diploen* vocant, seu *meditullium*, quo duplex cranii tabulatum discer nitur, quodque vel in recens natis deficit, vel in senibus disparet.

§. CV.

Ex his primum planum duplex tabulatum os, caluae partem superiorem, et faciei infimul anteriorem efficiens, quodammodo orbiculatum, in orbitis cauum, et circa nasum paullum eminens, vel *os frontis* a ferendo, quia frons prae se fert animi signa, vel a futura, qua lateralibus committitur, *coronale* dicitur. Os frontis, quid?

§. CVI.

Citius quam verticis ossa ossescit ipsum ossificatio.
(TAB. I. FIG. III. IV. V.). Adparent enim primo conceptionis mense partes albicantes osseae, distinctis in perimetro radiis, puncta scilicet ossificationis, quae pro incremento, ac maiori fibrarum quaquauersum extensione, nonnihil adscendere videntur. In trimestri embryone fibrae circa perimetro

metrum adhuc discedunt, relictis interstitiis membranaceis, ad formationem fontis pulsatilis concurrentibus (TAB. II. FIG. I. a.), donec os aliquot annorum interuallo reddatur perfectius, ac successu temporis distinctius duas tabulas, interiacente mediotullio, nec non diuersas in ambitu ferreas sistat.

§. CVII.

in infantibus bisfidum est.

In infantibus adhuc bisfidum est, linea medium ossis ad radicem nasi vsque secante. In statu successiuae perfectionis binae partes concresecunt, rarius futura in adultis remanet, sed vt plurimum os simplex inuenitur.

§. CVIII.

diuersa gaudet crassitie et magnitudine.

Intuitu crassitiei et circumferentiae variat pro aetatis ratione. Potissimum vero in punctis ossificationis verticeque crassissimum est, crassum in lateribus et circa sinus, in portionibus autem orbitalibus tenuissimum.

§. CIX.

ad quas partes extendatur, quasque determinet capitis regiones?

Pars eius amplissima extus gibba, intus concaua, anterieus determinat frontem, superius accedit ad verticem, lateraliter ad vtriusque temporis partem.

Infe-

Inferius ossibus *nasi fulcrum* dat, et *portiones orbitarum superiores* efficit.

§. CX.

In specie *extrinsecus* infra tubera (*§. CVI.*) sic dicta *supercilia eminent*, quibus *margines* duo *arcuati* intelliguntur, *vtrimque* versus *internum angulum* obtusiores, *deorsum* vero et *interius* tendentes, *magis acuti*. *Laminae* illorum *teneriores*, *ad interiora reflexae*, *excauantur*, *faciuntque orbitarum* totas *superiores* et *ex parte laterales partes*.

*extrinsecus
supercilia,
partesque or-
bitarum su-
periores et
laterales
facit.*

§. CXI.

Prope nasum tabulae diductae a se inuicem sinus formant frontales, siue *cauitates ossaeas diuersae capacitatis*, in recens natis *deficientes*, *supra oculorum* *margines* *ad medium illorum* *successiue angustatas*, *inaequales*, *septo vnico* *vel pluribus diuisas*, et *ad vtrumque nasi septum proprio osculo* *patentes*. In nonnullis *externe prominencia tubera* *capaciores* et *maiores sinus* *indicant*, in *depresso* vero et *plano frontis osse defectum* *solum meditullium* *supplet*.

*formatio et
structura si-
nuum fronte-
talium.*

§. CXII.

eorum usus.

Vi structurae sinuum et membranae illos inuestientis secernitur ibi mucus, qui in situ corporis erecto, paululumque ad posteriora inclinato, in nares exstillet; sed praeternaturaliter collectus, tunicam ipsosque sinus obstruens, symptomata producit, quae grauedinem, coryzam, phlegmatorrhagiam, adfectus inquam serosos et frigidos, in quibusdam ex propria dispositione habituales, indiuulso nexu, sequuntur.

§. CXIII.

qualis interna ossis superficies?

Interna superficies, concaua, a cerebri gyris, foueisque inaequalis facta, fouet lobos cerebri anteriores, in medio autem fulcata processum durae matris fal-ciformem, inque illo partem sinus longitudinalis superioris firmat, et deorsum in portionibus orbitalibus pro firmiori durae matris adhaesione conuexa et asperiuscula est.

§. CXIV.

eiusdem cum cranii et facie ossibus connexio.

Extremitatibus diuersis recipit quaedam cranii et faciei ossa; posteriore nimirum superiore et crassa, bregmatis ossa; inferiore et tenuiore tam verticis quam sphenoidale; media interiore et infe-

inferiore cribrosum, plana, vnguis. *Prope nasum* vnitur processibus nasalibus, maxillae superioris; *exteriore* superciliarum acuta et crassa parte ossibus iugalibus committitur, *superpiliis* autem interpositus processus brevis, acuminatus, ossa septumque narium fulcit.

§. CXV.

Foramina ossis notabilia, vel propria sunt, vel in *coniunctione cum aliis* fiunt. *Intus unicum coecum* aliquando ab osse frontis solum, saepissime vero coniunctum cum ethmoidali, pro insertione processus falciformis, producit. *Exterius* utrinque *orbitare superius*, figurae ovalis, in extremo supercilii haud longe a naso distat, et vel integrum, vel interruptum est, vel deficiente illo, impressio observatur, quae tenui quodam ligamento membranaceo anteriùs obducta, hiatus relinquit, per quem ramus primus quinti paris nervorum ad varias oculi et faciei partes fertur; *minima* autem ibidem et copiose supra margines sinuum ac radicem nasi disseminata, ad ipsum ossis meditullium penetrant.

Foramina in utraque ossis facie conspicua.

§. CXVI.

*eminentia in
angulo orbi-
tae interno
pro trochlea
cartilaginea.*

*Porro in quouis angulo interno inte-
rius et superius notanda vel impressio,
vel eminentia acutissima, rarissime per-
fecta trochlea ossea, cui cartilaginea
pro transitu tendinis musculi obliqui
superioris adnascitur.*

§. CXVII.

*a quibus of-
sibus forami-
na orbitaria
interiora
fiant et quo-
modo diuidi
soleant?*

*Deinde lateralis et interior orbitae
pars unicum, nonnunquam duo, rarius
tria continet vel propria, vel coniunctim
in medio commissurae ossis cum pla-
no, vtrimque facta foramina. Unicum,
orbitare tantum interius adpellatur; du-
plex, ratione situs in interius et ante-
rius, et interius ac posterius dispes-
citur. Illud recipit ramusculum nerui
ophthalmici, et deducit ad os cribro-
sum septumque nasi: per hoc vero ra-
mus arteriolae, neruum opticum co-
mitantis, vel prope illud, per proprium
foraminulum orbitam vtrimque ingre-
dientis, reflectitur ad membranam sinus
sphenoidalis.*

§. CXVIII.

*fouea pro
glandula la-
crymali.*

*A medio denique infra supercilia ad
vtriusque orbitae externum latus pro-
fundior, pro glandula lacrymali, ex-
tenditur fouea, cuius serum tam acre
fae-*

saepius fit, vt ab illo externam laminam osseam arrosam viderim.

§. CXIX.

Praeterea quoque *musculis locum* quibusnam musculis os locum fixum praebet? *fixum praebet. Duo enim frontales a canthis maioribus ad minores parum oblique adscendunt, paulo post membrascunt, et latiori aponeurosi super cranii partem expanduntur. Orbiculares, segmentis circularium fibrarum, margines orbitalium et vtrasque palpebras ambiunt, ibidemque in diuersas series diuiduntur.*

§. CXX.

Exposita iam structura docet, quid Observationes et caute- lae practicae. *in praxi chirurgica obseruandum sit?*

- a) Cauendum, ne futura sagittalis, in adultis ad radicem nasi nonnunquam extensa (§. CVII.), pro fissura habeatur, atque fracti ossis opinionem frustra faciat.
- b) Portiones orbitalium tenues (§. CX.), a qualicunque vi, fronti illata, solutae et fractae periculo- sae sunt.
- c) Haud commode licet in osse fron- tis, ob inaequalem crassitiem (§. CVIII.),

CVIII.), admoouere terebram. In parte praeprimis sinuosa vsus ipsi nunquam concedendus: perforato enim loco cranii anteriore, sanguis vi specificae grauitatis descendens euacuari nequit; vbi vero membrana SCHNEIDERI laeditur, periculum sinuositatis fistulosae extimescendum. Periculosum aequae est, medium ossis, locumque, qui fons pulsabilis in iunioribus dicitur, ob subiacentem sinum longitudinalem superiorem perforare.

§. CXXI.

Ossa bregmatis.

Ossa plana, que superius et laterali-ter maximam, fornicatam, et altissimam cranii partem faciunt (§. CII. CIX.), a marginibus (§. CXXVI.) *quadrilatera*, a vertice vero seu loco, quo in gyrum se vertere dicuntur, siue quem in recens natis palpitantem vocant, *bregmatis et verticis* appellantur; βρέγμα enim, a βρέχω ma defacio, *locum* capitis *apertum*, eiusque mollitiem et teneritatem in infantibus indicat (§. CXXIV.).

§. CXXII.

eorum magnitudo crassities et ossificatio.

Magnitudine et crassitie pro indiuidui aetatisque ratione differunt. In em-

embryone vnius mensis membranaceae adhuc sunt (TAB. I. FIG. III, IV. i.). Paulo post fibrae osseae bracteas diuer-
sas figurantes, e centro TAB. I. FIG. III. c. radiorum instar ad peripheriam TAB. III. FIG. V. x. x. et FIG. VI. r. y. feruntur, remanentibus hinc interstitiis membranaceis. Perfectiora successiue facta in duas abeunt, diploe-
liuifas, tabulas, atque in adultis am-
plissima et crassa, in vertice et versus occiput crassissima, lateraliter vero tenuiora paululum, sistunt ossa.

§. CXXIII.

Defectus ossificationis in omnibus recens natis TAB. I. FIG. I. a. et TAB. I. FIG. I. a. vel in medio fere verticis et centro concursus futurae sagittalis cum coronali, vel sub coniunctione bre-
ymatis osium cum osse occipitis, et par-
e petrosa ossis temporum (TAB. I. FIG. I. d.) deprehenditur. Prior fon-
tem pulsatilem proprie denotat, po-
terior utroque in latere obuius locus
fontanellas sic dictas CASSERII indicat.

Qualis defectus ossificationis fontem pulsatilem et fontanellas CASSERII denotet?

§. CXXIV.

Fontanella, ad cuius formationem os frontis insimul concurrit (§. CVI.), figura gaudet quadrangulari, indeque non-

Fontanellae descriptio et mutatio.

nonnullis audit *hiatus rhomboides*. Initio duplicem durae matris laminam arcte sibi cohaerentem refert, quae sub extensione et incremento fibrarum successiue separatur. Mirum inde non est, cur aperto hiatu in viuis arterio-
lae, duram matrem copiose perreptantes, pulsant? Contingit vero naturaliter contactus fibrarum osium frontis, verticisque, vnius vel duorum annorum interuallo, quam mutationem vulgo uocant: *Der Kopf hat sich geschlossen*, ipsam autem aperturam germinat *das Blätlein*.

§. CXXV.

*Tardius et
inaequaliter
in quibus-
dam ossificat.*

In quibus natura *hiatum tardius*, claudit, locus diu manet *cartilagineus*. Aliquoties fontanellam ad septimum aetatis annum in pueris, atrophia mortuis, vidi imperfectam cum sutura sagittali, ad radicem nasi vsque extensa, imo ab inaequali illius induratione, insignem loci depressionem in adultis obseruavi.

§. CXXVI.

*Margines os-
sium verti-
cis, eorum
anguli, et
connexio.*

Ipsam autem os vtriusque *quatuor* distinguitur *marginibus*. Ab *anteriori* et *inferiori* sit *angulus acutus*, ab *inferiori* et *posteriori* *obtusius*, vterque pro-
be

ne attendendus (§. CXXVIII.). *Superioribus* marginibus inter se mediante futura sagittali vniuntur; *anterioribus*, ossi frontis ope futurae coronalis iunguntur; *inferioribus* portionibus lateralibus sphenoidalis ossis, partibusque squamosis temporum committuntur; *posterioribus* demum futura lambdoides cum osse occipitis adunantur.

§. CXXVII.

Intuitu *configurationis ossium extus gibbosae*, aequalis et politae, *partes laterales inferiores* a fibris musculorum temporalium *impresiones* accipiunt; *superiori* vero parte versus futuram sagittalem, tam *minima* nutritioni inservientia, quam *peculiaris quaedam*, *anterioribus* non nihil maiora, patent *foramina*, quae venas recipiunt, sanguinem ab externis capitis integumentis ad sinum longitudinalem superiorem *ducentes* atque *revehentes*. *quaenam in illorum superficie externa*

§. CXXVIII.

Interna amplissima concameratio, a gyris loborum mediorum cerebri fit *inaequalis et sulcata*. *Infra* futuram sagittalem *fossa* excipit sinum longitudinalem superiorem. *Lateraliter* sulci, *arbusculas* repraesentantes, ab arteriis *durae* *et interna nabilia?*

durae matris imprimuntur, quarum truncus aliquando laminam internam perforando ad meditullium pergit, ibique vel canalem, vel simi- canalem efficit. Circa *angulos obtusos pars fossarum* pro finibus latera- libus reperitur, *foucaeque* hinc inde pro glandulis, *plus minus profundae*, et a fero acri ac corrosiuo nonnun- quam ad diploen vsque *erosae*, distin- cte cernuntur.

§. CXXIX.

Observatio-
nes et caute-
lae practicae.

Ossa haec, quamvis in loco aptissi- mo posita sint, cui externis praesidiis, urgente necessitate commode succurri potest, in omnibus tamen partibus non admittunt instrumentorum adpli- cationem, et prae reliquis fons pullati- lis in quavis aetate attentionem mere- tur. *Hinc sequentes notandae cautelae et observationes practicae.*

- a) Quando in externis horum os- sium laesionibus terebra adplican- da est, cauendum, ne perforen- tur *in angulis* (§. CXXVIII.), ob extimescendam arteriarum et late- raliuum sinuum laesionem, ac hae- morrhagiam, neque *in loco pulsa- tili* (§. CXX. c.), aut sutura sagit- tali,

talī, quippe his in locis sinus subiacet longitudinalis, dura mater eminentiis denticulatis arcte cohaeret, absque vi separari nequit, separatio quoque cum laesione sinus coniuncta periculosa est, imo ferrae sub perforatione fragmenta atque minimas festucas relinquunt, quae si inter duram matrem et cranium peruenerint, ipsam laminam neruosam stimulis ad spasticam strictionem motusque totius corporis conuulsuos excitare valent.

- b) Naturalis, quae in loco fontanelle quandoque remanet (§. CXXV.), impressio, ab illa, quae forsitan ab externa violentia inducta fuit, probe distinguenda est.
- c) Quum hiatus initio admodum mollis sit (§. CXXIV.), veteres ante octauum diem infantibus nomen haud imponere solebant, veriti, ne adspersione aquae frigidae conuulsuiis motibus agitantur; quid quod Libes, sicuti fertur, lana succida, h. e. fordibus lanis ouium adhaerentibus accensis, *βέρυρα* siccius reddere arbitrabantur.
- d) Vio-

d) Violenta fontis pulsatilis in viuīs depressio, aut inflicūm ipsi vulnus, sola etiam acus punctura ob laesionem durae matris vasorumque, immo ipsius cerebri (§. CXXIV.) mortem inferunt. Locus hic in adultis laesus, teste HIPPOCRATE, periculosus admodum est, partim quod leuiorem vim ferre, subiacensque sinus longitudinalis durae matris facile laedi possit, partim quod omnes ictus, in se inuicem recurrentes, rectilinei sint, qui vehementiorem cerebri excitant commotionem.

e) Si fontanella sub imminentibus et praesentibus motibus conuulsivis collabescat, atque dura mater violenta constrictione interius trahatur; periculosum.

f) Pulsatio fontanellae signum viui foetus in vtero certissimum est, at, si ob angustiam pelvis, vel vteri grauidi obliquitatem, paragonphosis capitis foetus in vtero oriatur; tunc quidem, ob nimiam ossium capitis in pelui compressionem, et mutatam inde figuram, locus pulsans a compressis lamellis

lamellis ita opprimitur, vt percipi amplius nequeat, et pro ratione gradus incuneationis, vel anasthesia foetus in vtero fiat, vel ipsa demum mors sequatur. Itaque dubio hoc in casu a sola perceptionis pulsationis fontanellae impossibilitate, ad negationem vitae foetus in vtero, non statim valet consequentia.

§. CXXX.

Posteriorem et inferiorem calvariae *Os occipitis*, fundique illius partem perficit *os occipitis*, planum, irregulare, inaequale, differentis magnitudinis, et crassitie, fronti e diametro oppositum.

§. CXXXI.

Primo mense partim *membranaceum* *structura illius in imperfecto et perfecto statu.* est, partim ex *quatuor*, a se inuicem distinctis, totidemque puncta ossificationis habentibus, constat *frustis* *statu.* TAB. I. FIG. V. et FIG. II. g. g. g. g.), quae crescente foetu quidem augentur, post natiuitatem tamen separata adhuc ad tempus manent, donec in perfectiori ossium statu confluentia, os unum, duplex tabulatum, et compactum reddant, nullumque amplius primitinae diuisionis relinquant vestigium.

E §. CXXXII.

§. CXXXII.

Superficies
externa, et
diuersa di-
uersis in lo-
eis ossis cras-
sities.

In *statu perfecto extrinsecus amplissi-
mum*, conuexum, hinc inde vel aspe-
riusculum, vel sinuosum, superius *acu-
minatum et crassum*, in medio *crassius*,
partibus posterioribus paululum *te-
nuius*, inferiore vero breuiore minore-
que initio *latum*, postea autem *com-
pressum et crassissimum* est.

§. CXXXIII.

In hac pri-
mo eminent
processus
nuchae.

Quatuor ibidem eminent *processus*,
e quibus in *nucha asperiusculus* produ-
citur, aliquando *bifidus*, ligamentum
nuchae firmans. Quum vero saepis-
sime *deficiat*, *defectum* illius inaequalis
supplet *impresio*.

§. CXXXIV.

Deinde ab
illo linea
aspera ad
anteriorem
ossis protu-
berantiam
ducitur.

Ab hoc linea aspera per medium fo-
raminis magni ad alterum huius ossis
inferiorem et anteriorem ducitur, eum-
que quasi diuidens, ad finem vsque, h. e.
extremam, amplam, et scabram, basi-
que ossis cuneiformis iunctam par-
tem comitatur.

§. CXXXV.

et duo de-
mum adpa-
rent condyli.

A media demum foraminis magni par-
te, oblique paululum et exteriora versus,
duo extenduntur condyli oblongi, (GA-

LENO *νορώσαι*), qui cartilagine tenuiori obducti a cauitatibus atlantis glenoideis recipiuntur, firmisque ligamentis capsularibus, pro capite ad omne punctum mobile sustinendo, constringuntur.

§. CXXXVI.

Praeter hunc cum osse sphenoidali et primo spinæ dorsi osse nexum, *margi-
ginibus diuersis aliis* adhuc cranii ossibus comittitur. *Superioribus* oris, in medio acuminatis, ope futuræ lambdoideæ bregmatis ossibus iungitur; *lateralibus* cum processibus mastoideis vnitur; *inferioribus* autem, antrorsum versus protuberantiam anteriorem oblique descendentibus, vtrimque cum ossis petrosi margine acuto, internam et inferiorem superficiem, ab externa et inferiore distinguente, ad fulcum vsque, apici ossis insculptum, leuiter tantum cohaeret.

*Quibusnam
ossibus com-
mittatur?*

§. CXXXVII.

Intrinssecus *concauum inaequale et
sinuosum* est. *Sinuositas longitudinalis* (§. CXIII. CXXVIII.) pergit e media et superiore ossis parte ad medium ossis, *lateralesque profundiores foveas*, quarum *dextra*, paulo altius nonnunquam sita, *sinistra latior* est; ex *eminen-*

*Intrinssecus
os concauum
inaequale et
sinuosum est.*

tiis autem ad crucis figuram se inuicem excipientibus, protuberantibus, ossisque insimul crassitiem augentibus, inferior, instar lineae asperae distantia pollicis a foramine magno debiscens, in duas lineas asperiusculas abit, quae, relictæ pro sinu occipitali aliquali impressione, successiue decrescente, finesque lateralium non procul a diuerticulis attingente, in margine interno foraminis magni oblitterantur.

§. CXXXVIII.

Finis foveae pro sinu longitudinali et directio fovearum pro lateralibus.

Cum sine longitudinalis fossae insimul sinus maximus finitur. Hic enim incumbit processui falciformi, qui eminentiae transuersali infixus, septum transuersum durae matris constituit, cuius interstitio sinus laterales continentur, et ad sanguinis ingressum, e longitudinali commodè suscipiendum et promouendum, tam a foveis ossi impressis (§. CXXXVII.) augentur, quam in decliui positi sunt, et, antequam in venas iugulares terminentur, vtrisque oblique feruntur.

§. CXXXIX.

Ab eminentiis cruciformibus quatuor sunt excavaationes.

Ab eminentiis cruciformibus ibidem quatuor maiores excavaationes, in superiores et inferiores distinguuntur. Prior
res

res continent lobos cerebri posteriores, *posteriores* ipsum cerebellum. Ne vero cerebellum ab incumbente cerebro comprimatur, ab intercedente processu transuersali, vtrique calvariae lateri firmiter satis adhaerente, separatur.

§. CXL.

Praeterea, vbi margines inferiores oblique descendunt (§. CXXXVI.), adstant *processus* minores *spinosi*, pyramidales, in adultis potissimum conspicui, coniunctionem cum ossibus petrosis (§. CXXXVI.) firmantes, et diuerticula (§. CXLII.) superius terminantes.

*Situs et usus
processuum
minorum
spinorum.*

§. CXLI.

Foramina ossis vel propria, vel communia sunt. E propriis per magnum, fereque rotundum, ex adunatione quatuor ossis partium factum (§. CXXXI.), medulla oblongata egreditur, et principium spinalis constituit; arteriae vero ceruicales vna cum nervis recurrentibus WILLISII ingrediuntur. *Lateralia*, infra condylos posita, septisque ossibus nonnunquam diuisa, exitum in ruis lingualibus concedunt. Supra condylos *duo in declivi* sita, ab exter-

*Foramina
ossis propria*

na superficie, per ossis substantiam interius *canalis ad instar* feruntur, venas ceruicales, quae vel sinui circulari, vel lateralibus, vel ipsis etiam venis iugularibus internis inferuntur, continentia. Reliqua minima sunt, per quae vasa vel ad ossis substantiam, vel externae venulae ad sinus progrediuntur.

§. CXLII.

et communia.

Coniunctim vero cum *mamillari ossis temporum parte*, foramina pro ingressu venarum *occipitalium* fiunt, quae tamen saepius occipiti, aliquando etiam petrosae parti propria sunt. Ad *diuerticula* venarum internarum iugularium vel ipsi processus spinosi, vel excavationes semilunares, in inferiore margine condylis lateraliter adstantes, cum superficiebus externis et inferioribus ossium temporum (§. CLVIII.) concurrunt, quorum exterioribus, multo amplioribus, et circularibus foraminibus, sanguis omnis ex sinibus a venis iugularibus excipitur. Iuxta sinus laterales descendit par vagum vna cum accessoriis WILLISII; arteriolae autem ad duram meningem adscendunt.

§. CXLIII.

§. CXLIII.

Ad *musculos*, quibus praeter liga-
mentosas partes, latior, inferior, ac
tenuior occipitis pars defenditur, et
quorum in gratiam externa superficies
inaequalis facta, varii referuntur. *Tra-*
pezii, circa processum nuchae, versus
mastioideum, impressionibus quibus-
dam infixi sunt. Infra illos, *foveae*
minores insertioni *spleniorum*, ad mam-
millares vsque apophyses sese exten-
dentium, inseruiunt. Parum ab his
distant prioribus subiecti *complexi*, qui
infra praecedentes finiuntur. Versus
processus mammillares locantur *obliqui*
minores, aliis *superiores*. Ad latus li-
neae asperae (§. CXXXVIII.) impressio-
nes parvae *rectis maioribus minoribus-*
que posticis locum concedunt. Retro
foramina pro venis iugularibus, pro-
cessibus spinosis insimul *laterales* siue
transuersales capitis inferuntur. Infra
condylos, in superficiei externae et
anterioris diuersis minoribus excaua-
tionibus *recti antici maiores* et *minores*
firmanantur: non procul autem a radici-
bus alarum pterygoidearum ossis
sphenoidalis, *cephalo-pharingaei* ter-
minantur.

*Musculo-
rum inser-
tiones.*

§. CXLIV.

Observatio-
ne.

Perpensis his, facile est diiudicatu,

a) periculofam effe, vrgente neceffitate, ofsis occipitis terebrationem, immo in decliuiori loco, et cruciformi eminentia haud admit- tendam; fiquidem ipfa partium mufculofo - tendinea ftrutura (§. CXLIII.), absque periculo et metuendis grauioribus fymp- tomatibus, haud laedi poteft, fan- guisque extrauafatus, vi specifi- cae grauitatis descendens, et in bafi cranii collectus, arte eua- cuari nequit:

b) ofsis fracturam et imprefionem fubitam inferre lethalityatem. Ob tenuitatem enim in ampliori et latiori parte (§. CXXXII.) uim maximam ferre nequit, a finuum laefione (§. CXXXVIII.) haemor- rhagia lethalis euenit, et com- preffione ac deffruftione princi- pii neruorum (§. CXXXIX.), mo- tus conuulfiui, partium omnium infenfibilitas, immobilitas, et mors illico oriuntur.

§. CXLV.

§. CXLV.

Quod reliquum est, vi sinuum directionis et excauationis sinuosae (§. CXXXVII. CXXXVIII.), LOWEVS prohibet, resupinato nimis capite dormire. *Sanguis enim, inquit, in venas iugulares adscendere potius quam descendere necesse habet; atque hinc est, quod, propter retardatum eius motum et circuitum, continuo aggestus, nec facilem exitum nactus, profundas istas foveas utrinque in capite imprimit, atque, prout homo in hoc vel illud latus quiescere solet, sinus illi plus in uno latere, quam in alio semper excavantur, cet.*

LOWERI,
de resupinato
nimis capitis
situ inter
dormiendum
sententia.

§. CXLVI.

Inter lateralia et inferiora cranii ossa, *duo decliniora, ad ossium verticis terminum posita, tempora constituunt, atque a fallaci signo, quo capilli ibi citius canescentes, vitae tempus indicare dicuntur, ossa temporum, vel quod eadem mente sepulcrum denuncient, a graecis νεότατοι nominantur.*

Ossa temporum.

§. CXLVII.

Inferiori verticis parti ita adposita sunt, ut oris superioribus bregmatis ossa, anterioribus sphenoidale, posterioribus

quibusnam
adposita sunt
ossibus?

ribus os occipitis attingant, sub coniunctione cum iugalibus caua augeant, et superficialibus cavitatibus condylos maxillae inferioris recipiant. *In genere* minorem calvariae partem efficiunt, et praecipua *organi auditus instrumenta* continent.

§. CXLVIII.

qualis illorum figura, substantia, et diuisio in statu perfecto et imperfecto?

Quoduis figuram habet irregularem, *substantiam* vero compactam, atque in imperfecto ossis statu, ex tribus propriis, in perfecto vero ex duabus constat partibus: hinc in foetu in partes *squamosam*, *petrosam* et *annularem*, mediante futura spuria cohaerentes, et in infantibus ac adultis in *os squamosum* et *petrosum* diuiditur.

§. CXLIX.

Squamosae partis descriptio.

Squamosa pars, aliis *mendosa*, est os semicirculare, ex duabus lamellis ossibus compositum, quod supra os petrosum situm, a figura et coniunctionis modo, quo, uti squama squamae, ossibus bregmatis incumbit, nomen accepit.

§. CL.

Structura illius in foetu et adulto.

Variat ipsius compositionis ratio in foetu et adulto. Lamina enim externa, quodammodo gibba, supra internam,

nam, leuiter excauatam, a puerili ad senilem vsque aetatem eminet. In foetu, licet vtraque lamella diploe nondum distinguatur, inferius tamen cellulis diuiditur, quae cavitatem tympani augment, atque ex parte superiorem cavitatis tympani parietem efficiunt. *Primordia squamosae partis*, quae TABVLAE I. FIG. IV. et V: distinctius vero EIVSDEM FIG. II. h. h., monstrant, confirmant, eandem esse ossis huius compositionis rationem, qualis in genesi ossium planorum obseruari solet.

§. CLI.

Extrinssecus latiori parte, quam radicem vocant, surgit *processus zygomaticus*, initio rectilineus, postea arcuatus (TAB. I. FIG. I. et II. nec non TAB. IV. FIG. III. v. et FIG. II.), successeue gracilescens, in foetu futura spuria, in pueris vero et adultis vera atque obliqua osi iugali iunctus. Supra *radicem* in leui ossis impressione fibrae musculi crotaphitis excurrunt, cui antrorsum adposita est *eminentia transversalis*, et retrorsum *cavitas glenoidea*. Illa eiusdem cum condylo maxillae inferioris directionis luxationem maxillae sursum et antero-

Quaenam in illius externa superficie,

ra versus quodammodo impedit : *haec* vero cartilagine crustata, interueniente tenui, mobili, et elastica lamina, in quouis latere capitulum maxillae recipit (§. CCCXXXVI.), et cum illo valido articulationis vinculo vnitur. Infra radicem eiusdem processus, *tuber* pro diuersa aetatis ratione plus minus eminet, cui extremitas annuli anterior accrescit, remanente in loco coniunctionis fissura *obliqua* et *transuersali*. Eminentiam excipit *sinuositas*, in adultis magna et profunda, meatum externum osseum augens (§. CLXIII.).

§. CLII.

*et interna
notabilia?
nec non qua-
lis vtriusque
superficie
cum parte
petrosa ne-
tus?*

Intrinssecus tam fulcus arteriae durae matris, quam gyri loborum mediorum cerebri, distincte exprimuntur (TAB. IV. FIG. I.): *vtriusque* autem *superficie* pars diuersimode cum parte petrosa concrescit siue conferuet. Medium vnionis *externae* fit supra radicem processus mastoidei, interueniente cartilagine, *internae* vero ope futurae spuriae.

§. CLIII.

Pars petrosa. Pars altera *petrosa*, asperrima, durissima, vel a structura et marmorea duritie, *lapidosa*, Graecis λιθοειδῆ, vel solum

solum a figura *pyramidalis* dicta, latiore parte siue *basi* extrorsum versus partem capitis posteriorem vergit: *anterior* autem in foetu *obtusa*, et adultis *acuminata*, *profundiusque sulcata*, ad *fellam Turcicam* tendit.

§. CLIV.

Cranii cauitatem *duabus* respicit *superficiebus*, totidemque ad collum dirigitur. Binae *marginibus* distinguuntur. *Externus* acutissimus, inaequalis est; *internus* plus minus acutus, et *profunde sulcatus*, paruum *durae matris* sinum fouet, eiusdemque processum inferiorem firmat.

Superficies illius internae et externae marginibus distinguuntur.

§. CLV.

In *superficie interna et superiore*, versus basin partis petrosae *tuberculum* inuenitur, locum canalis semicircularis superioris indicans; *foramen* autem, quod in foetu *maius*, in adultis vero *constrictum*, et in quauis aetate septo osseo diuisum est, *hiatum* siue *exitum canalis FALLOPII* indicat. Praeterea in eadem, tam *extremitas interna et superior canalis*, pro arteria carotide interna, neruoque intercostali, quam *orificium tubae EVSTACHII*, ad externum canalis latus positae, patent.

Superficies interna et superior.

§. CLVI.

§. CLVI.

*interna et
inferior,*

In *interna et inferiore* incipit *meatus auditorius internus*, quem *neruus acusticus*, *lamina piaë matris inuolutus*, subit. *Foramen coecum*, quod in foetu satis quidem magnum, et in medio sulcati marginis (§. CLIV.) situm, pro ratione aetatis, partiumque extensione, magis magisque ad *inferiorem* inclinatur, ibidemque coarctatur, atque *fibras processus transversæ duræ matris*, pro iusta seruanda firmitate et tensione, excipit. Supra illud, versus posteriorem cavitatis partem, *canalis semicircularis inferior*, per externam lamellam, nonnihil in perfecto protuberat osse; fossa autem sigmoidea, posterius sita, pro aetatis ratione plus minus profunda, lateralem vtrinque fouet sinum, obliquo ac flexuoso ductu, retro processum spinosum (§. CXXXVII.), ad diuerticulum descendentem.

§. CLVII.

*externa et
superior,*

Externa et superior concurrit ad formationem cavitatis tympani et annuli, atque *meatus auditorii externi* parietem conficit anteriorem, remanente sub coniunctione squamosæ partis cum petrosa fissura (§. CLI.), pro chordæ tympani et musculi FOLII in tympani

pani cauum ingressu neceia. Inter alia vero superficiem hæ respicit *canalis semicircularis externus*, et in omni ætate ad illum refertur *processus mastoideus*, qui a vaccini vltis similitudine *mammillaris*, Græc *μασoειδής*, dicitur. In nuper natis inticuli instar eminet, in adultis in tutum protensus verticem protuberantiori gaudens radice, quæ inferi versus condylum occipitis *profunda sulcata* est: totus autem spongiosus externo tenui osseo inuoluitur iegu-mento.

§. CLVIII.

Superficies demum *externa et inferior* externa et inferior. *parietem cavitatis tympani inferiorem* constituit, eandemque, secundo post natiuitatem anno, *processus mastoideus* et *foramen stylo-mastoideum* occupant. *Foramen* hoc vel a *situ* ita appellare, vel *inferiorem aquaeductum FALLOPII*, qui in illo terminatur, extremitatem nominare solent: *processum* vero, instar oblongi styli ad os hyoidis extensum, *γαφιοειδέα*, siue *στυλοειδέα*, a calami scriptorii, qui veteribus in vsu erat, similitudine dixerunt. *Epiphysis* hæc, quæ tertio mense in medio punctum albicans ossificationis accipit,

capit, npano subiacet (TAB. IV. FIG. . A. et z.); pro successiva tamenatus auditorii externi formatione, lineam perpendicularem erigitur. Reliquae huc pertinentes partes sūt *excauatio semilunaris*, in adultis prunda, coniunctim cum osse occipit foramen commune efficiens (§. (LII.)), et *extremitas altera ac extea* canalis, pro carotide interna (§. (V.)), qui magno et ovali foramine capit, per dimidium ossis intror-funducitur, et oblique sursum versus recuatur.

§. CLIX.

*Transitus ad
formationem
meatus ossi
ex annulo.*

Antequam ad *adplicationem superfi-*
cium, quatenus ad *formationem tym-*
pni conferunt, et diuersos illius effi-
cant parietes (§. CLVII.), progrediar:
sopriae quaedam ossi temporum ante-
ius iunctae, et ad illud pertinentes
partes (§. CXLVIII.) considerandae
sunt; inprimis vero videndum, quo-
modo ex *annulo canalis osseus* fiat?

§. CLX.

*Annulus
quid? ein-
situs et sin-
ctura.*

Annulus est circulus osseus imperfe-
ctus et elasticus, infra squamosam et
ante petrosam partem ita positus, vt
extremitates superius cum squamosa
parte,

parte, inferius autem cum externa et inferiore superficie partis petrosae cohaereant. Primo mense instar fibrae, circularis fere, tendineus est, et superius dehiscit, paulo post indurescit atque ossescit (TAB. I. FIG. II.); in foetu adhuc tenuis est, post natiuitatem vero crassior fit (TAB. IV. FIG. III. et IV.).

§. CLXI.

Vi cohaesionis (§. CLX.) in extremitates superiores, mediamque et inferiorem diuiditur. E prioribus vna anterior et superior, crassa (TAB. IV. FIG. III. x.), altera vero posterior et superior (TAB. I. FIG. III. y.), apice acuto anterieus reflexa, tenuis est. Circumferentia illius sulcata, et pro aetatis ratione plus minus coarctata, in omni aetate orificium internum canalis acustici ossei externi determinat.

Divisio illius in tres partes.

§. CLXII.

Interna annuli superficies, circa anteriorem extremitatem inaequalis, et transversim, pro fulciendo musculo FOLII, et recipienda chorda tympani, profunde sulcata, post legitimum natiuitatis foetus terminum non amplius augetur.

Interior annuli superficies post natiuitatem non augetur,

F §. CLXIII.

§. CLXIII.

sed ab incremento externae illius superficiei meatus offensus externus oritur.

Externa attingit meatum cartilagineum; ipsius vero extremitates intervallo duorum annorum in punctis omnibus augentur (TAB. IV. FIG. II. r. et s.), atque in tubae sonorae, stentoreae, resonantis, protuberantis, asperiusculæ, initio brevis et rectilineae, in medio anterioris parietis imperfectae, superius orbiculatae, postmodum autem perfectae, longioris, amplioris, profundae, obliquae, paululumque flexuosae, interno orificio angustioris, tortuosae, soni vim augmentis redigitur formam, quae in superiori intervallo et interruptionis loco (§. CLX.), a squamosae partis sinuositate augetur et perficitur (§. CLI.).

§. CLXIV.

Parietes meatus ossei externi.

Canalis hic duos habet parietes. *Anterior* est pars ossei meatus superius lata, quae in coniunctione extremitatis anterioris annuli, cum eminentia squamosae partis (TAB. IV. FIG. II. r.) flexuose incipit, et ad styliformem processum extensa, mediante crassa productione cum posteriore vnitur. *Posterior* minor canalis portio in loco cohaesionis cum processu mammillari (§. CLII. et TAB. IV. FIG.

FIG. II. s.) et anteriore pariete crassior, versus sinuositatem vero partis squamosae, cui adcrefcit, tenuior euadit.

§. CLXV.

Medium distinctionis meatus huius a tympani cauo, membrana tympani est. Tympanum tympanique membrana differunt. Illud enim a similitudine cum tympano bellico proprie tympani cauitas audit; haec vero membranam, tympano superinductam, denotat, quae aeris motum tremulum primum recipit, externum ab interno secludit, et illius iniurias nec non corpuscula, quaecunque per aerem volitantia aliaque similia ab interioribus arcet, et ita apprime defendit.

Differentia membranae tympani a tympano.

§. CLXVI.

Tympani membrana retinet situm annuli, utpote in cuius sulco expansa est, internamque insimul auget superficiem, quo radii sonori, ad centrum tendentes, et immutati in vno puncto, siue ellipticae membranae foco (TAB. IV. FIG. II. q.) concentrati, eo validiorem excitent motum tremulum.

membrana tympani, in sulco annuli expansa, retinet illius situm.

§. CLXVII.

gradus tensionis membranae differt.

Inhaeret autem sulco annuli, vel *laeve* (TAB. IV. FIG. III. B. et FIG. IV. * *), vel *strictae* (TAB. IV. FIG. II.); hinc *facile* sub separatione annuli a parte squamosa secedit, *arctius* vero in adultis inclusa, ob validiorem musculorum mallei actiuitatem, fortius insimul tenditur. Variam itaque graduque differentem membranae tensionem, ad percipiendum sonum summe necessariam fuisse, inde iudicamus, quia vniformis tensio, pro diuersitate sonorum percipiendorum haud suffecit, sed, quo illa cum omnibus sonis vnisona esset, diuersis viribus, membranam plus minus tendentibus et relaxantibus, opus fuit.

§. CLXVIII.

quatuor componitur lamellis,

Laevis haec, in vtraque superficie aequalis; et in foetu plana membrana *quatuor lamellis*, tribus nimirum externis, et vnica interna, composita est. Licet enim de modo compositionis inter se dissentiant anatomici, WINSLOI tamen et CASSEBOHMI sententiae accedo. *Externae* ducunt originem a cute et cuticula, quae vna cum subiacente perichondrio siue periosteo, per externum cartilagineum meatum inte-

interius expansae atque vnitae, ab inferiore facie *quartam* recipiunt. Haec tympani *periosteum* est, sine productio laminae durae matris externae, quae in loco, quo pars petrosa squamosae incumbit, et per futuram spuriam cum illa iungitur (§. CLII.), ad cauitatem anteriorem fertur, ibidemque internos illius parietes inuestit, offi- culis, et ligamentis, quibus inter se vniuntur, internum et externum *periosteum* largitur, foramina ouale et rotundum, marginesque interiores stapedis fulcatos, nec non canalem pro musculo mallei interno, et tubam EVSTACHII obducit, ac in progressu, vel cum membrana faucium, vel in fissura cum externo *periosteo* rursus adunatur.

CLXIX.

In recens natis *extrinsecus integumento* quodam, eiusdem figurae, vel *extrinsecus spuria et mucosa lamella obducitur.* crasso, vel tenui, *membranae analogo*, vasculis carente, tegitur (TAB. IV. FIG. III. C. et FIG. IV. *). RVYSCHIVS illius originem ab epidermide deducit, aliique cum ipso a retrocedente tympano et incipiente meatus productione, per aliquam quasi suppurationem separari affirmant. His ratione vtilitatis addunt, spuriam hanc membranam vir-

tutes praestare, quae a proprietatibus crassi inuolucri pendent, et defensionis loco datam esse, ne, si foetus utero adhuc inclusus sit, humores acredine, impuritate et foetore aliquando imbuti, tympani membranam laederent, nec in infantibus, qui surdi quasi nascuntur, a subito illabentibus radiis sonoris nimis conuelleretur. Quum vero, teste RVYSCHIO, *membrana tantum adparenter talis sit*, in aqua tepida facile dissoluatur, adeoque ob defectum essentialium vera dici nequeat; aliorum insimul auctoritate nixus arbitror, liquorem amnii gelatinosum, materiae instar caseosae integumentis foetus adhaerentem, substantia crassa et mucilaginosa, tympani membranae superinduci, ab aeris accessu exsiccari, indurari, indurataeque membranescere, donec naturali calore a cerumine auris rursus dissoluta, minimarum instar ceruminis particularum effluat.

§. CLXX.

Ne autem, reiecta hac flocculenta materia, *tympani membrana* arida fiat, prae rigiditate tensa nimis maneat, ac ab externis aeris iniuriis facile adficiatur; *utraque ipsius superficies humore quo-*

*interne et
externe hu-
more oleoso
humectatur.*

quodam oleoso illinitur. *Externam* quidem humectat *cerumen aurium*, in glandulis ceruminosis secretum; *internam* lubricat *humor oleosus*, per poros vasorum transudans, quae, iuxta D V-VERNEYI et CASSEBOHMII obseruata, furculi sunt ramorum arteriae carotidis externae, a latere musculi CASSERII incedentes, et ad medium membranae, sparsis hinc inde ramusculis, excurrentes.

§. CLXXI.

In superiore membranae loco, circa caput et manubrium mallei nonnulli cum RIVINO *hiatum naturalem* fingunt, qui tamen, si detur, excepto *praeternaturali statu*, *artificialis* est, et vel a musculo CASSERII ablato, vel ipsius loci peruestigatione oritur, praesertim quando tentata, fetam transmittendi, pressione, tenuis membrana perforatur. Argumentum, quod ab iis deduci solet, qui fumum tabaci ore susceptum per aures emittere valent, non quidem *foramen RIVINI* probat, sed qualemcumque tantum membranae inductam laesionem indicat: *experimentum* enim in omnibus, et exercitissimis alioquin in usu fumi institui nequit, sed in quibusdam tantum succedit,

*Foramen
RIVINI
non datur.*

cedit, et *illis* potissimum, qui quodam *vitio auditus* laborare videntur.

§. CLXXII.

*Cur mem-
brana tym-
pani percus-
sa resonet?*

Membrana super cylindraceum cauum diuerso gradu tensa et percussa resonat. Cautas auris resonabilis, in qua tremores omnes multiplicantur, proprie uocatur tympanum (§. CLXV.), ergo membrana tympani super tympanum diuersimode tensa et percussa resonat.

§. CLXXIII.

*Cautas
tympani
eiusque pa-
rietes.*

Est autem *tympanum*, cauum quoddam oblongum et cylindricum, in priore auris internae parte situm, diuersis inclusum parietibus. *Superior* longior latiorque, ab interno squamosi ossis interstitio celluloso (§. CL.), praecipue vero ab interna et superiore superficie perficitur, et versus aurem externam tendit. *Inferior* ac minor, colum respiciens, ab externo et inferiore latere petrosae partis oritur. *Internus*, siue tympani fundus labyrintho apponitur. *Externus* versus aurem externam protuberans, a superficie externa et superiore producitur.

§. CLXXIV.

§. CLXXIV.

Ab anatomicis in partem *anteriorem*, in parte illius anteriori *mediam* et *posteriorem* diuiditur. *Anterior* compressa et acuminata duos re notanda a) tuba EVSTACHII, continet canales, septo osseo distinctos.

Primus partem posteriorem *tubae EVSTACHII* constituit, quae pro diuersa aetatis ratione, vel a coniunctione annuli, vel coalitu meatus ossis externi cum osse petroso formatur. *Orificio* illius *externo* *tuba* iungitur ab *ALCMAEONE* Crotoniensi inuenta, et ab *EVSTACHIO* renouata. Canalis hicce conicus cartilagineo-membranaceus (TAB. IV. FIG. I. h.), ad latus internum alae pterygoideae internae, musculos inter salpingo-staphilinos, supra vuulae basin, progreditur, ibidemque orificio patulo, incrassato, lateacente, paululumque reflexo, terminatur. Efficit autem obliqua ipsius ad palati extrema et posteriora narium foramina directio, ut aer vel naribus attractus, vel ore aperto susceptus, commode ad tympanum propelli, acceptique tremores ad labyrinthum propagari possint.

§. CLXXV.

Canalis alter pro musculo mallei interno, non tantum in cauitate tympani b) canalis pro musculo mallei interno.

ni *antere* locum habet, verum etiam ad *mediam* illius extenditur. *Pars anterior*, superiori tubae parieti accrescens, *integrum* refert *canalem* (TAB. IV. FIG. I. g.), *posterior* vero *semicannalem* constituit, qui vel rectilinea, vel obliqua directione, supra cochleae tuber incedens, hamulum ad foramen ouale reflectit.

§. CLXXVI.

in media
tympani ca-
uitate a) va-
ria eminent
tubercula,

Cavitas inter anteriorem et posteriorem *media*, maxima et amplissima est (TAB. IV. FIG. I. c.), in qua varia notabilia foramina, eminentiae, auditusque organa consideranda. Nimirum infra *canalem* (§. CLXXV.) *tuberculum* eminet, cui *fulcus* ab arteriola impressus est, et sub quo *cochlea* latitat. *Alterum* versus sinuositatem recondit *canalem* semicircularem externum. *Tertium* denique partem *canalis FALLOPII* superiorem, supra foramen ouale protuberantem, abscondit.

§. CLXXVII.

6) orificium
canalis pro
musculo sta-
pedis,

Versus protuberantiam mammillarem in *apice eminentiae pyramidalis ostiolum canalis* pro musculo stapedis conspicitur, quod, quamvis *minimum* iure dicendum sit, figura tamen tam in

in foetu quam adulto differt, quum *minus* in illo, in hoc vero *magis constri-
ctum* sit. Ipse autem *canalis*, longior
in adulto, aequalem cum aquaeductu
seruat directionem, atque communem
cum illo facit parietem.

§. CLXXVIII.

Parum ab hoc in foetu, magis au- <sup>c) *canalis*
pro chorda
tympani,</sup>
tem in adulto anterieus distat *fora-
minulum internum*, siue *extremitas su-
perior canalis pro chorda tympani*, qui,
pro diuersa aetatis ratione, vel oblique,
vel in linea parallela, ante aquaedu-
ctum FALLOPII decurrit, et vel in in-
fantibus aliquot annorum ante *extre-
mitatem inferiorem canalis FALLOPII*
inferiore orificio distat, vel, propter
successiuum processus mammillaris et
canalis auditorii externi incrementum,
locum mutans, *extremitate inferiore* ad
foramen stylomastoideum accedit, et
non procul ab ipso illi inferitur.

§. CLXXIX.

Praeterea duo adhuc notabilia pri- <sup>d) *foramen*
ouale,</sup>
mo statim intuitu visus attingit fora-
mina, quorum vnum *ouale*, alterum
rotundum est. Prius perfectum iam in
foetu *superius* et *maius*, *fenestra oua-
lis* siue *labyrinthi* dictum, anteriore
facie

facie ad tympanum, posteriore ad vestibulum spectat. Interiores ipsius *margines*, superior arcuatus et inferior rectilineus, interius *fulcati*, et circa *extrema acuminati*, cum *basi stapedis*, quam mediante tenui inibi expansa membrana firmant (§. CLXVIII.), conueniunt.

§. CLXXX.

e) fenestra
rotunda.

Alterum quod a situ et magnitudine *inferius*, et *minus*, a figura vero *rotundum* et *tortuosum* dicitur, pro diuersa aetatis ratione, plus minus oblique, versus tympani partem posteriorem, ad canalem pro musculo stapedis, ex opposito fere directum est. Incipit ab ipso cochleae ossificatio, quae spirali modo, similiter, ac testae limacum, indurescere solet. Cognoscimus inde *foramen hoc* ad *cochleam solum ducere*, et recte ab illis *portam labyrinthi*, siue *fenestram cochleae vocari*, qui ad illius directionem, et ad membranae, in eius sulco expansae, resonitum respiciunt.

§. CLXXXI.

Organa, quae
in medio
tympani ad-
huc conti-
nentur, in ge-
nere expo-
nuntur.

In medio tympani diuersa adhuc *minora organa* et *machinulae mouentes* continentur, quorum in numerum quatuor auditus officula, in embryone et foetu

foetu plus minus perfecta, chorda tympani, muscoli et vasa referri solent.

§. CLXXXII.

Officulorum *primum* a figura *malleus* dicitur. Hic retro membranam tympani positus (TAB. IV. FIG. I. e.), in loco ubi annulus dehiscit (§. CLX.), partisque squamosae interstitium cellulosum cauum tympani auget (§. CL.), non procul ab extremitate annuli anteriore et superiore, punctum fixum habet. *Diuersimode diuiditur* vel in caput et caudam, vel caput et manubrium, rectius vero in caput, collum, et tres processus.

Primum auditus officulum malleus est.

§. CLXXXIII.

Caput mallei est pars officuli superior oblonga, posteriore superficie profunde fulcata, et in loco, qui partis squamosae et tympani cauitatis parietem determinat, cum incude ita adunata, ut supra punctum fixum haud moueri possit, ne libere suspensam incudem in similem abripiat motum.

capitulum illius,

§. CLXXXIV.

Post *caput mallei*, pars illius fulcata in *collo* decrescit, et in *processus* diuersae

eiusdemque processus maior,

sae

saе magnitudinis abit. Ex his *maior*, nonnullis manubrium, processus interior, et pedunculus dictus, successiue incuruatur, superficie conuexa tympani membranam respicit, et apice ipsius centro firmiter accrescit, ne sub actione musculi mallei interni ab illa diuelli possit, sed vt membrana ipsius motum sponte sequatur. (conf. TAB. IV. FIG. I. e. et FIG. II. q.).

§. CLXXXV.

minor,

Alter mallei processus *minor*, tuberculum quasi est, siue apophysis exterior, superius et anterius membranam tympani attingens, ac versus meatum externum directa.

§. CLXXXVI.

et minimus.

Tertius demum *minimus*, siue etiam interior, exilior, elatior, superior, curuaque apophysis, male dicitur RAVIANVS, cum ante ipsum iam diu detectus fuerit. Breuissima remanet pars, si a musculo FOLII, chordaque tympani separetur, in coniunctione tamen cum illis facit longiorem, tenuiorem, elasticum et curuatum processum, qui superficie concaua sulco annuli inhaeret (TAB. IV. FIG. I. f.), in adultis
ve-

vero cum anteriore canalis acustici pariete concrefcit.

§. CLXXXVII.

Secundum officulum, quod a figura *incus* vocatur, vi structuræ crassum est, superius excavatur, et circa illius sinum pro articulatione cum mallei capite (§. CLXXXIII.) fulcatus margo ducitur. A corpore duo extenduntur crura, quorum vnum longum et tenue, alterum vero breue et crassum est. In vtero iamiam perficitur, interea, situm vna cum malleo, pro ratione mutationis annuli in canalem osseum, quodammodo mutat, et extrorsum magis vrgetur. In statu ossis temporum perfecto, crure breui ad partis squamosae sinuositatem accedit, longo a maiore mallei processu, ad quem directum est, remouetur, et corpore superiori tympani parieti adpositum, mediante ligamento firmatur (conf. TAB. IV. FIG. I.).

Alterum officulum incus vocatur,

§. CLXXXVIII.

Tertium et minium totius sceleti officulum *orbitulare* vel *semilunare* appellatur. Ratione situs, *superficie inferiore* extremitatem sinuosam cruris longi incudis recipit, *superiore* autem cum

tertium est orbitulare.

cum capite stapedis mobile est (TAB. IV. FIG. I.). Quum itaque vi duplicis articulationis, et laxae ope ligamenti capsularis unionis, in omni aetate facillime separari possit, nunquam vero in apophysin mutetur (per experientiam): epiphysis incudis esse nequit.

§. CLXXXIX.

et quartum,
stapes.

Quartum denique, quod a figura *stapedem* nominarunt, in *foramine ovali* (§. CLXXXIX.) positum est, crescentibusque auris internae partibus non nihil extrorsum vergit. Distinguitur in *basin*, *crura*, et *apicem*. *Basis* constat *duobus marginibus* superiori arcuato, et inferiori rectilineo, *totidemque extremitatibus*, quarum anterior maior posteriore. *E cruribus* posterius anteriore arcuatum magis, *virumque* tamen *interius sulcatum*, cum *basi*, et *apice* seu parte crurum acuminata, exteriusque rotunde excavata, interstitium triangulare efficit, in quo membrana expanditur (§. CLXVIII.), quae, agente musculo stapedis, cum tympani membrana aequaliter tenditur (§. CXCIV.).

§. CXC.

§. CXC.

Ligamenta, quibus ossicula auditus, *Officula iunguntur ligamentis.* vel sibi inuicem, vel parietibus tympani, *ope ligamentorum*, minimis refertorum vasculis, nectuntur, oriuntur ab elongatis interni periostei productionibus (§. CLXVIII.), quae crescente tympano recedentes, ossiculorum situm quodammodo mutant.

§. CXCI.

Partes, quae tympani membranam *Chorda tympani, eius directio et usus.* ossiculaque mouent, sunt vel *chorda tympani*, vel *musculi proprii*. *Chorda*, *tympani* membranae subtenſa, tremula, elastica, similis chordis, quales in tympano bellico tympanorum pelli subtenduntur, est ramulus nerui maxillaris inferioris, qui reflexus, perpendiculariterque adſcendens, per fissuram (§. CLI.) sub fulco annuli transuerſali (§. CLXII.) tympanum ingreditur, musculo FOLII, malleoque accreſcit (§. CLXXXVI.), oblique ſupra musculus EVSTACHII, intra mallei ceruicem et crus breue incudis, retrorſum paululum descendit, ad exiguum internum et ſuperius foramen canalis proprii (§. CLXXVIII.) ſubten- ditur, et vel in canale FALLOPII, verſus extremitatem aquae ductus, vel ex-

terne cum dura portione vnitur (§. CCVI.). Qualis igitur huius chordae actio, talis quoque membranae tympani, ipsique adhaerentis mallei tensio.

§. CXCII.

Generalis
musculorum,
ossicula mo-
uentium, de-
scriptio.

Ossiculorum musculi sunt breues mallei et membranae tympani chordae, vel *stapedis* machinae motrices, quae, ad producendos sonorum varietates, minori egent tensionis gradu.

§. CXCIII.

Specialis
musculorum
mallei,

Malleo duo tribuuntur *externi* vnusque *internus*. *Primus externus* minimus, et membranaceus quasi, est *CASSERII* musculus, qui in meatu externo osseo locum habet, *processui minori* inferitur, malleum versus meatum auditorium externum trahit, tympanique membranam relaxat. *Alter* extra tympani cauum maxima ex parte situs, *obliquus*, siue *FOLII* musculus, vi compositionis ex fibris albicantibus, *ligamento* perquam similis, per fissuram (§. CLI.) ad sulcum annuli transuersalem (§. CLXII.) extenditur, externe periosteo, interne tympani chordae accrescit, et oblique versus mallei caput progrediens, *processui minimo* adnasci-

nascitur (§. CLXXXVI.) Actione illius malleus ab incude nonnihil remouetur, tympanique membrana relaxatur. *Tertius* mallei *internus* siue EVSTACHII *musculus*, magnitudine et structura a prioribus facillime distinguitur. Compositus est ex fibris carneis, in tendinem abeuntibus, atque in canali (§. CLXXV.) inuolucro proprio inuolutus (§. CLXVIII.), circa hamulum flexuosus, tendine vno, vel, vti saepius vidi, duobus, rarissime tribus, *processui* maiori mallei inseritur. Ratione insertionis tympani membranam intus retrahit (§. CLXXXIV.), renitentibus externis, ne malleus extra situm dimoueatur, simulque efficit, vt membrana, ad minimam etiam aeris tremoris variationem exquisite sentientiam, in iusta tensione et perfecto teneatur aequilibrio.

§. CXCIV.

Stapedis musculus, in canali pyramidalis situs (§. CLXXVII.), a portione dura filamentum accipit, quod per foraminulum parietis siue septi ossei aquaeductus FALLOPII canalem pro musculo stapedis ingreditur. Ascendit tendine gracillimo ad crus posterius stapedis, et in apice ipsius
et stapedis explicatio.

finitur (TAB. IV. FIG. I.); hinc ratione directionis et insertionis antagonista priorum esse (§. CXCIII.), ipsisque agentibus, stapedem iusta tensione versus partem petrosam retrahere videtur.

§. CXCIV.

Pars tympani posterior sinuosa est.

Pars tympani posterior (§. CLXXIV.) in parte petrosi ossis latiore sita, intus *cellulosa* est. *Sinuositas* haec, periosteo (§. CCVII.) inuestita, ante processum mastoideum (§. CLVII.) iam adparet, cellulaeque in medio latius a se invicem distantes spatium augent, atque inter se connexae, cauitatem (TAB. IV. FIG. I. a.), resonantem, mirifice constructam, formant, in qua aeris interni motus tremulus diffunditur.

§. CXCVI.

Pars altera auris internae labyrinthus vocatur.

Haec haecenus de priore parte auris internae. *Altera* ipsius est *labyrinthus*, siue pars ossis minor, retro tympani cauitatem sita (§. CLXXIII.), meatibus, gyris, atque circumrotationibus, *verum labyrinthum* aemulantibus, mirabiliter inflexa.

§. CXCVII.

Officatio labyrinthi.

Labyrinthus, in principio *cartilagineus*, tenui, friabili et poroso componitur

nitur ac obducitur osse, quod post natiuitatem foetus citissime solidescit, et firmissime fundo tympani (§. CLXXIII.) accrescit. (Structuram et connexionem labyrinthi cum tympano vide TAB. IV. FIG. I.).

§. CXCVIII.

Pertinent ad illum *canales semicirculares* mire intorti, *vestibulum*, *cochlea*, *meatus auditorius internus*, *aquaeductus FALLOPII*, et quae in illis continentur.

Divisio illius in diuersas partes.

§. CXCIX.

Vestibulum (TAB. IV. FIG. I. n.) est *Vestibulum quid?* cauitas inaequalis, superius elliptica, inferius orbicularis, in medio canales inter semicirculares cochleamque sub foramine ovali posita, in qua quinque canalium semicircularium orificia, extremitas posterior fenestrae ovalis, maximumque et ellipticum, ad cochleam ducens foramen, nec non minima quaedam, incerti numeri, neruorum ostiola notari merentur.

§. CC.

Versus basin petrosae partis *canales tres semicirculares* diuersis in superficiibus (§§. CLV. CLVI. CLVII.) protube-

Descriptio et divisio canalium semicircularium.

tuberantes, caua tinnula et resonantia efficiunt, et vel *situ*, in *superiorem* (TAB. IV. FIG. I. i.), *inferiorem* (TAB. IV. FIG. I. k.) et *exterio-rem* siue *anteriorem* (TAB. IV. FIG. I. l.), vel *longitudine*, in *maximum*, *medium*, et *minimum* diuiduntur. Tanquam semicanales inferioribus et superioribus gaudent extremitatibus, quae orificiis, maioris diametri, vel in vestibulo (§. CXCIX.) incipiunt, vel ibidem terminantur. In superiore quidem vestibuli loco, canalium *superioris* et *externi foramina propria oualia*, ad inuicem propius accedentia, communem formant parietem; *supremum rotundum* et *commune* a canalis superioris extremitate inferiore, et inferioris extremitate superiore, earumque concursu oritur; *infimum* vero canalis inferioris *ouale*, nec non *laterale* eiusdem et *rotundum*, tanquam *propria* distinguuntur.

§. CCI.

Cochleae
structura, si-
tus et figura.

Pars labyrinthi anterior complectitur *cochleam* (TAB. IV. FIG. I. m.), siue canalem osseum conicum, substantia tenerrima, friabili in imperfecto statu, in perfecto autem compactiori constantem (§. CXCVII.), ac te-
stam

tam limacis spirali sua fabrica exactissime referentem. Vestibulo ita appositum est, ut in basi, siue latiore et circulari parte foramine proprio cum illo conspiret (§. CXCIX.), vel a rotundo incipiens (§. CLXXX.), et in progressu acuminata, altera minoreque extremitate in tympani cavitatem protuberet (TAB. IV. FIG. I.).

§. CCII.

Composita est ex duobus gyris perfectis, cum *dimidiato* imperfecto, superiore maiore et latiore, altero minore, et tertio minimo. Omnes versus tympanum vel sibi accumbunt, vel canali auditorio interno et nucleo adhaerescunt; includitur enim cochlea conico quodam osse, quod initio caernosum, posteaque compactius, in ipsius gyros sese insinuat, et cuius pars inter meatum internum et cochleam sita, *nucleus* siue *modiolus* proprie vocatur.

Componitur ex diuersis gyris, et a nucleo inuoluitur.

§. CCIII.

Circa nucleum, eiusque in medio adscendentem *canalem conicum* perfectum, circumducuntur gyri; semigyrus autem apice angustissimo ad summam modiolii terminatur. *Laminae*

interius a laminis spiralis in duos canales conicos diuiditur.

nae spirales elasticae, longitudine sexies lineam, circa quam inflectuntur, superantes, septo, in quo chordae resonantes affixae sunt, partim osseo, partim membranaceo, in *duos conicos canales* diuiduntur. *Pars ossea* spiralis laminae, in basi latior, in apice tenuis et acuminata, a cochlea, internoque nuclei pariete fit; *membranacea* autem tenuiori ipsius margini iuncta, tensa, *zona* adpellatur, eandemque cum lamina spirali seruat directionem. Quum vero tam ab ipsa, quam gyro imperfecto et nucleo hamulus fiat, *zona*, circa concavum hamuli marginem ducta, latefcit, et *foraminis maioris*, quod proprie a scalae tympani interno pariete componitur, et cum *inferiore minore*, sub hamuli margine conuexo in tympani scala sito, *canalem scalarem communem* efficit, auget circumferentiam.

§. CCIV.

*Canalium
sue scala-
rum deno-
minatio et
distinctio.*

Canales cochleae scalae nominantur; exterior quidem tympani, et *inferior* vestibuli. *Scala tympani* est spiralis cauitas, quae a foramine rotundo incipit, et in apice cochleae finitur (§. CLXXX.). *Scala*, cuius principium *vestibuli ostium* est (§. CXCIX.),
intus

intus ad terminum prioris progreditur. *Ambae* sunt aequalis longitudinis, sed diuersae latitudinis, circa extrema, inter se communicantes, asperae, et foraminulis plus minus pertusae. In recentibus humida et vasculosa membrana inuestiuntur, neruique per illas circumducuntur.

§. CCV.

Reliquas labyrinthi partes constituunt, *meatus auditorius internus, aquaeductus FALLOPII*, et quae in illis continentur (§. CXCVIII.). *Meatus auditorius* magno et ouali orificio in superficie partis petrosae, interna et inferiore incipit (§. CLVI.), et circa mediam anterioremque labyrinthi partem in *fundum* abit, qui *eminentia arcuata* in *superiorem* et *inferiorem* diuiditur.

Meatus auditorii interni descriptio

§. CCVI.

Superior siue *minor fundus* anterieus continet *principium canalis FALLOPII*, qui in adultis latior, in infantibus angustior et imperfectus, ab inferiore et interna superficie ad superiorem et internam, relicto hiatu, (§. CLV.) procedit, inter canalem semicircularem externum, et fenestram oualem,

Principium et directio aquaeductus FALLOPII.

flexuose ad foramen stylo-mastoideum descendit, ibidemque inferiore terminatur extremitate (§. CLVIII.). Mediante septo distinguitur, et cum canale pro musculo stapedis communicat (§. CLXXVII. CXCIV.), atque in infantibus aliquot annorum finem canalis pro chorda tympani recipit (§. CLXXVIII. CXCI.).

§. CCVII.

*Periosteum
vtriusque
canalis.*

Periosteum aquaeductus est continuatio durae matris, meatum auditorium internum obducentis. Quum vero canalis cum aliis adhuc communicet (§. CCVI.), continuata ipsius interior membrana, missis per foraminula productionibus, parietes canaliculorum communicantium simul inuestit, et ad sinuositatem mastoideam delata (§. CCVIII.), in substantia cellulosa expanditur.

§. CCVIII.

*Progressus
portionis du-
rae in aquae-
ductum
FALLOPII.*

Internum meatum subit nervus acusticus (TAB. IV. FIG. I.) pia matre inuolutus. Portio illius tenuis et dura aquaeductum ingreditur (TAB. IV. FIG. I. p.), per foramina canalis ad mammillarem sinuositatem, musculumque stapedis ramulos dispergit, vnicum ad

ad duram matrem reflectit (§. CLV.), et in vltiori progressu chordae tympani iuncta, per foramen proprium (§. CLXXVIII.) egreditur, exteriusque cum ramis paris diuisi, et secundo, vel tertio ceruicalium communicat.

§. CCIX.

Mollis et crassa (TAB. IV. FIG. I. o.), *Distributio filamentorum portionis mollis in vestibulo et reliquis labyrinthi partibus.*
ante canalem in quatuor vel quinque diuisa filamenta, per *foraminula fundi inferioris* siue *maioris* intrat vestibulum, membranescit, relictis hinc inde inaequalitatibus et eminentiis, cum dura piaque matre continuat, ad labyrinthum tota extenditur, zonam efficit, canalibus omnibus cochleaeque fibrillas largitur, quae in scalaris ipsius, absque confusione circumducuntur, in canali communi scalarum uniuntur, et tandem in apice cochleae terminantur.

§. CCX.

Labyrinthus adhuc a *portionis mollis parte membranacea* abducitur. *Labyrinthus interne membrana mucosa obducitur.* Haec in recentibus auribus *mucosa* est. Talis autem mucus ipsius parietes illinit, qualis tympani cavitatem; oportuit enim in vtroque cauo contenta mollia et humida cum suis membranis seruari, ne siccata rigescerent. Humorem, hunc

hunc per vasorum poros transfudare et mora spissum reddi arbitror. Ad labyrinthum enim varia excurrunt vascula, v. g. *arteriola*, quae a ceruicalibus internis proueniens, et in cauo orbiculari meatus per foraminula quaedam fundi inferioris diuisa, canalibus cochleaeque prospicit, vel *ramus du-rae matris*, per vtramque extremitatem et hiatum, aquaeductum ingrediens. Comites habent *venas* sanguinem ad diuerticulum venae iugularis internae vtrimque reuehentes.

§. CCXI.

*Ex consensu
auris exter-
nae cum in-
terna, audi-
tus demon-
strandus.*

Quo autem ex *consensu partium* omnium mirabilium intelligatur, quid auditus sit, et quo modo audiamus? ex descriptis partibus nonnulla breuissimis repetenda, eaque principiis quibusdam phyficis illustranda sunt. Constat itaque, *duas* esse *organi auditus partes*, *exteriorem* quidem, auriculam, meatum externum, et tympani membranam; *interiorem* vero cavitatem tympani et labyrinthum, intime sibi inuicem ita iunctas, vt per externum tubum tanquam per infundibulum, sonus ad interiora propagetur.

§. CCXII.

§. CCXII.

Pars elastica exterior cum interiore durissima ad resonitum conspirat. Ad resonitum confert structura auriculæ externae, Auricula externa, cartilagineo-membranacea, mobilissimo capiti, ad percipiendum et vndiquaque excipiendum leuissimum sonum, in quouis latere adposita, diuersis gaudet eminentiis, excauationibusque, quae a variis minoribus fibrarum fasciculis ad acutiorē sonum tendi dicuntur. Ex his tres *circumvolutiones spirales* ad interiora inclinant, et ita dispositae sunt, vt *exterior zona* radios sonoros, iuxta incidentiae angulum, ad *meatum externum auditorium*, in quo, tanquam in foco curuarum eminentiarum, omnes rursus concentrantur, reflectat.

§. CCXIII.

Resonitum auget minuitue *meatus* totusque *externus* vel *osseus* (§. CLXIII.), vel meatus auditorius ex parte durissima et flexilibus compositus. qui ipsi innectitur, breuior, ellipticus, superius et posterius *membraneus*, cryptulisque oblongis minimis et flavescentibus repletus; inferius autem et anterius *cartilagineus*, ac in ipso orificii externi limbo curtis quibusdam pilis, introrsum incrispatis, instructus.

§. CCXIV.

§. CCXIV.

Ab illabenti-
bus radiis
sonoris mem-
brana tym-
pani percussa
resonat,

Tot radios accipit tuba stentorea, quot diameter conï ferre valet. Tubae basis est ipsa auricula, apex uero centrum sonorum. Ab hoc circuli puncto sonus vno momento per lineas rectas ad totam membranae tympani circumferentiam fertur, quae, ope machinularum illam mouentium, maiore vel minore gradu *tensa*, diuersimode sonat, et cum resistentia oscillat.

§. CCXV.

omnes inter-
nae partes
contremis-
cunt,

Quum vero in aure nullus inueniatur locus, vbi non *soni* fiat percussio, *reliquae omnes internae partes*, in celerem motum abreptae, insimul *contremiscunt*, tremorum celeritas cum chordarum breuitate increfcit, sonique fiunt acutiores.

§. CCXVI.

et auditus
fit.

Si haec contremiscentia cum corpore, quod aerem mouet atque mutat, vt sonus nascatur, harmonica sit, *audimus*. Ad celerem autem et valentiorum motum auri intimae communicandum opus est, vt aer internus ab elliptica membrana prius densetur et percutiatur, atque ad augendum *sonitum*

sonitum, ad fornicatam sinuositatem mammillarem adigatur (§. CXC.V.).

§. CCXVII.

Internus aer, externo resistens sub expiratione, et sternutatione per tubam EVSTACHII, vna cum humidis sordibus *repurgatur*, et ad externi similitudinem mutatur. Si vis interni superet actiuitatem externi, et membranam tympani nimis extrorsum, introrsum vero stapedem premat, tremoris communicationem cum neruo intercipit; hinc facile perspectu, cur auditus post sternutationem acutior sit? et quare ore hianate, naribus apertis, tensis auribus, et cohibita respiratione, partibus integris, et ad iustum tensionis punctum cum externo sono harmonice tensis, *sonus*, hoc est illud, quod audiri potest, exactissime percipiatur?

Ad tremoris communicationem ista aeris interni requiritur elasticitas.

§. CCXVIII.

Officulis ab aere interno commotis, chordae tam tympani, quam stapedis, tensae, nec non filamenta ad sinuositatis periossteum pertingentia (CCVIII.), motum durae portioni imprimunt, et membranae in foraminibus ouali (§. CLXXIX.) ac rotundo (§. CLXXX.)

communicatio motus tremuli cum labyrintho,

expansae mouentur. Per priorem viam portio mollis, in uestibulo canalibus et cochlea distributa, a tremente stapede (§. CLXXIX.), contremiscit, nec non nerui canalium et scalarum in apice cochleae communicantes (§. CCIII.) agitantur; per posteriorem vero breuioremque nerui spirales (§. CCLX.) tantum tremunt, et zona, laminae spirali adfixa (§. CCIII.), resonat.

§. CCXIX.

*et propagatio
illius ad sen-
sorium com-
mune.*

Pro eo autem, ac interiores organi auditus partes densitate, raritate, mole, figura, motuque mutantur, mutantur *superficies nerui acustici*, et hisce mutationibus conuenientes fiunt repraesentationes in mente. Tremor excitatus facit concussionem infinite paruam *in sensorio communi*, *neruusque sentit*, dum ad cerebrum propagatur; *levis* enim impressio, quam neruus acusticus accipit, sensus dici nequit, quem *auditum* adpellamus; sed ad illum, pro ratione praepositi organi, producendum requiritur, *idea*, huic mutationi corporeae definita atque determinata, quae in ente, quod repraesentationem totius vniuersi habet, eodem momento repraesentatur, ac ipsa *nerui superficies*
a tre-

a tremore et contremiscentia partium omnium in aure interna adfcitur.

§. CCXX.

Quum itaque, *ad auditum* partium *Observatio-*
 omnium auris externae et internae in-*nes.*
 tegritatem et consensum requiri, de-
 monstratum fuerit; ex opposito ratio-
 nes surditatis, et quae sub hoc praeter-
 naturali statu in aure alterata et laesa
 sint, tam ex institutis *experementis*
 quam collectis *observationibus* intelligi
 possunt. Quodsi igitur

I) illapsus radiorum per tubas ad
 tympanum eiusque membranam
 praecclusus sit, tympani membra-
 na vel nimis sicca, vel relaxata,
 aut rupta, vel ipse neruus vitia-
 tus sit, vel instrumentorum orga-
 ni auditus dissolutio facta; *vera*
oritur surditas, quae intuitu oc-
 cultarum et profunde saepius lati-
 tantium caussarum, spem sanatio-
 nis promittit nullam.

II) Rupta membrana tympani, liga-
 menta ossiculorum constringun-
 tur, chordae breuiiores obrige-
 scunt, tympanumque a peregrinis
 in aere circumuolantibus cor-
 pusculis repletur.

H

III)

III) Stupores nonnunquam motusque totius corporis conuulsuos a moleculis extraneis, auribus intrusis, excitatos fuisse, obseruatum fuit.

IV) Quando in statu surditatis sub valida aeris inspiratione, distentis buccis, et cohibita expiratione, aer in tubas cogitur EUSTACHIANAS, hic vero per πύλον ἀντιστοῖν rursus egreditur: nulla spes restitutionis auditus adfulget.

V) Exulcerationes tympani membranam laedunt, ossicula dissoluant, cariosa reddunt, foraminum membranas adficiunt, nervum destruunt, indeque tremoris communicationem intercipiunt.

VI) Ductus Alcmaeonis obstructus teste CELSO gargarisatione aperitur. Naturaliter, propriis naturae auctis visibus, v. g. sternutatione, exscreatione, a fordibus repurgatur. Si obturetur vel constringatur, impedit, quo minus fortissimus etiam percipiatur sonus; hinc clausis in angina tubis, turgentibus et inflammatis partibus

bus interioribus faucium glanduloso-musculosis, homines obsurdescunt; cessante vero causa, cessat insimul effectus.

VII) Si tuba in lue venerea a materia acri et corrosiva exulceratur, auditus in loco adfecto perit.

VIII) Testatur experientia surdos aliqualem percipere sonum, si vel ori hianti voces immittantur, vel super eorum caput loquutus fueris, vel stridulum quoddam corpus, ab ipsorum dentibus firmissime teneatur. Radii enim sonori in tuba EVSTACHIANA collecti, tremorem partibus in labyrintho contentis imprimunt; immo recursus corporum reperiuntium efficit, ut, tremente inter dentes metallo, totum caput, adeoque partes omnes nervosae contremiscant.

IX) Terebrae applicatio in squamosa parte a quibusdam reiicitur; ab aliis vero certis sub conditionibus et cautelis admittitur. Posteriores ante operationem, ligata arteria temporali, partes denudare iubent; priores, ad dignitatem et

necessitatem vaginae, tendinisque crotaphitis musculi respicientes (§. LXVIII.), laesionem musculi rem discriminis plenam esse arbitrantur. Metuunt symptomata periculosa, ob consensum vaginae cum cerebro, et communicationem adfectionis cum mandibula; sed ex obseruationibus, ab auctoribus in contrarium adductis conuincimur, eiusmodi operationem urgente necessitate, suscipi posse.

§. CCXXI.

Quibusnam
musculis ossa
temporum
stabilitatem
praestent?

Examinandi adhuc restant *musculi ossibus temporum infixi*. Vtrinque *crotaphites*, missis nonnullis ad os frontis, sincipitis et sphenoides productionibus, superficiem externam squamulae partis obtegit, fibras ipsi imprimit, margini processus zygomatici superiori adhaeret, tendineque latiore sub iugo prouenit. *Margini processus zygomatici inferiori portio masseteris inferitur*. *Musculi*, qui concham mouent, aurem leniter retrahunt, meatumque externum dilatant, *elevator* et *retractor auris* sunt. *Priores* incumbunt superiori vaginae tunicae, et ad anteriorem et superiorem auris partem tendunt;

dunt; *posteriores* saepius processibus mammillaribus adhaerent. Eadem protuberantia in fulcis profundis versus apicem *digastricos*, *sterno-mastoideos*, in reliquis partibus *partem spleniorum*, et *trachelio-mastoideos* firmant. A processibus styloideis *ligamenta* ad cornua ossis hyoidis extenduntur, musculique *stylo-hyoidei*, *stylo-glossi* et *stylo-pharyngaei* oriuntur. E *stylo-pharyngaeis* in dextro latere adulti hominis *duplicem* nuper vidi. Aderat *stylo-pharyngaeus* naturali situ et directione; *stylo-glossus* vero rursus in *duos* distinctos *musculos* diuidebatur. *Portio* vna *carnea*, inferiori latere in radice linguae finiebatur, *altera* supra *pharyngaeum*, ad latus pharyngis oblique descendebat. Ceterum in quovis latere ab extremo ossis petrosi incipit *petro-pharyngaeus*.

§. CCXXII.

Ossibus temporum, et reliquis calvariae cunei ad instar infixum, in basi cranii situm, et maxillam superiorem maiori ex parte sustentans, indeque ad orbitas et nares extensum, a situ vocatur *cuneiforme*, et *basilare*, a figura *πολύμορφον*, multiforme, vel *σφηνοειδές*, recius *σφηνοειδές*, os *vespiiforme*,
Os cunei
forme,

quod figuram insecti volantis referre videtur.

§. CCXXIII.

ex quibus
partibus
constet?

In *embryonibus* quinque constat *frustis*, *tribus* in *recens natis*, corpore scilicet imperfecto, et perfectis lateralibus partibus, quae paullo post una cum basi in unum coalescunt os.

§. CCXXIV.

qualem sub-
stantiam ha-
beat?

Initio in medio cartilagineum, postea spongiosum, et tenui cinctum lamella, insigniter crassescit, in partibus lateralibus hinc inde extenuatur, eiusque duplex lamina ossea ab interiacente cellulositate distinguitur.

§. CCXXV.

Processuum
clinoideorum
sinusque in-
termedii de-
scriptio.

Intrinscus in basi superius et anteriorius, ac posterius et inferius eminent *processus clinoidei*, qui cubile quasi referentes, in sinu intermedio, siue *sella Turcica*, *sphenoidali*, seu *fossa pituitaria*, glandulam fouent *pituitariam*. *Anteriores* duo tenuiores, a latiori basi in acutissimos lateraliter desinunt; *posteriores* latiores, minores, et breviores cum prioribus nonnunquam confluunt, et in declivioribus locis fulcatis carotides internas recipiunt.

§. CCXXVI.

§. CCXXVI.

Lateralter duae *protuberantiae* maxillae, *temporales* siue *laterales* diclae, basi iunguntur, quae in principio latiores, circa coniunctionem cum ossibus temporum frontisque paululum coarctatae, interius excavantur, medios cerebri lobos excipiunt atque tuentur, et ad basin cranii formandam concurrunt.

qualis interna partium temporalium superficies et figura?

§. CCXXVII.

Interna partis crassissimae substantia in foetu cellulosa (§. CCXXIV.) non nunquam in adultis adhuc spongiosa, magis magisque dehiscit, et *exterius* in *binas* ut plurimum abit *cauernas*, tenui septo osseo diuisas. *Sinus* uocantur *sphenoidales*, qui foraminibus subrotundis non procul a septo narium in posteriora eorum caua hiant, illaque augent. Dant spatium expansioni *tunicae SCHNEIDERIANAE*, in qua humor secretus et collectus, sub situ capitis prono in narium caua effluit.

sinuum sphenoidalium formatio.

§. CCXXVIII.

Processus laterales exterius conuexi, paulatimque extenuati extremitatibus oblongis et oblique positis in *duo latera* diuiduntur. *Horum maxima* ad

diuisio processuum lateralium, quoad superficiem externam, vel in latera maiora,

tempora et fincipitis ossa ducta (§. CCXXXIII.), non procul ab alis externis duos *exiguos spinosos et styli-formes* emittunt *processus*, pro ingressu arteriarum *perforatos*, et accumbentibus tubis cartilagineis leuiter *fulcatos*.

§. CCXXIX.

vel minora,
sive superiora
et orbitalia.

Superiora et plana exteriores et posticas orbitarum faciunt partes, immo in concursu cum radicibus processuum anteriorum supereminentium (§. CCXXV.), circa neruorum opticorum egressum, *superiores* pariter definiunt.

§. CCXXX.

Processus
pterygoidei

Vbi latera cum corpore coeunt, crassioribus radicibus deorsum vergunt *processus pterygoidei*, h. e. *aliformes*, a πτερυξ ala, et εἶδος forma, circa maxillam superiorem, quam in nexu cum palatinis firmant, eiusque infimam partem curuatim dehiscentes.

§. CCXXXI.

eorum di-
uisio.

Harum alarum quaedam vel versus se inuicem, vel ad maxillam inferiorem directae sunt. *Illae internae*, hae vero *externae* vocantur. *Quaelibet* rursus in similes superficies, vel parietes,

tes, distinguenda, ex quibus in parte postica cauum fit alare magnum, oblongum, et ad excipiendos musculos satis profundum.

§. CCXXXII.

Interna, in principio crassa, in sulcatum attenuatum, extrorsum curvatum, ac relicto interstitio, sinuosum exporrigitur *hamulum*. *Externa* latior, tenuiorque, retrorsum magis ducitur. *Omnes* in vniuersum definitis quibusdam musculis sedem fixam præbent, in specie vero *internæ* coniunctim cum ossibus palatinis, narium cauitates posteriores, *externæ* vero basin cranii firmant.

figura, directio, et usus.

§. CCXXXIII.

Totum inter capacissima ossa terminatur. *Anterius* nimirum, quoad basin cum *processibus* tenuioribus *ossibus cribrosi* (TAB. IV. FIG. VII. L. L.), et *posterius* inaequali superficie cum ossibus *petrosis* (§. CXLVII.) et *occipitis* (§. CXXXIV.) cohaeret. *Partes orbitarum posticae et superiores* iunguntur *frontali* (§. CX.) *planis* et *cauernoso* (§. CCXLVI.). *Processus temporales* se in *coronale* (§. CXIV.) *verticalia* et *squamosa* insinuant (§. CXXVI.).

Connexio ossis sphenoidalis cum omnibus cranii et diuersis faciei ossibus.

tera interna plana extremitatibus oblongis ac inaequalibus excipiunt *iugalia* (§. CCXCIII.). *Alae internae* *cauitates pterygoideas* ossium palati replent, portionesque nasales firmant (§. CCLXXXVI.). *Sinus sphenoidales* a cauitatibus posterioribus *portionum* super orbitalium *ossium palati* non nihil augmentur (§. CCLXXXV.), atque ex parte a *processibus posterioribus ossis ethmoidalis* teguntur (§. CCXLVI.). Tandem vero *vomer* margine superiore *eminentiae*, inter alas internas positaе, et ex ipsa ossis substantia enatae, adponitur (§. CCCXVIII.).

§. CCXXXIV.

*Interna
quaedam
propria ossis
foramina.*

A coniunctione quoque cum non nullis cranii et maxillae ossibus *fissurae irregulares* et *foramina communia* fiunt: *plurima* tamen propria sunt. E *propriis internis*, in parte processuum clinoidaeorum anteriore et latiore *duo* occurrunt *orbicularia*, pro nervis optici, *canalium* ad instar in fundis orbitalium *latiora*, et in basi cranii *angustiora*. Superius pro arteriolis, ad tunicam oculorum choroidem progradientibus, *fulcata*, inferius vero *septo osseo* satis firmo et crasso ab incisuris, quandoque etiam *perfectis foraminibus*,

minibus, arterias corotides internas admittentibus, distincta sunt.

§. CCXXXV.

Post fissuras superiores *minima* in *veliqua huc pertinentia.*
 ella Turcica adparent *ostiola*, per quae vascula in ossis substantiam penetrant: raro autem *foramen* inuenitur, quo subiectus sinus in cauum cranii patet. Ab his distinguendi *canales*, quorum *ostia* supra oualia eminent, et qui oblique adscendendo *sulcum* cuius fellæ equinae lateri imprimunt, externe vero supra alas pterygoideas *minoribus* et *compressis orificiis*, pro ingressu tertiorum emissariorum SANTIORINI, ad sinus sphenoidales aperiuntur. *Reliquis* demum, ad latera fellae Turcicae temporalibus processibus inculptis, adnumerantur *duo rotunda* pro nervis maxillaribus superioribus, *rotidemque oualia*, nervos maxillares emittentia, et secundos emissarios admittentia, nec non *minora* pro arteriis cluræ matris, in partibus ossis sphenoidalis *angulosi* et *spinosis* conspicua (§. CCXXVIII.).

§. CCXXXVI.

Quoad externa, pterygoidea radices alarum propria sunt: quae vero aut *Externa vel propria, vel communia sunt.*

aut a *coniunctione* portionum nasalium ossium palati cum radicibus alarum internarum, et portionum orbitalium dictorum osliculorum cum finibus sphenoidalibus (§. CCLXXXV.) oriuntur, aut tanquam *perfecta* in superiore parte portionum nasalium ossium palati observantur, pro diuersa formationis ratione, vel *spheno-palatina* vel *palatina* appellantur. *Vtraque* vasis nervisque viam ad narium caua concedunt.

§. CCXXXVII.

Fissurae orbitales superiores,

Processus clinoidei anteriores in *coniunctione* cum marginibus asperiusculis et latisimis portionum temporalium *fissuras* faciunt longas, irregulares, in principio latas, in progressu successive angustatas, et versus superiorem marginis acuti extremitatem sulcatas, *sphenoidales*, siue *spheno-frontales*, ab aliis *orbitales superiores* dictas. Has vtrimque ingrediuntur tam rami carotidis externae, sulco accumbentes, quae in progressu ad partem durae matris anteriorem, arteriae durae matris, vel WEPFERI anteriores vocantur, quam venae sanguinem ad sinum ophthalmicum reuehentes, siue primi SANTORINI emissarii. E contraria par-

parte e cranio, praeter laminam durae matris externam, ad oculorum tunicas musculosque diuisa egrediuntur nervorum paria a) oculos motorium b) patheticum, c) neruus primus paris diuisi seu ophtalmicus, et d) oculos cingens.

§. CCXXXVIII.

Fissurae orbitales inferiores, siue *et inferiores* sphenomaxillares a coniunctione ossis basilaris, maxillarium (§. CCLXXVII.), iugalium (§. CCXCV.), et portionum orbitalium palatinorum (§. CCLXXXV.) oriuntur. Quaelibet *anterius* latior auctaque, *posterius* paulo angustior, introrsum iuxta directionem ossis palati sui lateris versus proximum sinum sphenoidalem ducta, reflectitur. Quamuis vero cuiusvis *interstitium* a periorbita repleatur: hoc non obstante admittit ramum carotidis externae, venulam emittit ad iugularem externam, et neruum maxillarem superiorem ad proprium ducit canalem (§. CCLXXV.).

§. CCXXXIX.

E musculis, in quouis latere, *temporalis* lateralem externam tegit partem, et ad marginem vsque fissurae sphenomaxillaris accedit. *Pterygoides inter-*

Partes,
quibus os
sphenoidale
nonnullis
musculis locum
cum fixum
praebet,

nus

nus ab alae externae interna sinuositate incipit, et *externus* ex parte quoque ab externa ipsius superficie oritur. *Buccinator* obseruante SANTORINO, ad externos usque processus extenditur. *Pterygo-staphylinus internus* alam internam non attingit, sed per velum palatinum ad vuulam tendit; *externus* a parte suprema processus pterygoidis, anteriore tubae, et processu spinoso oritur, in cauo alari profundo situs internam alae internae superficiem occupat, tendinemque supra *hamulum* (§. CCXXXII.), tanquam supra trochleam, reflectit. Tandem *spheno-pharyngaeus*, aliis *pterygo-pharyngaeus* in radice alarum pterygoidearum punctum fixum accipit.

§. CCXL.

Observatio

Quamuis *os cuneiforme* a vicinis connexis partibus probe muniatur et defendatur: interdum tamen, sed *rarisime*, ab ictus vel lapsus violentia *laeditur*. Vidi in puero vndecim annorum, qui aliquot dies post acceptum capitis vulnus, et illatam per lapsum cranio iniuriam, moriebatur, fracturam dextri bregmatis circa futuram sagittalem, et fissuram per medium

dium occipitis ad fellam equinam per-
tingentem.

§. CCXLI.

Fissurarum orbitalium quum sit *qualia per*
contraria directio (§. CCXXXVII. *fissuras infla-*
CCXXXVIII.), *superiorque* vtrimque *cta vulnera*
cum basi cranii, et *altera* cum partibus *periculosa*
capitis posterioribus, communicet; in-
strumento acuto pungente vel secante
inflicta iisdem *vulnera plus minus peri-*
culosa sunt, et lethalis maxime ictus,
qui per orbitae superiorem fissuram,
cerebrum nervosque inde egredientes
laedit; minus periculosus, qui per fis-
suram orbitalem inferiorem posterius
ad musculos penetrat.

§. CCXLII.

Vltimum cranii os, quod ab osibus *Os cribro-*
frontis et sphenoidis arcte inclusum *sum*
est, Graecis audit *ῥινοειδὲς*, et a lati-
nis vel *cribriforme* uocatur, cum instar
cribri plurimis in locis foraminulis per-
tufum sit, vel ab acuto, et cristae
gallinaceae in modum exfurgente pro-
cessu (§. CCXLIV.), *cristatum* appella-
tur.

§. CCXLIII.

§. CCXLIII.

substantia
illius in sta-
tu perfecto
et imper-
fecto.

In statu imperfecto substantia gaudet *cartilaginea*, in perfecto, *spongiosa*. Tardius *crista galli*, lamina transuersali septoque, perficitur: citissime vero partes *spongiosae* et ossa plana ossescunt.

§. CCXLIV.

eiusdemque
diuisio a, in
laminam
transuersa-
lem perfora-
tam,

Diuidi solet in partem superiorem, duas laterales, et inferiorem. Superior et transuersim polita, laminam facit *cribrosam*, longam, tenuem, irregulariter perforatam (TAB. IV. FIG. V. E. E.), e qua anterieus *crista galli* surgit, (TAB. IV. FIG. V. F.) siue processus crassus, acutus, solidus, et pro augenda frontali sinuositate leuiter sinuatus, posteriora versus in lineam desinens eminentem, qua vna cum ipso processu lamina media quodammodo bipartitur. Minimum inde confert ad cranii cauum, quum potius per nares et orbitas extendatur; interea anterieus cranii cauitatem perficit, simulque illam a naribus distinguit. A quibusdam etiam in tres dispescitur partes, ac sub *anteriore* *crista galli*, *media*, transuersalis lamina, et *posteriore* demum, septum narium osseum intelligitur.

§. CCXLV.

§. CCXLV.

Cristae galli oppositum est *septum osseum* (TAB. IV. FIG. VI. H.), satis *b) partem inferiorem sine septum osseum,* crallum, in linea recta ossa cauernosa seiungens. *Anterius* ab ossibus nasi frontisque, *posterius* et *superius* a sphenoidali, *inferius* autem et *posterius* a vomere recipitur, et coniunctum cum vomere, interposita cartilagine, diaphragma narium efficit (§. CCCXVIII.).

§. CCXLVI.

Laterales intrinsecae ossis continuae *et c) ossa spongiosa superiora, quibus continuant tam processus posteriores,* partes, sunt fragiles, tenerrimae, tortuosae, multiplices, inaequales, cauernosae circumuolutiones, *labyrinthum narium* configurantes. Ossa haec (*spongiosa, seu turbinata superiora* (TAB. IV. FIG. VI. I. I.)), *superius* narium caua replent, laminae ossis cribrosi transversali, planisque continua sunt, et quibusdam cranii et faciei ossibus v. g. frontis, vnguis, maxillaribus superioribus, palatinis, ac sphenoidali diuersis oris *harmonice* iunguntur. *Partibus inferioribus* in *processus* abeunt *minores* et acuminatos, figura et structura *peculiaris* quasi *ossicula minima turbinata* referentes, qui *superioribus*, fibris ossibus leuiter cohaerent (TAB. IV. FIG. V. G. G. et VI. I. I.), in coniunctio-

ne cum aliis, interius *vomerem* in loco, quo eminentiae ossis sphenoidalis insistit (§. CCCXVIII.), attingunt, et finibus sphenoidalibus, a quibus non nisi difficili labore vna cum superioribus separari possunt, subiacent, eosdemque claudunt (TAB. IV. FIG. VII. L. L.).

§. CCXLVII.

quam ossa
plana.

Praeterea *partes laterales* (§. CCXLVI.) in orbitis portionibus tenuibus, laevigatis, oblongis, nec adeo latis, *anterius ossibus* vnguis, *superius* frontali, *inferius* maxillaribus, *posterius* portionibus orbitalibus palatinorum interponuntur. *Hae* ob planitiem et tenuitatem vel ossa *plana*, vel *papyracea* vocantur (TAB. IV. FIG. V.), maximam interioris orbitalium parietis partem efficiunt, et per foraminula transitum nervis vasisque concedunt (§. CCXLIX.).

§. CCXLVIII.

Cuiam vsui
totum os in-
serviat?

Praecipua totius ossis, ex diuersis partibus compositi, *utilitas* in eo consistit, vt opplendo narium caua (§. CCXLVI) muci officinam constituat, Etenim non separatur solum in tunica pituitaria, cellulas ipsius inuestiente, mucus,

nucus, nares ab ariditate nimia praeteruans, verum in ipso *labyrintho* particulae odoriferae, mediante aere adaptatae, ad tempus retinentur, quo diutius nervos olfactorios inibi expansos, pulposos, fibrillasque, laminam perforatam transeuntes, adficere possint. Quo copiosiores autem et anfractuosae magis ossium cauernulae, eo viuacior sensus odoratus; qui, ne, unico atere forsan obstructo, totus periret, sed cum reliquis sensibus duplicia quoque essent odoratus organa: os cribrosum osseo diuiditur septo.

§. CCXLIX.

E foraminibus notanda a) lamina *transuersalis* (TAB. IV. FIG. E. E.), pro processibus mamillaribus, nervis olfactoriis, vasculisque irregulariter perforata (§. CCXLIV.), b) *coecum*, commune illud, durae matris fulcrum (§. CXV.), et c) *foramina interiora* tam *anteriora*, quam *posteriora* (§. CXVII.).

*Repetitio
quorundam
foraminulo-
rum.*

§. CCL.

Ceterum *tenerrimum* hocce os ratione *Observatio-
nes.* *structurae* et *situs* in *pertinacioribus* *variarum* et *oculorum serosis ac impuris* *adfe-*

adfectibus citissime corruptioni obnoxium est.

I) In grauiori *ozaenae* specie non ossa spongiosa solum vitiantur, verum etiam septum, maxillaria ossa, cranii sinus, immo ossa nasi eroduntur, difficillimeque pars corrupta separatur et expurgatur.

II) *Aegilops* acri et erodente materia non cutem tantum, saccum lacrymalem, pinguedinemque corrumpit, verum etiam ossa plana, ac reliqua naso vicina, periculosa interdum carie destruit. Meminit iam huius CELSVS lib. de re med. VII. c. VII. p. m. 218. ubi: *Etiamnum in angulo*, inquit, *qui naribus propior est, ex alio vitio, quasi parua fistula aperitur, per quam pituita assidue destillat, αἰγίλωπα Graeci vocant, idque assidue male habet oculum, nonnunquam etiam, exeso osse, usque ad nares penetrat, idque interdum naturam carcinomatis habet.*

III) *Fistula lacrymalis cancrofa*, ex ossibus planis, vnguis, cellulis ethmoidalis ossis, vicinisque partibus, periculosa et insanabilis est.

§. CCLI.

Omnia cranii ossa inter se vnita con-
siunt globosum fere illud receptaculum,
anterius paullatim angustatum, poste-
rius capacissimum, lateraliter ad inte-
riora depressum, intus maxime excaua-
tum, cerebrum totum sustinens, illud-
que ab omni periculo defendens, extus
vel laeuigatum et sinuosum, vel aspe-
riusculum, et pro ratione partium diuer-
forumque organorum, quibus locum
fixum praebet, pulchre formatum.

*Cranii ossa
coniunctim
maximum
pro cerebro
faciunt con-
ceptaculum,*

§. CCLII.

Conceptaculum autem hoc in duo abit
loculamenta. Prius superius et maius
latissime in ambitu sese extendit, et
mediante processu faliformi, qui ab
eminentia sursum versus acuminata
(§. CCXLIV.), et foramine coeco (§.
CXV.) angustus incipit, infra futuram
sagittalem (§. CXIII. CXXVIII.) la-
tescit, et in centrali et crassissima ossis
occipitis parte in septum transuersum
mutatur (§. CXXXVIII.), bipartitur.
Posterior a priori, productione durae ma-
tris transuersim expansa, separatur, in-
ferius positum est, minusque occupat
spatium.

*quod a pro-
cessu falci-
formi bipar-
titur, et a
septo trans-
uersali in
maius et mi-
nus diuidi-
tur.*

§. CCLIII.

*Divisio fun-
di cranii
fornicati in
anteriorē
elatiorem,
laterales pro-
funde exca-
vator,*

In specie cerebri camera triplici gau-
det fundo, qui ab omnibus ossibus cranii
fornicatur, et ab eminentibus acutissimis
marginibus processuum clinoideorum
anteriorum in coniunctione cum ossi-
bus frontis et ethmoidali, nec non a
protuberantibus internis ossium petro-
forum marginibus (§. CLIV.), in an-
teriore, laterales et posteriorem distin-
guitur. Anterior propter orbitas ela-
tior, asper et inaequalis est; laterales
pro mediis cerebri lobis profunde exca-
vantur. Portionibus prioris ex parte
conuexis, profundius lamina ossis cri-
brofi transversalis, vna cum crista gal-
li interponitur (§. CCXLIV.); excaua-
tionibus vero lateralibus pars eminens
ossis sphenoidalis interiicitur (§.
CCXXV.).

CCLIV.

*et postero-
rem priori-
bus latissi-
mam.*

Posterior demum cerebelli medullae-
que oblongatae concameratio latissima,
profunda, et quoad maximam partem
laevis et aequalis est. In partibus ipsius
sinuosis, eminentia diuisis, locantur
cerebelli lobi (§. CXXXIX.), et in sinuo-
sitate, a processibus posterioribus ossis
multiformis, ad marginem foraminis
magni

magni vsque fouetur medulla oblongata; *sigmoideae* vero *foucae*, peripheriam cerebelli terminantes, a *sinibus laterilibus* replentur (§. CXXXVIII.), et *processus horizontaliter exporrectus*, sulco profundo ossis occipitis inhaerens, marginibus acutis ossium petrosorum accrescit, versus clinoides processus anterieus extenditur, postea iusque a medio infra crassissimam occipitis partem, processum tenuem supra eminentem lineam (§. CXXXVII.) perpendiculariter dimittit, qui non procul a limbo foraminis magni, iuxta impressionem in ipso osse conspicuam, lateraliter dehiscens, marginem internum foraminis magni ambit.

§. CCLV.

Ne autem cranii ossa sub incremento vel sponte, vel leuioribus ex causis statim recedant: tam parietibus latioribus, quam marginibus, acuminatis eminentiis, diuersis fulcibus, aptissime congruentibus, se inuicem, proximaeque excipiunt ossa. *Plana*, quorum praectae, radiorum instar, fibras osseas spargunt (§. XXXIX.), ita successiue nutantur, vt omnes sibi inuicem superimpositae squamulae in statu perfecto duas tantum solidas, mediotullio

Modus formationis futurarum, earumque in veras et spurias diuisionis.

distinctas forment tabulas (§. CIV.). *Extrema* fibrarum, *relictis fissuris*, *per-
estinatim* struuntur, ac in *eminentias*
dentatae ferrae abeunt *rectas*, *obliquas*,
curuas, plus minus *acutas*, *sulcis* e
diametro *oppositis*, firmissime et *arti-
ficiose* intertextas. *Alia* aliis, instar
squamarum, incumbunt, et exiguis
tantum hinc inde eminentiis, pro loci
opportunitate et necessitate, conglu-
tinantur. Itaque mirum non est, qui
factum fuerit, vt *suturae*, seu com-
missurae, certam connexionis ossium
cranii et faciei speciem referentes, di-
uisae fuerint, in *veras*, *extrinsecus* ma-
gis conspicuas, latioresque, *intrinse-
cus* autem obscuriores et exiliores, nec
non *spurias*, dissimiles valde, latiores,
gracilioresue.

§. CCLVI.

*Verarum
species.*

*Verarum prima est transuersa coro-
nalis*, Gr. *σεφανίτης*, quae ab ossibus
coronali bregmatisque circumscripta
semicirculariter ad tempora extenditur.
Altera eaque media, *sagittalis*, Graec.
ἰσολοιᾶια, a medio coronalis recta per
verticem ad medium lamdiformis ten-
dit, in adultis nonnunquam a radice nasi
incipit (§. CVII.), rarissime vero os oc-
cipitis diuidit. *Posterior* demum,
quan-

quandoque duplex, a similitudine lit. Α λαμβδοειδής dicta, per occiput et aures, late a se inuicem distantes, transuersim et oblique procedit, circa finem sagittalis acuminatur, et os occipitis ab ossibus bregmatis temporumque diuidit.

§. CCLVII.

Ad *spurias* pertinent sic dictae *mendosae* siue *squamosae conglutinationes*, Ad *spurias*
referuntur
squamosae, λεπιδοειδῇ προσκολλήματα, quibus ossa minus, quam *veris* implicantur, et instar *mutuo incumbentium squamarum* committuntur. *Eiusmodi* praecipue videmus in vnione ossium squamosorum, semicirculariter super aures exporrectorum, cum ossibus bregmatis (§. CXLIX.), *similemque* obseruamus in connexione partium lateralium ossis cuneiformis cum squamosis, et verticalibus (§. CXXVI.), partibusque frontis tenuioribus (§. CXIV.), nec non, quoad faciei ossa, in coniunctione iugalium ac palatinorum cum maxillari-
bus superioribus (§. CCLXVI. CCLXXXIV.).

§. CCLVIII.

Reliquae suturae spuriae, tam ossibus faciei, quam quibusdam cranii sic dictae
communes et
harmoniae.
I 5 pro-

propriae, *in genere communes*, vulgo *transuersae* appellantur, *in specie* vero pro diuersa illorum directione, et differente ossium denominatione, *obliquae, rectae, transuersales, ethmoidalis, sphenoidalis* etc. vocantur. Ἀγωνία quoque *in earum* classem referenda, quum iunctura ad sensum aequalis sit, siue iuxta VESALIVM ossium per simplicem lineam, citra omnem tuberis, sinus et asperitatis mutuum ingressum coniunctio. Interea notandum, hanc vnionis speciem, qua nonnulla faciei ossa inter se firmanur, *exterius* quidem aequalem, *interius* vero pro partium, quae se inuicem contingunt, differentia inaequalem esse.

§. CCLIX.

Quaenam ossicula triquetra et Wormiana dicantur?

Partes, quae a cranii ossibus diuersis futuris nonnunquam separantur, ob qualemcunque figuram ossa *triquetra*, ab aliis *Wormiana* dicuntur; *utraque* tamen a quibusdam adhuc distingui, et, quae a diuersarum futurarum concursu circumducta sunt, *triquetra*, quae vero vel solum a spuria, vel veris circumscripta sunt, *Wormiana* nuncupari solent.

§. CCLX.

§. CCLX.

Trahunt incunabula *a principio generationis ossium*; hinc in *imperfecto* eorum statu ob defectum eminentiarum dentatarum, mediante dura matre ossibus cranii cohaerent. Concludimus inde certa cranii ossa aliquot distincta habuisse ossificationis puncta (TAB. II. FIG. II. c.), a quibus definitae fibrarum ossearum directiones diuersa produxerunt ossicula, extremis suis proximis partibus irregulari futura intertexta. Quum igitur similis *eorum* cum *reliquis ossibus* natura sit; nullam specificam exerunt virtutem, sed ad instar reliquorum, eadem pollent vi.

Modus generationis illorum.

§. CCLXI.

His igitur *suturis*, quae vel *perfectae* iam, vel initio tantum *adparenter tales* et *imperfectae* sunt, caput debito modo extenditur, crebriores fracturae impediuntur, in humidioribus transpiratio promouetur, dura meninx et pericranium cranio intime nectitur, partes in basi cranii contentae tuentur, ossaque ad cranium figurandum, faciemque formandam mirifice conglutinantur. Solet autem cohaesio haec pro aetatis ratione ita muta-

Utilitas suturarum omnium.

mutari, vt ferratae ossium appendices in fenibus plane concrescant, *senumque caluariae*, teste VESALIO, nobis *suturarum situm duntaxat*, idque perquam obscure etiam referant, nulla interim *suturae imagine conspicua*. Quaeritur autem hac occasione, quid *suturae* vel *nimis coarctatae*, vel *deficientes plane ad cephalaeam*, ex sola saepius partium dispositione habitualement conferant? et an *ossa cranii a causis internis* v. g. dolorifico et perpetuo adfligente capitis morbo *circa suturas diduci possint*?

§. CCLXII.

Ossa faciei.

Series ossium nos iam ad examen eorum ducit, quae sub anteriore cranii parte posita, nihil quidem ad ipsius cauitatem, sed magnam *orbitalium, narium, genarum, palatiquae* faciunt partem, indeque *faciei ossa* vocantur.

§. CCLXIII.

Faciei ossibus adnumerantur maxillae apte dispositae et unitae.

Faciei ossibus adnumerantur *maxillae*, citius ossibus cranii ossescentes, et obseruante RVYSCHIO in embryonibus in oblongum protractae et acuminatae. *Maxilla superior in genere* ex tredecim ossibus composita est, quae communibus futuris, et harmoniis inter se adunata

nata (§. CCLVIII.), sic quidem per totam longitudinem, minoremque proportionem aetatis prae aliis animalibus magnitudinem, excepta conformatione monstrosa, artificiose disposita sunt, ut faciei, totique corpori naturalem praestent pulchritudinem.

§. CCLXIV.

Omnia ad duo proprie sic dicta *maxillaria* accedunt. Totidem sunt *nasalia* in priore et superiore faciei parte locata, *lacrymalia*, in canthis oculorum internis, mox sub concursu marginum orbitalium sita, *iugalia* externe et lateraliter collocata, *spongiosa inferiora*, interius in narium cauis abscondita, *palatina*, posterius ad foramina narium posteriora posita, et per nares ad orbitas usque extensa, *unicum* vero impar, siue *vomer*, a quo narium caua in duo loculamenta diuiduntur.

Ex quibusnam ossibus maxilla superior componatur?

§. CCLXV.

Fulcimenta eorum, siue *ossa maxillae superioris* (§. CCLXIV.), quoad figuram *irregularia*, circumferentiam *maxima*, structuram *cauernosa*, partem *orbitalium inferiorem*, genarum *nariumque* *cavitatem magnam*, *palati autem summam* efficiunt.

Ossa maxillaria proprie sic dicta.

§. CCLXVI.

§. CCLXVI.

*Externa illo-
rum superfi-
cies,*

Varias inde *in* quouis ossē notamus *superficies*. *Prima externa et anterior* est, ad priora paullulum *sinuata*, superiora versus *crassescens*, et *elata asperitate* iugale os, cum quo genam producit, recipiens. Retro protuberantiam iugalem, et eius marginem obtusum, qui ad alterum dentem molarem dirigitur, *superficies* fit *asperiuscula* et *conuexa*, sed *planior* rursus versus finem dentis sapientiae.

§. CLXVII.

In hac superioris utrimque eminet processus nasalis superior,

De genis, orbitas inter ossaque nasi, surgunt *processus sat longi, crassi, lunatique*, marginibus segmentum circuli referentibus, acuminati, *extrinsecus* leuiter *conuexi* et *aequales*, *intrinsecus sinuati* et *asperuli*. In principiis proformandis, augendisque inferioribus et interioribus orbitarum partibus latiores sunt, in progressu angustantur, *extremis superioribus* os frontis excipiunt, et *inferioribus* ad nasum osseum figurandum concurrunt.

§. CCLXVIII.

inferius autem et lateraliter circa marginem pro alveolis depressa est.

In parte, qua nasus finitur, ossa *linea acuta* coeunt, et *marginē*, quo *gingivae* locum praestant, *inaequaliter* promi-

prominente, circa *alveolos* pro dentibus *ocularibus* maxime *elevato*, inferiusque *sexdecim* ut plurimum *loculamentis*, cereis imaginibus intus vacuis, eleganter similibus, aucto, lateraliter deprimuntur.

§. CCLXIX.

Alveoli imperfecti, nec in recens natis *septis perfectis* distincti, sed *periotheo*, et in adultis, ubi dentes sapientiae erumpunt, *lamina ossea* adhuc clausi, sursum porriguntur, per longitudinem marginis, veluti in aciem exstruuntur, totam ipsius latitudinem naturali positu replent, longitudine et latitudine, pro differentibus dentium radicibus variant, atque vel *pyramidalibus foraminibus* plus minus profundis finiuntur, vel in *latiora, coeca et profunda* abeunt *loculamenta*.

Structura alveolorum in ossibus perfectis et imperfectis differt.

§. CCLXX.

Superficies altera superior utrimque partem orbitae inferiorem, magnamque ipsius fundi conficit. A priori, *marginē*, qui utrimque aequaliter augetur, incuruatur, ac in coniunctione cum iugali (§. CCXCIV.) crescit, distinguitur, indeque *portionem orbitalem* producit *laeuem, planiorem*, circa
loca

Superficies superior facit partem orbitae inferiorem.

loca coniunctionis cum ossibus plano, sphenoidali et palatino *inaequalem*, versus canthum vero oculi internum, processumque nasalem magis *aequalem*.

§. CCLXXI.

Interna sinuosa est,

Tertia vtriusque *interna* ampla et *sinuosa* fatis, ex parte tam tenui lamella ossæ quam membrana, tensa SCHNEIDERIANAE continua, ex parte vero ab ossibus spongioso inferiore et palatino, inter quæ ore magno ad latus cavitatis nasalis aperitur, tecta est. *Sinuositas*, proprie *maxillaris*, vulgo antrum HIGHMORI dicitur, omniumque maxima est. Ex *eadem* quoque *superficie* processus nasalis superior (§. CCLXVII.) latiore basi prouenit, intrinsecus semicanalem exprimens, a quo coniunctim cum ossibus vnguis et spongioso inferiore, canalis nasalis pro sacco lacrymali componitur (§. CCCVI.).

§. CCLXXII.

posterior omnium minima,

Quarta est *posterior* omnium minima, leuiter conuexa, margine obtuso, alueolis magnis, vtplurimum imperfectis, vtrimque repleta. Retro alueolum dentis vltimi tam *fossulam* continet, cui portio ossis palati pterygoidea infigitur, quam *impressionem*, quæ ad *forma-*

formationem foraminis palatini postici (§. CCLXXXVII.) confert.

§. CCLXXIII.

Quinta denique *inferior*, siue pars *inferior autem maxima et fornicata.* laminae spongiosae, instar fornicis excavatae, ab incisivis ad penultimum dentem molarem vsque exporrigitur. *Anteriorius* et *interius* supra dentes incisores emittit processum *nasalem inferiorem*, qui vna cum linea aspera, qua maxillaria intrinsecus coeunt, vomerem septique partem cartilagineam firmat. *Inferius* et *posterius* in progressu *inaequalis* facta, asperitate membranam glandulosam, palatum inuestientem, firmissime excipit. Cognoscimus inde *partem hancce palatinam* non quidem iuxta veteres ex propriis anticis ossibus compositam, sed portionem ossium maxillarium continuam esse, quae maximam fornicatam palati partem efficit, quamque posterius tantum palatina suppleat.

§. CCLXXIV.

Ex his *connexio* horum ossium tam *Connexio ossium maxillarium.* *inter se* quam cum *aliis* intelligitur. *Superius* nimirum cum ossibus planis, vnguis, portionibus orbitalibus palatinorum, et sphenoidali vniuntur; *inferius*

rius inter se coeunt; *anterius* cum ossibus nasi et iugalibus iunguntur; *interius* ossibus spongiosis, nasalibusque portionibus palatinorum committuntur; *inferius* autem cum septo narium cartilagineo, vomere, atque palatini ossium palati partibus adunantur, omnia quidem diuersis futurarum spuriarum speciebus, exceptis alueolis, quibus dentes, clauorum instar infixi sunt.

§. CCLXXV.

Descriptio et
usus tam fo-
raminum or-
bitalium in-
feriorum,

E foraminibus *ossibus* vel *insculptis* vel in *coniunctione* cum *aliis* factis, *extrinsecus* vtrimque sub orbita ad genam aperitur *orbitale inferius*, per quod una cum vasculis neruus maxillaris superior emittitur. Fit ex *dimidio*, qui sub fundo supraorbitalis portionis mediam partem excurrit, et *integro* deorsum *incuruato canale*. Circa *foraminis ambitum* in ipso canali *foramina minora* obseruantur, in quibus partim filamenta nerui maxillaris, partim vasa sanguifera ad membranam sinus, dentesque superiores progrediuntur.

§. CCLXXVI.

quàm pala-
tini anticj.

Inferius retro dentes incisiuos *foramen unicum incisuum*, siue *palatinum anticum*, in coniunctis adparet ossibus, quod

quod ratione structurae pariete osseo
in duo ut plurimum diuiditur, quorum
 quodlibet anterieus in nasi cauitatem sui
 ateris hiat; respectu vtilitatis vero va-
 a ad nares admittit, locumque com-
 municationis membranae, palatum in-
 aestientis, cum pituitaria narium con-
 tituit.

§. CCLXXVII.

Praeterea *margo acutus posterior* su-
 perficiem superiorem a posteriori di-
 stinguens, et *oblique* e fundo cuiusuis
 orbitae versus angulum externum ten-
 dens, ad *fissuram* confert *spheno-*
maxillarem, de qua in specie (§.
 CCXXXVIII.) actum fuit.

*Qualis mar-
 go ad for-
 mationem
 fissurae orbi-
 talis inferio-
 ris concur-
 rat?*

§. CCLXXVIII.

Vsus horum ossium vel *generalis* vel
specialis est. Prior ex praemissis co-
 gnoscitur (§. CCLXIII. CCLXV.); *poste-*
rior eruitur ex fabrica magnorum re-
 ceptaculorum, quae partim ad vocem
 conferunt, partim secretioni et colle-
 ctioni muci amplissimum concedunt
 spatium. Etenim membrana obducun-
 tur *tensa* (§. CCLXXI.) et *resonante*, vi
 structurae *glanduloso - vasculosa*, secre-
 tionis muci aptissima. Mucum quem
 officinae excipiunt, sub laterali capitis

*Vsus ossium
 maxillarum
 generalis et
 specialis.*

flexione ex opposito per foramina propria (§. CCLXXI.) rursus dimittunt, eodemque partes narium spongiosas et membranaceas humectant, ne ab in- et expirato aere exsiccatae, ad olfactum inutiles reddantur; sed vt in iusta flexilitate conseruentur, et particulae odoriferae, per aerem ad illas delatae, eo melius ab expansis inibi papillulis nerueis recipi, volutantesque in cellulis ad tempus retineri possint. Obseruamus inde remanere nonnunquam in naribus particulas subtiliores odoriferas, quamuis extra corporis, quod sentit, sphaeram omnes dissipatae fuerint. Quodsi humor nimis viscidus sit, mollemque interiorem substantiam obducatur, particulae nervos adficere nequeunt, sed olfactus, vti et reliquorum sensuum, in serosis adfectibus, v. g. grauedine et coryza, hebetior fit conditio.

§. CCLXXIX.

*musculorum
ad ossa ma-
xillaria per-
tinentium
origines.*

Pertinet etiam ad *utilitatem horum* ossium, illa, pro partibus multis et praecipue musculis stabiliendis, *diuersis in superficiebus*, aspera, et sinuata esse, hic deprimi, illic rursus protrahi. Firmant autem inferioribus orbitarum marginibus processibusque nasalibus

mit-

*musculos orbiculares et depresso-
res palpebrarum inferiorum*; anterioribus et
anterioribus orbitalium partibus, circa
coniunctionem ossium maxillarium
cum iugalibus, *obliquos inferiores*; la-
teribus externis, non procul a com-
missura zygomaticorum cum iugalibus,
zygomáticos minores; ad radices postre-
morum dentium *buccinatores*; supra
incisivos et infra nares *depresso-
res alarum nasi*; in genis sub orbitis *incisivos*,
et denique infra foramina infraorbita-
lia in foveis *caninos*.

§. CCLXXX.

Quod superest, de *diuersa sinuum* Observatio-
nes.
*in animalibus structura, morbosa eo-
rum constitutione, et ozaenae, polyporum.
que generatione sequentia adhuc no-
tamus.*

- I) Animalia, quae sinus capacissi-
mos, cellulasque interiores maio-
res, naresque intrinsece amplio-
res habent, vi structurae partium
ad recipiendas et retinendas par-
ticulas odoríferas tam proximas,
quam remotas, reliquis aptiora
sunt, et exquisito odoratus sensu
gaudent. In animalibus sagacio-
ribus et venaticis maxime canibus

interiores cellulosae et spongiosae partes in miram spirae formam conuoluuntur, inque iis ob laminarum multipliciter sensus cum organo olfactus augetur.

II) Quum ozaenae sedes quandoque sit in ipsa maxillari sinuositate, ad curandum vlcus eiusmodi foedum nouum curandi artificium proposuit DRAKIVS. Alterum nimirum euellere iubet dentem molarem lateris istius, quod exulceratione infectum est, postea laminam, alueolum a sinuositate separantem, et exesam iam ac detritam perforare suadet, quo materia corrupta sponte effluere, et per iniectiones balsamicas mundificantes postea expurgari, atque euacuari possit.

III) In maxillaribus frequens est polyporum generatio. Mucus enim inspissatus et mora corruptus, non tantum ossa ipsa erodit, verum etiam, cum effluere nequeat, continuo tamen adfluxu augeatur, membranam ipsam per vnum alterumue foramen in pediculum educit, atque in narium caua faucesque

eesque instar frusti carnis propendit.

§. CCLXXXI.

Ossa exigua irregularia *palatum posterius* Ossa palati. *perficientia*, et ad nares orbitarumque fundum extensa, *palatina* nominantur.

§. CCLXXXII.

Partibus, quibus proxima attingunt, In diversas diuiduntur. in portiones quasdam diuiduntur. In portiones, *simae*, ac solidissimae *quadratae* proprie a) palatinae, *palatinae* sunt. Constant ex duabus lamellis, interiecta cellulositate, et coniunctim *narium fundum*, *palatumque osseum*, siue oris superiorem partem leuiter concavam, quam et oris caelum dicunt, perficiunt (§. CCLXXXIII.). *Lamina ossium superior lunata*, anteriore margine, quo cum partibus maxillarium palatinis cohaeret, supra inferiorem eminet, *inferior plana* quidem, hinc inde tamen *aspera* est; *binæ* vero media, qua se inuicem contingunt, et acuminata parte, vomeri fulciendo ac sustinendo inseruiunt.

§. CCLXXXIII.

Inferiores et posteriores in processus b) pterygoides, *pyramidales breues*, crassosque abeunt, qui

qui posticis superficiebus *foveis profundis*, ultimis dentibus molaribus lateraliter adpositis (§. CCLXXII.), infunguntur; reliquae superficies extrorsum prominent, et antèrìus vel cum aliis pterygoideis externis spuria futura iunguntur, vel cauitatibus oblongis alas internas recipiunt firmantque (§. CCXXXII. CCXXXIII.), immo hiatus e naribus ad ossa maxillaria superiora penitus obstruunt.

§. CCLXXXIV.

e) nasales,

Mediae, laterales narium et posteriores sinuum maxillarium efficientes, *nasales* audiunt. Tenuibus compositae sunt lamellis, quarum *externa facies* hinc inde aspera, internae maxillarium superficiei et posticae sinuum adposita est; *externa* vero paullulum concava, pro firmandis ossibus spongiosis inferioribus, *transuersali eminentia* quasi bipartitur.

§. CCLXXXV.

et d) super-orbitales.

Superiores superorbitales, quae palatinis foraminibus a portionibus nasalibus distinguuntur, *exterius rimas spheno-maxillares fundumque utriusque orbitae* finiunt; *anterius* cellulas ossis ethmoidalis recipiunt; *posterius* ad

ex-

exteriora et inferiora sinuum sphenoidalium, *lateraliter* vero ad posteriora sinuum maxillarium accedunt.

§. CCLXXXVI.

Adpositae ossibus vicinis portiones Vfus et coniunctio ossium palati.
demonstrant, *ossa palati* maxillaria stabilire, fundumque utriusque orbitae, nec non caua narium posteriora amplissima perficere. Etenim *superorbitales* concurrunt ad formationem orbitarum (§. CCCXXI.), rimarumque sphenomaxillarium (§. CCXXXVIII.), cellulis augent sinuositates osseas, diuersisque superficiebus ossa plana, frontis, et maxillaria excipiunt (§. CCLXXXV.); *nasales* ossa spongiosa inferiora sustentant (§. CCLXXXIV.); *palatinae* vomeri fundamentum praebent, palatum ad uocem edendam sustentant, velumque palatinum una cum vuula firmant (§. CCLXXXIII.); *pterygoideae* demum coniunctionem ossis sphenoidalis cum palatinis augent (§. CCLXXXII.).

§. CCLXXXVII.

Patet insimul, qualia per adplicationem superficialium *coniunctim* fiant ipforum foramina. *foramina*, et quae ipsis *propria* sint. *Palatina* sic dicta *postica*, oualia, in ossibus palatinis ultra tertiam partem

perfecta, canales pro nervis gustatorii efficiunt. Ad formationem illorum, non tantum facies posterior maxillarium (§. CCLXXII.), verum semi canales, inter faciem externam portionum nasalium et pterygoideas partes oblique descendentes, concurrunt. *Communia* saepissime quoque sunt *spheno-palatina*, aliquando *propria* (§. CCXXXVII.), quorum loca vel in coniunctione omnium capitis ossium extrinsecus per hiatus lunatum, inter radices alarum, et faciem posteriorem maxillarium ossium remanentem, vel sub speciali ossium palati ad alas internas pterygoideas ossis sphenoidalis adplicatione, superius in portionibus nasalibus inuestiganda sunt.

§. CCLXXXVIII.

et muscoli. Ad *musculos*, qui posteriori margini ossium palati inferuntur, referimus *partem musculosam veli palatini*. Haec componitur ex *musculo palatino*, quem alii *palato-staphylinum* dicunt, auge-turque a *pterygo-staphylinis*. Circa iuncturam ossium a serie prioris descendit *azygos*.

Effectus cariosae ossium corruptionis in lue venerea,

§. CCLXXXIX.

Ceterum observamus, *ossa palati corruptioni* maxime illis in morbis obnoxia

noxia esse, in quibus partes glandulosae faucium vlcerosae adficiuntur corruptione. Quid mirum itaque, si in lue venerea caries ossa ad orbitas vsque exedat, a destructione illorum naturalis loquendi et deglutiendi facultas pereat, adsumta per nares egerantur, grauis oculorum inflammatio excite-tur, visusque organa plane destruantur.

§. CCXC.

Ossa spongiosa, quae lateraliter su- *Ossa iugalia.*
pra maxillaria superiora eminent, ante
tempora posita sunt, et orbitarum in-
feriorem externamque partem faciunt,
vel a *figura quadrata*, vel a ζυγός, *iu-*
gum, iugalia, siue *zygomata*, vel a
situ, quo infra orbitas et supra maxil-
lam superiorem protuberant, *ossa ge-*
nae, siue *malae* adpellantur.

§. CCXCI.

Vtrumque diuiditur in *corpus et apo-* *eorum stru-*
physes. *Corpus* efficit *pars media* cras- *ctura in me-*
sa, extrinsecus conuexa, versus partem *dia parte.*
orbitae inferiorem latior, anterieus mar-
gine, quo ad maxillam superiorem ac-
cedit, prominens, ex opposito pla-
nior, *intrinsecus concaua*, partibus tam
superiore, quam posteriore, cauita-
tem augens temporalem.

§. CCXCII.

§. CCXCII.

Cavitas iugalis quid?

Cavitas iugalis, temporalis, siue zygomatica, a calvariae ossibus remota satis, profunda vocatur sinuositas, quae a coniunctionibus tam processus spheno-frontalis cum eiusdem denominationis ossibus, quam temporalis cum arcuato zygomatici ossis temporum formatur.

§. CCXCIII.

Coniunctio ossium cum aliis fit mediantibus diversis apophysibus.

Ex apophysibus, anterieus maxillares, interiacente parte triangulari aspera, unionem cum osse maxillari vtrinque subeunt. Superior longior et tenuior est; inferior autem latior, iustoque brevior, spheno-frontalis, superius et extrinsecus sita, ossibus frontis et cuneiformi iungitur, oculi externum cantum, et orbitae partem externam ac inferiorem finit, atque ex parte cauum iugale auget (§. CCXCII.). Posterior demum temporalis initio latior, postea tenuior futura spuria obliqua processum zygomaticum firmat.

§. CCXCIV.

Utilitas ossium cavitarumque iugalinum.

Mediantibus his tam cranii quam faciei ossibus adunata, maxillaria ossa fulciunt, et partem inferiorem orbitalem perficiunt. Praecipue vero cavitatibus zygomaticis.

zomaticis libero *maxillae inferioris* eiusdemque processuum *coronoideorum* motui, nec non musculis sub diductione et adductione inferioris *maxillae* retinendis et educendis fauent.

§. CCXCV.

Vbi cum *sphenoidali* et *maxillaribus* Foramina propria, *coeunt*, *fissuras orbitales inferiores* reddunt amplissimas, in ipso autem corpore *extrinsecus* aliquot *foraminulis* perforata sunt, per quae vel rami portionis *durae*, vel *vasa sanguifera* ad oculos feruntur.

§. CCXCVI.

Musculis, qui ab ossibus *iugalibus* quinam musculi ab illis oriuntur? procedunt, adnumeramus *orbiculares* (§. CCLXXIX.), et *zygomatricos*, ab eorum corporibus incipientes, nec non *masseteres*, tam ab ossibus *iugalibus*, vbi *maxillaribus* committuntur, quam inferioribus processuum *zygomatricos* marginibus *provenientes*.

§. CCXCVII.

Variis ex observationibus in genere Observationes circa generarum vulnera, *asserimus*, *genarum vulnera*, profundius ad ossa penetrantia, sanatu saepius difficilia esse, imprimis si cum illis *ductus* STENONIANVS laesus fuerit, dolorifica

ca autem immo periculosa saepius illa fieri, quae inciso et inflammato portionis durae ramo, aurem internam ipsique proximum cerebrum in consensum trahunt.

§. CCXCVIII.

Ossa nasi,

Ossa solida rectanguli figuram habentia superius crassa et angustata, inferius tenuia et lata, processibus nasalibus superimposita, externumque diuersae figurae nasum osseum figurantia, *nasalia* vocantur.

§. CCXCIX.

eorum structura, et cavitatum nasalium directio.

Extrinssecus gibbosa superficie soliditatem *dorsumque* nali efficiunt, *intrinsecus* autem *concaua*, *cavitates* inaequales mediante septo diuisas perficiunt. *Cavitatum* directio in recentibus non transuersalis est, sed meatus ab orificiis anterioribus, superius angustatis, inferius vero rotunde dilatatis, latescens adscendit, posterius autem ad fauces coarctatus descendit.

§. CCC.

Inter se per harmoniam uniantur,

Officula superficibus crassis se inuicem contingunt, *externe* tantum adparente linea, ad sensum aequali, *interne* vero relicta eminentia cum linea

nea aspera, sustinendae superiori septi
ossei parti adcommodata.

§. CCCI.

Oris reliquis, *superius* fronti, et *la-* diversisque
oris alia
recipiunt
teraliter processibus nasalibus innitun-
tur; *latefcentibus* vero *inferioribus* acu-
tissimis et inaequalibus partibus alas
nasi mobiles cartilagineas recipiunt.

§. CCCII.

In *exteriore* facie *duo* occurrunt fo- Foramina
illorum,
ramina, per quae filamenta nervorum,
ab ophtalmicis per interiora ad loca ca-
uernaosa septumque nasi progredientia,
redeunt (§. CXVII.); reliqua *minora*
ossium nutritioni inferuiunt.

§. CCCIII.

E *musculis*, *myrtiformes* dorso in- et musculi,
cumbunt, *pyramidales* autem inferio-
ribus latefcentibus partibus alisque nasi
cartilagineis, nec non processibus na-
salibus superioribus inferuntur.

§. CCCIV.

Varia haec partium nasum consti- Quaestiones
nonnullae.
tuentium dispositio, attentioribus an-
sam diiudicandi dat, cur in illis, in
quibus *sinus frontales* *deficiunt*, quique
nares depressas habent, obtusior sit ol-
factus

factus sensus? quare ob *absentiam sinuum* in tencillis nares perpetuo stillare soleant? quomodo circulatorum miraculo *clauus*, *navibus immissus*, per eorum fundum *ad occipitis anteriorem partem* impingat? qua ratione ab ictu lapsuque *percussa ossa*, cerebrum insigniter commoueant, contusionesque violentiores fracturis saepius periculosiores sint? qui fiat, vt in *lue venerea erosio palatinis* ossibus, reliquisque nasum firmantibus, *nasus* vel ex parte vel integer consumatur, *vocesque* in illis, quibus *meatus oris laesus* est, et per nasum loquuntur, *vitiato sono* pronuntientur?

§. CCCV.

Ossa lacrymalia.

Planorum complementa vel a sacco lacrymali, *ossa lacrymalia*, vel a figura, *unguis* dicuntur. Sunt autem laminae tenerrimae, in embryonibus adhuc membranaceae, in basi latiores, in superiori autem parte paullulum acuminatae.

§. CCCVI.

eorum superficies et formatio canalium nasaliū.

Quodlibet externe a tenui acutissima et oblique directā laminae productione, in *superficiem anteriorem* profundius *sulcatam*, et *posteriorem* leuiter

ter *sinuosam* diuiditur. Ex *fulcata anteriore* fit *semicanalis*, cum processu nasali (§. CCLXXI.), osseque spongioso inferiori (§. CCCXIII.) *perfectus*, quali foramine, sub turbinato inferiore, in cauum nasi hians. *Interni* ossis asperiusculi structura cellulis ossis ethmoidalis, quas ex parte integit, cohaeret.

§. CCCVII.

Colligimus inde osricula diuersis extremitatibus aliis iungi; *superiore* quidem ossi frontis; *inferiore* maxillaribus superioribus; *externis anterioribus* processibus nasalibus; *externis posterioribus* planis; *internis* demum ethmoidalis cauernulis.

Coniunctio
ossium un-
guis cum
aliis,

§. CCCVIII.

Hoc itaque modo angulos internos finiunt, praecipue vero in *fulco osseo* saccum lacrymalem vtrunque excipiunt, qui in canalem abit membranaceum, ex cylindrico diminutum, atque furculum vel tertii paris, vel ophthalmici introrsum ad nares secum ducit.

et usus illo-
rum.

§. CCCIX.

Quaecunque oculos intus naresque *irritant*, constringunt insimul *neruos*,
L et

Quomodo ab
irritatione
narium et

oculorum
sternutatio
excitetur?

et consentientes, praeprimis paris vagi et intercostalis recurrentes ita conuellunt, vt e respirationis organo aer vi expellatur, hocque naturali beneficio organa visus et olfactus saepius expurgentur.

CCCX.

Gauelae circa perforationem ossis unguis in fistula lacrymali.

Quum in *perfecta et complicata*, cum *offis carie, fistula lacrymali*, methodus ANELLIANA, in curatione leuiorum fistularum alias praestantissima, insufficiens sit; inciso sacco et perterebrato osse noua via ad nares aperienda; cauendum vero, ne sub sectione lunata, quae a nonnullis iuxta directionem processus nasalis ad iugalis interiorem prominentiam vsque institui solet, vel musculus obliquus inferior, vel tendines orbicularis et trochlearis laedantur, nec papyracea ossa pertundantur, nec vis in ipsum processum nasalem frustra adigatur, sed os unguis inter spongiosa ad nares vsque rite aperiatur.

CCCXI.

Ossa spongiosa inferiora,

Ossa oblonga, porosa, friabilia, inaequalia, tenui lamella spirali modo circumuoluta, maxillaribus et palatinis ossibus affixa, et in infimas narium caui-

cauitates propendentia, vi structurae, situs et figurae, *spongiosa et turbinata inferiora* vocantur.

§. CCCXII.

Anterius partim crassa et solida, partim pumicosa, *posterius* tenuia et simplicia, *interne* eminentia, et ad *exteriora* concaua sunt. eorum structura et superficies,

§. CCCXIII.

Quoduis *anteriore*, *latiore*, et *lunata extremitate* coniunctim cum osse situs et conexio,
vnguis et apophysi nasali superiore canalem perficit nasalem (§. CCCVI.), et *circularem*, a *marginē inferiore*, libere in nasum propendente, paullulum distantem reflectit *lamellam*, quae aequalis facta, tortuose acuminatur, et angustatur. *Posteriore*, *lineae* siue *eminentiae transversali* asperae ossis palati (§. CCLXXXIV.) incumbit; *media* vero latissima et concaua portione partem sinus maxillaris protegit.

§. CCCXIV.

Vsum praestant ad instar superiorum nec non usus.
(§. CCXLVI.). Eadem enim gaudent *fabrica*, et tam ad *olfactum*, quam ad *humectationem*, instructa mucosa membrana, ossa in viuis aequalia redente,
L 2 obdu-

obducuntur. Praeterea opplendo caua illapsum peregrinorum corpusculorum in fauces et pulmones quouimodo arcent, et sic quidem periculum suffocationis, alias metuendae auertunt.

§. CCCXV.

Ossa spongiosa cariosa non admittunt perfectam sanationem.

Tenera contorta narium ossa, cariosa correpta, vix admittunt plenariam corruptae partis expurgationem et sanationem. Hinc, si in *oxaena* ossa erodant incipiant, cauendum, ne malum augeatur, ob materiam vlcerosam, in cellulis collectam, deterius fiat, vlteriusque serpendo, *septum narium* adficiat.

§. CCCXVI.

Vomer,

Agmen ossiculorum faciei clauditur *impar*, a figura *vomer* dictum. Est vero os rhomboides, seu lata et duplicata, vtrimque plana, ossea lamella, ex medio narium fundo surrecta.

§. CCCXVII.

diuersa illius, in infantibus et adultis structura.

Structura et figura pro aetatis ratione differt. *Vomer* enim in *iunioribus* porosior obseruatur, binaeque illius laminae *superius* et *anterius* plus minus a se inuicem distant: in *adultioribus* ve-

o *solidior* est, *basis* acutior, et *lamellae* propius ad se inuicem accedunt.

§. CCCXVIII.

E *marginibus*, quae in omni aetate *Marginibus* adparent, *inferior* longus, rectus, et *distingui-* tenuis, *ossum* maxillarium et palatino-*tur.* rum *commisurae* eminenti insistit (§. CCLXXXII.), ac *fundum* narium in *duo* diuidit *loculamenta*. *Posterior* angulo obtuso versus *ossis* cuneiformis *basin* procedit, *faucesque* respicit. *Superior* crassior et *sinuosus* ex parte *eminentiam* *ossis* multiformis recipit, ex parte vero *processibus* *ossis* *ethmoidalis* vnitur (§. CCXLVI.). *Anterior* demum longissimus retrorsum *adscendit*, cum parte *septi* *suprema* vnitur, rarissime autem coalescit. *Huius* *anterior* et *media* pars *cartilaginea*, non raro in *senibus* *oslescens*, a *concurso* *nasalium* *ossum* descendens, accedit, *septoque* *ossis* *ethmoidalis* *vomerisque* angulo *inferitur*, adeo, vt *vomer* *fundamentum* sit *septi* *osse*i, *ossisque* *ipso* *ethmoidalis*.

§. CCCXIX.

Vlcus *narium* *malignum* adeo non *Septo destru-* nunquam *serpit*, vt et *septum* erodat, *cto* *nasus* et *fundamentum* *nasi* destruat, quo ipso *cum diffor-* *mitate con-* *cidit.*

autem nasus externus maxima cum difformitate penitus concidit, naturalisque spirandi et loquendi facultas perit.

§. CCCXX.

Ossa faciei coniunctim concurrunt ad formationem maxillarum cavitatum.

Quae iam exposuimus *faciei ossa* variis eminentiis, commissuris simplicibus, longitudinalibus, transuersalibus, obliquis et inflexis se inuicem contingentia (§. CCLVIII.), ad formationem *maxillae superioris, orbitalum, narium, genarum, oris, et palati* concurrunt.

§. CCCXXI.

Orbitas, earum figura et compositio.

Orbitae sunt caua magna conica, infra os frontis protuberantia, naso interiacente distincta, oculos recipientia et munientia. Cuiusuis coni sectio *anterius* elliptica et maxime patula est. *Pars interior* quatuor lateribus obliquis, inaequaliter depressis, in verticem angustum tenuemque in fundo abit; *tota cavitatis* autem ex *septem frustis osseis*, scilicet frontis (§. CX.), plani (§. CCXLVII.), vnguis (§. CCCVIII.), maxillae superioris (§. CCLXX.), iugalis (§. CCXCIII.), sphenoidalis (§. CCXXIX.), et palati (§. CCLXXXV.) composita est.

§. CCCXXXII.

§. CCCXXII.

Orbitis interpositus eminent *nasus*, Nasi ossei
eiusque cavi-
tatum figura
et structura. aptissime factus, et in loco opportu-
nissimo collocatus, cuius ossa initio ali-
quatenus depressa et circa radicem acu-
minata, plus minus exsurgunt, ad
finem vero aspera, supra maxillam su-
periores prominent. Ad illius, *cavi-
tatisque nasalis formationem conferunt*
ossa nasi (§. CCXCVIII.), processus na-
sales (§. CCLXVII), os frontis (§. CIX.
CXI.), cribrosum (§. CCXLIV.), sphen-
oidale (§. CCXXVII.), palatina (§.
CCLXXXIV.), maxilla superior
(§. CCLXXI.), spongiosa inferiora
(§. CCCXI.) et vomer (§. CCCXVI.).

§. CCCXXIII.

*Meatum bifidum reddit septum latis-
simum* satis (§. CCCXVIII.), ad totum Cavitatum
nasalium,
septo divisa-
rum, dire-
ctio, pertingens *narium fundum. Vterque*
superius a spongiosis superioribus an-
guistatur (§. CCXLVI.), et ubi latefcit,
ex parte inferius ossibus repletur turbi-
natis minoribus (§. CCCXI. CCCXIV.);
hinc *superius* inter orbitas descenden-
do *successive* latior fit, ac in *medio* am-
plissimus, in *fundum* incuruatur, re-
manente tam in *ima* parte, sub basi os-
sis sphenoidalis, et pariete ossis palati
septique, *ad fauces magno hiatus*, quam

in priore, orificio superius angustato, inferius rotunde dilatato, et supra maxillam patulo.

§. CCCXXIV.

earum a sinibus ossibus augmentum.

Intuitu reliquorum (§. CCCXXII.) indicatorum ossium, binae cavitates a sinibus ossibus superius, posteriora versus, et lateraliter ita augentur, ut nares, mucic officinam merito dicere possis, quum ad illius separationem, praeparationem, collectionem, et excretionem sint aptissimae (per priora).

§. CCCXXV.

Commoda, quae ab artificiosa narium fabrica pendunt.

Tandem ad narium artificiosam fabricam referendum, quod ad receptionem diuersorum vasorum et neruorum, aeris inspirationem, expirationem, retentionem in cellulis, ad fauces asperamque arteriam admissionem, lacrymarum receptionem, earundemque per vtraque aperta extrema excretionem, apte figuratae sint, vel ex antecedentibus patet.

§. CCCXXVI.

Quaenam narium adiacentes partes figuram faciei perficiant?

His proxime adiacentes partes, figuram faciei perficiunt, quum sub narium maxilla superior firma stabiliorque cum serie dentium veluti in aciem structa,

sta, antèrius crassa et conuexa in os desinat, et posterius diducta patefcac, sub oculis vero malae eminentes latiores planioresque successiue deprimantur, maxilla rursus sinuosa fiat, et subter nares palatum a priori in posteriora fornicatum, in medio autem planius alis pterygoideis terminetur.

§. CCCXXVII.

Consideratis iam ossibus *cranii* et *faciei*, *foramina*, quatenus in *horum* *ossum* coniunctione tam *interne* quam *externe* conspiciuntur, et *ordine* se inuicem excipiunt, repetenda sunt.

Repetitio foraminum.

§. CCCXXVIII.

Internorum praecipuorum neruis *va-* *lisque sanguiferis* *transitum praebentium, undecim paria, unicumque impar* *numerari solent. Antèrius in basi cranii minima laminae transuersalis processus mamillares et primum par neruorum admittunt (§. CCXLIX.). Par secundum ostiis orbiculatis in suprema sphenoidalis parte incipit, et ad posteriora orbitarum patet (§. CCXXXIV.). Huic tertio lateraliter fissurae orbitales superiores (§. CCXXXVII.) ad processus clinoides anteriores adpositae sunt.*

Praecipua internorum cranii, sunt undecim paria et unicum impar.

Quartum par faciunt rotunda ; quintum oualia. Sextum in angulis ossis sphenoidalis perforatis, arterias fouet (§. CCXXXV.), sulcos ossibus squamosis, bregmatis et occipitis imprimentes. Septimo, inter radicem sellae equinae et apophyses petrosas dura matre tecto, carotides internae sub ingressu in basin cranii incumbunt. Octauum constituunt foramina ab extremis petrosarum partium sursum non nihil incuruata, magna, oualia, et ad sellae equinae latera uestigia leuiter imprimentia (§. CLV.). Nonum in interna et inferiori regione petrosorum ossium retrorsum ad exteriora oblique procedit (§. CCV.). Decimum disruptum coniunctim ab ossibus petrosi cum occipite fit (§. CXLII.). Vndecimum in interiori limbo magnum et rotundum, versus processum ossis occipitis antrorsum extrorsumque oblique ducitur (§. CXLI.). Vltimum est impar, maximum, et amplissimum ossis occipitis (§. CXLI.).

§. CCCXXIX.

Reliqua, quae in basi cranii conspiciuntur.

Reliqua in basi cranii obuenientia foramina sunt sic dictum coecum, ante cristam galli positum (§. CXV.), foraminulum loco sulci in extremitate fissurae

rae orbitalis superioris conspicuum (§. CCXXXVII.), *canalis osseus* in latere sellae equinae, ac in ipsa fossa minima duo quatuorue ostiola (§. CCXXXV.), *hiatus magni* quandoque a coniunctione processuum clinoideorum provenientes (§. CCXXXV.), *minimusque* in regione petrosorum ossium interna et superiore (§. CLV.); tandem vero *occipitalia*, quae vel in circulari, vel lateralibus superius, sicuti *cervicalia* inferius, diuerticulis ex opposito fere (§. CXLI.), terminantur (§. CXLII.).

CCCXXX.

Externe quoque tam *cranii*, quam *faciei* ossa vias vel ad *basin cranii*, vel *aliunde* directas monstrant. Inter praecipua autem, misis minoribus, quae ad meditullium feruntur, referenda *verticalia*, in summo capitis ad suturam sagittalem posita (§. CXXVII.). In fronte vtrimque patet supercilii foramen *orbitale superius* (§. CXV.). E diametro fere oppositum est *infraorbitale* (§. CCLXXV.). Marginibus, tanquam basi foras patente, circumducitur *orbita* (§. CCCXXI.), quae in interno cantho superius obliquum et dimidiatum, retrorsumque descendentem perfectum habet *canalem* (§. CCCVI.),

fac-

Externa tam
cranii quam
faciei foramina,

sacci lacrymalis receptaculum, qui punctis superfluas absorbens humiditates narium cauis infundit. *Interius*, vel in osse frontis, vel illius cum plano coniunctione, *unum*, *duo*, vel *tria exigua* apparent, marginibus obliquis ad nares directâ (§. CXVII.); versus canthum externum vero *longa* et *ampla fissura* oblique extrorsum et retrorsum (§. CCXXXVIII.) tendit. Dummodo processus zygomaticus cum posteriori iugali vnitur, *cavitas* oritur *amplissima* (§. CCXCII.). *Iugalia* ipsa et *nasalia* (§. CCCII.) hinc inde perforata sunt (§. CCXCV.). *Nares antèrius posteriusque* patent foraminibus magnis diuersae figurae (§. CCCXXIII.). Margo externus et anterior maxillarium osium *alveolis* circumducitur (§. CLXVIII.). In palato post dentes incisores *foramen incisivum*, siue ex duobus compositus irregularis hiatus (§. CCLXXVI.), posterius autem infra dentem vltimum molarem magna ovalia palatina *postica*, ad alas pterygoideas, vbi maxilla latefcit, directâ, distincte cernuntur (§. CCLXXXVII.). Ad radices alarum pterygoidearum duo exigua *pterygoidea*, nec non quae ab ipsis ossibus occultantur, *spheno-palatina* deteguntur (§. CCXXXVI.). Post genas *aurium*
fora-

foramina elliptica (§. CLXIII), et in medio ossium petrosorum *canales pro carotidibus*, *orificiis magnis ouatis* incipiunt (§. CLVIII.); externae uero amplae sinuositates, inter processus styli-formes et tubera ossis occipitis ad basin caluariae, venas recipiunt iugulares (§. CXIII.). Non procul ab his inter processus mamillares et styli-formes distant extrema inferiora canalium FALLOPII (§. CLVIII.). Retro apophyses mastoideas autem vel in *propriis*, vel *communibus* foraminibus, numero figuraeque diuersis, venae ad sinus ducuntur laterales (§. CXLII.), inque illis paullulum inferius per *orificia*, retrorsum magis ad condylos ossis occipitis posita, venae ceruicales aperiuntur (§. CXLI.).

§. CCCXXXI.

Ad ossa, quae regionem faciei determinant, et partem capitis anteriorem perficiunt, pertinet *maxilla inferior*, *mandibula*, siue mobile illud os, quod seriem dentium inferiorum continens, solae ad instar ferreae figuratum, apteque superiori adpositum est. *Maxilla inferior,*

§. CCCXXXII.

§. CCCXXXII.

illius stru-
ctura.

Structura ossis *intus* spongiosa, *extus* solida lamella ossea includitur. In infantibus *bifidum*, paulo post non cartilagine, sed *periosteo* in vnicum coalescit, *remante* in vigente aetate circa *symphysin menti linea*, quae, vna cum parte priore et inferiore plus minus prominula, *mentum* Gr. γέυελον facit.

§. CCCXXXIII.

In superiori
maxillae
margine di-
uersi protu-
berant al-
ueoli,

Mandibula anterieus et externe in corpore, siue medio ossis lata, crassa, et incurua, *posterius* oblique in *processus* procedit. *Margo* ipsius *superior* in completo dentium numero *sedecim* protuberat *alueolis*, quae Graecis Φάγραι et Φάγραια, *praesepiola*, a praesepium similitudine, ab aliis *frena*, *mortariola*, *fossulas*, *locelli*, *cauernae* cet. vocantur. Loculamenta haec omnia, praeterquam quod gingiuam firment, ad instar superiorum (§. CCLXIX.), radices inuersorum dentium fulciunt, stabilesque et immobiles seruant; hinc pro differentia dentium plus minus profunda et lata, in medio angustiora, in sequentibus successiue maiora, versus tertium vtrinque, et prae primis vltimum molarem, maxima sunt, ac vel in vnum, vel duos, septo osseo in

in medio crassescente, diuifos dehiscunt coecos fines.

§. CCCXXXIV.

In foetu vel deficiunt, vel imperfectae sunt *vaginulae*, superius periofteo tectae. In senibus post dentium casum rursus coalescunt, et ita collabuntur, vt, teste maxilla, quam inter praeparata adseruo, funditus deleantur, latitudo ossis minor fiat, superiorque margo durior, latior, ferendisque mollioribus cibis, qui manduntur, aptissimus euadat.

qui in foetu imperfecti sunt, et post dentium casum in senibus collabuntur.

§. CCCXXXV.

Inferius maxilla in *marginem* procedit *obtusum* siue *basin*, ac versus extrema adscendendo, *angulos* facit vel *obtusos*, vel *acutos*, ad exteriora leniter *incuruatos*; *obliqua* vero lata atque plana directione extremis diuifis *antrorsum* et *deorsum* respicit.

Margo ossis inferior.

§. CCCXXXVI.

Retrorsum ad aures vergunt *condyloidei processus*, qui circa collum graciliores, superius latiores, capitatis, oblique recuruatis, tenuissimisque cartilaginibus obducti, artificio singulari, interpositis cartilaginibus crassioribus, lae-

Processus condyloidei,

laeuigatis, mobilibus, eiusdem cum condylis directionis, in foueis ossis temporum mobiles sunt.

§. CCCXXXVII.

et acuti coronoides,

His opponuntur *apophyses* maxillae verae, triangulares, circa radices laterales, tiores, solidae, exterius planiores, anterosuperius in obtusum migrantes acumen. Processus anteriores, acuti, et coronoides nominantur, qui, pro ratione adductionis et diductionis maxillae vel sub iugo lateſcunt, vel extra illud prominent, et a posterioribus, incisuris semicircularibus, acutis, distinguuntur.

§. CCCXXXVIII.

Ab acutis lineae eminentes in utraque facie deorsum tendunt.

Intrinssecus utrimque a radice processus acuti linea aspera, cui accrescit membrana faucium, ad dentem ultimum vel penultimum molarem extenditur, quae cum alia quadam eminente, et a summo processus obtuse extrinssecus vergente linea, interstitium relinquit sinuosum.

CCCXXXIX.

Interna superficies anteriore et posteriori inaequalis est.

Reliquae partes superficiem internam concavam posterius mox eleuantes mox deprimentes, sunt nimiae lamellae internae eleuationes, ad radices fossularum vsque pertingentes. Anteriorius

ius eandem inaequalem et asperam reddit tuberculum, inferius circa symphy-
in menti eminens, superius acumina-
tum, quandoque bifidum, funda-
mentum quorundum muscutorum (§.
CCCXLII.).

§. CCCXL.

In interiore substantia (§. CCCXXXII.) *Canalis os-*
canalis tenuis osseus, maxima ex parte sensus infra
continuus, et ad vasorum neruorum radices den-
que vsum perforatus atque incisus, secundum ossis figuram flexuose incedit, in utraque
externe infra primos molares duobus superficie
orificiis ouatis terminatur, totidemque duobus pa-
maioribus et inaequalibus interne in-
fra processuum acutorum radices patet.
 Quum vero per illum nerui maxillares
 vna cum vasis arterioso-venosis du-
 cantur, ramuli quoque per *partes canalis*
interruptas ad radices et interiorē den-
 tium cavitatem pertingunt. Antequam
 autem nervus canalem ingreditur, ra-
 mum reflectit, qui in proprio *sulco* ad
 musculum mylohyoideum fertur.

§. CCCXLI.

Atque ita mobilis maxilla ad man- *Utilitas ma-*
 ducationem et loquelam summe ne- *xillae infe-*
 cessaria, faciem inferius perficit, *rioris.*
 ad pulchram illius confert figuram,
 M men-

mentum, partemque genarum facit
dentes inferiores recipit, oris fundum
insimul format, uasa et nervos admit-
tit, partibusque glandulosis et mem-
branaceis locum dat, nec non linguam
os hyoides, laryngem, et ex parte fau-
ces firmat.

§. CCCXLII.

*Quales mu-
sculi ab illa
oriuntur vel
eidem inse-
rantur?*

*Musculis etiam plurimis firmum
praestat fundamentum, horumque in-
gratiam hinc inde sinuosum et aspe-
riusculum est. Ex his in externa facie
infra dentes incisores, eleuatores labii
inferioris COWPERI sedem fixam ha-
bent. Triangulares ad latera mentis
positi, a basi acuminati, oblique ad-
scendunt, et in medio quadratum fo-
uent, a mento latiori principio versum
marginem orbicularis inferiorem assur-
gentem. Posterius masseteres in exter-
na angulorum facie terminantur. Buc-
cinatores a parte anteriore et infima
processuum acutorum ad alueolos den-
tium molarium procedunt. Tempora-
les in processibus acutis finiuntur. To-
ti demum basi vtrimque inseritur subcu-
taneus. Interne sub condylis foueae pro-
fundae pterygoideos excipiunt externos,
internos vero interiores angulorum par-
tes firmant. Mylohyoides basi et sym-
physi*

physi menti adhaeret, alueolisque dentium adcrefcit; Pone vltimum dentem molarem *mylo-pharyngaeus* oritur. *Mylo-glossus*, si adfit, sub *mylo-hyoides* a linea aspera prouenit: interea de directione illius dissectionum periti inter se non conueniunt, quum non nulli etiam fibras *mylo-pharyngaei*, ad et supra tonsillas excurrentes, ad *mylo-glossum* referant, nouumque inde musculum *glossopharyngaeum* fingant. Tandem vero internae menti symphyfi vtrimque biuenter, *geniohyoides*, et *genioglossus* inferuntur.

§. CCCLXIII.

Ope harum *machinularum maxilla inferior* tam in ossium temporum sinibus mouetur, diducitur, adducitur, quam ossi hyoidi, aliisque iungitur partibus: interea ex qualicunque causa, modo alterutra, modo vtraque parte recedit, atque in mentum, vel in oppositam partem distorquetur, vel, si antcrius protenditur, latissime hiat. Quando igitur sub oscitatione nonnunquam ita deorsum trahitur, vt condyli extra sedem propriam propendeant; processus acuti musculos distorquent, punctura conuellunt, partes aliter ac in sanitatis statu trahunt, neruos et li-

Modus luxationis et luxatae maxillae repositionis indicatur.

gamenta violenter tendunt, indeque nisi os opportune in sedem compellatur, periculosa saepius symptomata v. g. inflammationes, conuulsiones cet. producunt. Cautelae autem sub repositione maxillae exposcuntur vt os nec sursum, nec lateraliter, sed initio, in quantum licet, deorsum postea antrorsum, et denique sursum ducatur.

§. CCCXLIV.

Dentes.

Fossulis maxillae tam superioris quam inferioris, certo ac determinato ordine dispositis, cuneorum adinstar, ossis totius corporis durissima, perpolitum extra gingiuas prominentibus partibus infixae sunt, quae pro differente forma et specie cibum adprehendunt, extenuant, conterunt (§. CCCLX.), et dentes latinis, quasi edentes, Gr. ὀδόντες vocantur.

§. CCCXLV.

Generalis illorum consideratio ratione figurae, coloris, et modi coniunctionis.

In vniuersum, haud perfecte aequales sunt, sed vel magni, vel parui reperiuntur. Omnes coronis albicantibus naturaliter nitent, senio autem et incuria vel morbo corrupti, liuidi, nigricantes, et subobscuri fiunt. Quidam simplicibus, alii binis, ternis, quaternis, vel seiunctis, vel in vnum con-

onfluentibus radicibus asperiusculis, impositis, locellos, quibus ex aequo quadrant, et ad amussim respondent, periosteo subeunt, ac, ubi emergunt, membranulis et gingiua firmissime comprehenduntur, exacteque conglutinantur.

§. CCCXLVI.

Numerus dentium pro ratione longitudinis et breuitatis maxillarum variat. Numerus dentium, sedes, dispositio, et proportio,
 Si completus fuerit, accedit ad *triginta duo, sedecim* cuius offi competentibus, et ita dispositis, ut singuli, figura diuersi, *perpendiculariter nudis* prominent *coronis*, et *disiuncti* sint *intervallis* vel longioribus, vel breuioribus, iuxta *mirabilem* illam *symmetriam*, qua Dei insimul sapientiam miramur, ut *anterius* et *exterius* *quatuor acuti* et *latiores incisores*, *duo* ipsis proximi *acuminati*, *interius* denique et *posterius* utrinque *quinque molares*, latiore basi gaudentes, in toto utriusque maxillae ambitu *sedes* fixas habeant. Intuitu molarium, ad mandendum, ob oris in hominibus angustiam, *pluribus molaribus* opus fuit, quam in ferocibus animalibus.

§. CCCXLVII.

In genere dextri sinistris *magnitudine* et *numero* aequales prorsus, et ex eorum magnitudo, incrementum et decrementum,
 M 3 vtro-

utroque consentientes, *superni* tamen paululum maiores *internis* sunt. Proportio haec in bene disposita serie, ne volumine excedant, probe conseruatur, dum in concursu dentium sub manducatione, inferiores actiuitate musculorum quorundam maxillae inferioris ad superiores mouentur, singuli, ac mutuuum subeundum congressum, amplexu solidi corporis impelluntur, et continua frictione nimium illorum incrementum impeditur. Hinc ubi singulus singulo opposito ad amussim respondet, vtriusque lamina vitrea circa extrema erosa, attrita, et polita quasi adparet, aciesque illorum habetior fit in quibus vero alterius molae extremae magis prominent, vel dentes oblique in propriis alueolis infixi manent, non distrahuntur solum, verum quoque deficientibus oppositis, ob defectum resistentiae sufficientis, in longiores protrahuntur coronas.

§. CCCXLVIII.

*Substantia
duplex,*

Substantia, quae detritione minuitur, *limitato incremento* reparatur. Est autem duplex *externa vitrea*, marmorea et candida, *altera* priori crusta obducta, aspera, spongiosa, et subobscura a qua *interior sinus mucosus*, et perior

flee

eo obductus, in dies ita *imminuitur*,
 etque obcoecatur, vt obscurum in infi-
 na radicis parte remaneat foraminuli
 uestigium, quod nerui uasque sensa-
 tionis et nutritionis scopo ingrediun-
 tur (§. CCCXL.).

§. CCCXLIX.

*Materies dentium gypsea, crassitie et
 entore mucum refert. Dens enim in
 principio in forma folliculi albicantis,
 subobscuri, et tenacis adparet, et quo
 recentior, eo mucosior est. Pars erum-
 pens faui ad instar mellis excauata, te-
 nui squama tecta, mucoque referta
 procedente aetate durior fit, manet in-
 terea cauitas interna ad septennium vl-
 teriusque ampla, donec post casum
 priorum imperfectorum, regeneratio
 dentium fiat, et secundi e cellulis pro-
 priis extrudantur (§. CCCLI.). Hi utique
 rudi, adsumto iam in vtero principio,
 intra primum et secundum septenarium
 perficiuntur, eamque ob causam in ma-
 xillis duplex ordo sibi adiacentium lo-
 culamentorum anterior et posterior ob-
 seruatur. In posteriore secundi dentes
 ex parte quidem quoad coronas perfici-
 untur, et sub illorum voluminis au-
 gmento in priorum elapsorum seriem
 succedunt, vt ideo mirum non sit, cur*

*materia, ex
 qua gene-
 rantur, mo-
 dusque gene-
 rationis et
 regeneratio-
 nis.*

priores imperfecti maneant, sua sponte excidant, facillimeque extrahi possint.

§. CCCL.

Quo tempore
extra gingi-
uas erumpant?

Infantes post natiuitatem non statim indigent dentibus, quamuis in abortiuis gingiuis iam latitent; aliquando vero infantes incisioribus extra gingiuam in vtero iam protrusis, nasci, experientia confirmat. Ordinarium, quod primum superiores, posteaque inferiores incisores erumpunt, tempus est septimus post natiuitatem mensis. Hostono decimoque oculares et canini excipiunt, et tardius secundo natiuitatis anno priores molares prodeunt, reliqua successiue nascuntur; interea tempus eruptionis omnium adcurate definiri nequit, cum citius nonnunquam, vel serius etiam prouenire soleant.

§. CCCLI.

cadant et
renouentur?

A septimo aetatis anno ad decimum quartum dentes successiue decidunt, et renouantur; sero cadentes tardius renascuntur. Qui, antequam primi cadunt, renascuntur, in vno eodemque haerent alueolo, illiusque diametrum ita augment, vt nouus, extra seriem propulsus, in superiore mala exterius, et in-

interiore *interius* emineat; *omnes* autem secunda periodo *renouati*, nisi attriti, luxati, et morbofi, nobiscum consenescent.

§. CCCLII.

Vltimi molares σωφρονισῆγες genuini *Dentes sapientiae tardius* *antimique*, vel *tertio*, *quarto* et *quinto* *praeueniunt*; *septenario*, immo *tardius* non nunquam oriuntur, vel *imperfecti* in alveolis remanent. Ab his distincti, qui *rariores autem sunt*, *post casum secundorum* in *senectute* reperiuntur. Eiusmodi *rariores* sunt, et *qui post secundorum casum in senibus renascuntur*. *quoad coronas et radices*, ob debiti *succi nutritii defectum imperfecti* manent, facileque decidunt. Horum *binos*, qui, ad latera *ocularium* extra *gingivas*, post *casum secundorum* iam *concretas*, summo cum dolore, capitis afflictionibus, febrilibus commotionibus, nimis superius versus congestionibus erumpebant, in septuagenario venerabili fene vidi et miratus sum.

§. CCCLIII.

Omnes praeterea externe contra *inurias* probe muniuntur. *Exterior enim substantia* (§. CCCXLVIII.) lapillorum duritiem aemulatur, ferri aciem reiiicit, et citra dolorem lima comminui potest, sub exustione etiam parum molestiae

Pars dentis exterior dura insensibilis est, interior vero mollis sentit.

experitur. Quando destructa exteriori, aeri aliisque corporibus peregrinis aditus ad *interiorem substantiam* conceditur, saepius cum pulsu dolet. *Eadem* enim est mucosa et neruosa (§. CCCXLVIII.), intrinsecus periosteo inuestita, cui furculi neruorum maxillaris superioris (§. CCLXXV.) et inferioris (§. CCCXL.) vel simplices, vel in bifariam, trifariam et quadrifariam partem diuisi, vna cum vasis arterioso-venosis per perforatas accedunt radices. Hinc perspectu facile, quomodo neruus ingrata non nunquam sensatione adfici, et vna cum periosteo inflammari possit?

§. CCCLIV.

Diuisio dentium in tres series, et specialis descriptio a) incisorum,

Vniuersos diuidimus in *tres series*, quamuis cum EVSTACHIO *alii*, in subdiuisione molarium (§. CCCLVI.), *quatuor* constituent. Ex his priores *quaterni* in quauis maxilla *caninis* et *ocularibus proximi*, et in *anteriore vtriusque maxillae parte* positi, ab *incidendo*, quum cultri acuti et lati acie gaudeant, *incisores*, respectu vero *originis et situs primi* uocantur. *Coronas* habent *superius ampliores*, in medio *amplissimas*, *anterius gibbas*, *interius concavas*, ex angustiori et *crassiori basi* in

tenu-

tenuem aciem latefcentes; *radicibus* autem *simplicibus*, rectis, solidis, magnitudine non nullis cedentibus, plurimis saltem aequantibus, in propriis eiusdem figurae fuscipiuntur *fossulis*.

§. CCCLV.

Qui a lateribus insequuntur *canini* b) caninorum, et ocularium,
Gr. κυνοδόντες, ex κύων canis et ὀδὺς
dens, superius *oculares* dicuntur. *Vnus* utrimque ad incisorum seriem adstat; *duo* in qualibet maxilla. *Omni*bus est crassior moles, *corona* procerior, anteri-
us leniter reclinata. *Toti* conici in acutum abeunt verticem, et *radicibus* *simplicibus* solidissimis, reliquis longioribus et acutioribus, altius *alveolis* infixi sunt.

§. CCCLVI.

Qui post caninos sequuntur, in inferiore oris parte a loculamentis firmissime excipiuntur, et ad fauces tendunt, *posteriores*, siue *molares* sunt. nec non c) molarium, eorumque in anteriores et posteriores subdivisio.
Nomen ipsis ab usu impositum est, quum asperam molarum superficiem imitentur. A figura quoque *coronarum* *quadrangulares*, et a *superficiebus* *lati* vel *plani*, male vero *maxillares* dicuntur. *Decem* in quavis maxilla numeramus (§. CCCXLVI.), quos alii rursus

fus in *anteriores* et *posteriores* diuidunt, *priorisque* binos *anteriores*, *reliquos* autem *posteriores* adpellant.

§. CCCLVII.

Molares habent inaequales latiores bases,

Lterioribus muniuntur *basibus* ob continuam, quam sub masticatione patiuntur, attritionem; hinc *coronae* quodam modo conuexae in *superficiem latam*, et veluti in molis, hinc inde inaequalem, praesertim in medio paullulum sinuatam, abeunt, et circa partes extremas foueis cum eminentiis, in vtriusque maxillae dentibus sibi appositis, mutuo duarum quasi ferrarum ingressu, committuntur. Priorum *coronae minores breuioresque* sunt, duorum posteriorum, prioribus contiguum, *maiores*, *tertia corona* in specie *maxima*, et postrema *media* est.

§. CCCLVIII.

et in genere differentes radices.

Circa *radices* molarium, quae haud perpetua forma distribuuntur, ludit natura. Sunt enim in genere magnae, paruae, crassae, latae, tenues, compressae, acutae, obtusae, inaequales, parallelae, inflexae anterieus, posteriusque reclinatae, in fine non nunquam hamatae, ramosae, simplices, bifidae, trifidae, quadrifidae. *Geminae* insuper

per parallelae obseruantur; *ternae* duas
 ut plurimum minores, tertiamque ab
 his recedentem, maiorem inflexam.
 habent.

§. CCCLIX.

In specie prioribus superioris maxil- Specialis ra-
lae simplices, vel duplices disiunctae, dicum in
adnumerantur. Terti maxillae infe- molaribus
rioris latas, rectas, binas, aliquando differentia.
tres, superioris autem ut plurimum tres,
non nunquam geminas habent. Reli-
qui posteriores in ordine gaudent bre-
uioribus, parallelis tribus, quatuorue,
vel disiunctis, vel ex parte connatis,
magnitudine a prioribus paullulum re-
cedentibus.

§. CCCLX.

Dentes intuitu omnium opportunita- Usus den-
tum commode dispositi sunt. Praeter tium vel ge-
quod enim ob mirabilem proportio- neralis,
nem, et cuius maxillae competentem
iustum dentium positum ac interual-
lum, ad pulchritudinem conferant, actio
eorum potissima in comminuendis cibis
consistit. Sic anterioribus cibum capi-
mus, eumque perfecte incidimus, at-
que caninis insimul dura frangimus,
molaribus autem extenuamus, diuidi-
mus, et in pulmentum ac vniuniformem
 con-

conterimus massam. Ne autem haec *actio* labefactetur, ipsa *coordinatione* praecauetur, ne sub motu attritionis aliquid effluat, sed rude potius mixtionis initium, accedente calore interno et adfluente saluua suscipiatur.

§. CCCLXI.

vel specialis.

In specie maxillae superioris incisores ad sermonem confere, et quamuis non omnium, quorundam tamen verborum prolationem adiuuare, inde cognoscimus, quia, elapsis iis, verborum explicatio imperfecta fieri solet. Infantes initio sine dentibus vagiunt, prominentibus incisuiis et caninis, quibus, dimisso lacte, in comminuendis cibis vtuntur, mullitant, ore autem dentibus anterieus, et ex parte posterius referto, distincte loqui incipiunt.

§. CCCLXII.

Dentes figura, magnitudine, situque a naturali ordine recedentes.

E dentibus, qui figura, magnitudine et positione a naturali ordine recedunt, notamus I) molares sibi inuicem connatos, materia lapidea, absque distinctionis vestigio, incrustatos, II) omnes tam substantia et volumine, quam adhaerente tartarea materia, excedentes, auctaque magnitudine, figuram equinorum nonnunquam referentes,

tes, et III) illos speciatim, qui in palato quandoque prouenire solent.

§. CCCLXIII.

Intuitu *adfectionum*, quae dentibus Dentium adfectiones. eueniunt, obseruandum, illos variis modis fieri *putridos* et *excauatos*, ab humorum impetu *dolere*, collectione materiae tartareae circa loculamenta *vinculis solui*, ac in *senibus*, consumptis *gingiuis mobiles* fieri.

§. CCCLXIV.

Quales *perforatio periostei* et *gingiuarum*, erumpentibus prae primis acutis, in corpore producat effectus, Effectus a perforatione periostei sub dentitione. *infantes* praecipue sub *dentitione* experiuntur, quos inde saepissime *inflammationem*, *febrem*, *delirium*, *convulsiones*, *alui deiectiones aeruginosas*, *cruentas* cet. pati, antiquissimis temporibus iam obseruatum fuit.

§. CCCLXV.

Ad exercendam vilissimam nostris Ad dentes tuto eruendos requiruntur eorum maxillarumque cognitio. temporibus dentium chirurgiam, et *tuto eruendos dentes*, *maxillarum dentiumque perfecta* requiritur *cognitio*, ne forsan ex ignorantia infensae maxillis fracturae, fistulosae excauationes, aliaque plurima producantur mala. Ca-

uendum, quoque ne *euulsioni oculorum inflammatio oculorum* superueniat, quum longissimis quandoque radicibus, in imperfectis saepius alueolis haerentibus, proxime ad orbitas directi sint (§. CCCLV.).

§. CCCLXVI.

Os hyoides.

Appendicis loco capiti iungimus os paruum, spongiosum, mobile, semicirculare, bicornē, linguae basi adhaerens, et tanquam fundamentum linguam inter et laryngem positum, vel *linguale*, vel ob figuram literae graecae *ὤψιλον*, succinctius *ὠοειδὲς* dictum.

§. CCCLXVII.

Partes illud componentes sunt basis, et cornua maiora.

Quinque constat *frustis*, in iunioribus *distinctis*, in adultis vero *connatis*. Horum *praecipuum corpus et basis*, siue *media pars incuruata, lata, exterius inaequalis et convexa, interius sinuosa* est. Vtroque ex latere surgit *cornu maius*, longius corpore, et in principio *latius*. *Externa facie* ad modum *maxillae inferioris*, cui totum os *ratione figurae* ex parte aequat, *angulum* reflectit, *successiue angustatur*, et in fine *crassescit*.

§. CCCLXVIII.

§. CCCXLVIII.

In loco coniunctionis corporis cum *His accedunt*
 alis, e superiore margine *cornua mino-*
ra, siue ossicula *exigua, oblonga, tri-*
ticea, graniformia, in iunioribus mol-
 liores et *cartilaginea, in adultis solidio-*
ra, versus linguae radicem oblique sur-
 gunt, lateraliterque ossibus temporum
 iunguntur (§. CCCLXIX.).

§. CCCLXIX.

Liberum hocce os nullum aliud imme-
 diate attingit, sed *mollioribus* partibus
 aliis vnitur. E superiore enim et in-
 teriore corporis margine ad cartilaginis
 scutiformis mediam, eminentem et su-
 periores partem, *ligamentum latum*
 abit. *Cornua maiora* in extremis tumi-
 dula (§. CCCLXVII.) *gracilioribus liga-*
mentis, in quorum medio *breuiora ro-*
tundioraque obseruantur *ossicula*, supe-
 rioribus cartilaginis thyreoideae extre-
 mitatibus firmiter nectuntur; *minora*
 ope ligamentorum rotundorum, graci-
 lem tendinem referentium, processu-
 bus styloideis ossium temporum adu-
 nantur; *totum* denique linguae, laryn-
 gi, pharyngi, sterno, maxillae infe-
 riori, claviculis, scapulis, tempo-
 rumque ossibus ligamentosis ac mu-
 sculosis partibus iungitur, et praeci-
 pue

Cum quibus
partibus os
hyoides mo-
bile sit?

pue a musculis linguam, malam inferiorem, laryngem, et pharyngem, in motum ducentibus, diuersimode mouetur.

§. CCCLXX.

Quales musculi ipsi inserantur?

Huc vtrunque spectant: *biuenter*, quae parte media tendinea symphyssi cornu maioris cum corpore ossis accrescit: *stylo-hyoides*, cuius finis cornu maius *mylo-hyoides*, qui basi marginique illius inferiori inseritur; *genio-hyoides*, in situ erecto hominis priori incumbens, et externae corporis superficiei infixus; *coraco-hyoides* in basi, et *sterno-hyoides* iuxta praecedentem in margine ossis inferiore desinentes, *hyo-thyreoides*, qui partim ab externo corporis et cornu maioris margine, partim ab interiore sinuositate oritur; *genio-glossi externus*, supra genio-hyoideum in margine baseos superiore terminatus; *mylo-glossus* (§. CCCXLII.), nec non *cerato-basio-glossus*, a cornu maiori et basi procedentes. Hisce addimus *hyo-pharyngaeum*, qui a basi ad pharyngem tendit, et *hyo-epiglotticum*, rectius *gloss-epiglotticum*, quatenus sub ligamento medio a radice linguae, immo a basi ossis hyoidis, ad epiglottidem pallidis fibris extenditur.

§. CCCLXXI.

§. CCCLXXI.

Quum *larynx* cum osse hyoidis intime *Larynx.*
 cohaereat (§. CCCLXIX.), eiusque *sub-*
stantia cartilaginea cum aetate in *osseam*
 mutetur; ex parte in *osteologia* mere-
 tur attentionem.

§. CCCLXXII.

Est autem *λάρυγξ* caput tracheae in *ex quatuor*
 anteriore colli parte situm, et *quatuor* *constat car-*
cartilaginibus proprie compositum, *tilaginibus,*
 cui superius accedit *ἐπιγλωττίς* siue la- *et superius*
 nella elastica, crassa, tendinea, for- *epiglottide*
 minulis repleta, superne glottidem, *tegitur.*
 seu ellipticum laryngis os tegens, ne
 quid sub deglutitione per rimam in aspe-
 ram arteriam illabatur, et suffocatio in-
 de cum praesentissimo mortis periculo
 oriatur.

§. CCCLXXIII.

Πρῶτη θυροειδής, scutiformis, reliquis *Cartilagine*
 maxima, lateraliter in *duas alas*, aequa- *laryngis sunt*
 es, *superius excisas* et *anterius* in *scutiformis,*
media parte, quam vulgo pomum Adami
 vocant, eminentes, expansa est. *Extre-*
mitates alares superius in duos praelon-
 gos, tumentes et obtusos *retrorsum*
 liuergunt processus; *inferius* vero in
breuiiores, eiusdemque cum cartilagine
crassitie, migrant. *Illi* firman-
 tur liga-
 N 2 mentis

mentis rotundis (§. CCCLXIX.); *hi* vero cartilaginis annularis attingunt latera (§. CCCLXXIV.), ipsisque articulatione vera, ope ligamentorum committuntur.

§. CCCLXXIV.

annularis,

Altera, a figura annuli rotunda *αγοαιδης* nominata, instar fundamenti reliquas recipit, et cum aspera arteria adunat. *Anterius* ita rescissa est, ut arcior ipsius arcus, una cum scutiformi interstitium relinquat, membrana musculisque clausum. *Posterior* cartilago latefcit, ex latissima basi pedetentim in angustiores et obtusiores migrat summitates, in medio linea aspera diuisa est, *lateraliterque* circa basin ab extremis cartilaginis scutiformis, cum quibus articulatur (§. CCCLXXIII.), impressiones accipit.

§. CCCLXXV.

*et gutturni-
formes.*

*Αγοτανοαιδης, guttalis duplex, tertiam quartamue cartilaginem, proprieque gutturnium efficit. Binae circa extrema obtusa et latiora, aliquot lineis diuergentes, posteriori cricoidis partis eiusque summo vertici superimponuntur, peculiaribusque ita firman-
tibus articulis, ut, interueniente mem-
brana*

brana, vnicam quasi referant cartilagine-
nem; interea agentibus illarum muscu-
lis, glottis et constringi, et dilatari, in-
deque pro diuersa hac mutatione soni
scutissimi, validissimi et grauiissimi edi
possunt.

§. CCCLXXVI.

Quae ab ima cartilagine continuatur
fossula, circellis imperfectis cartilagineis
et membrana facta, in tantum in osteo-
logia consideranda, in quantum carti-
laginea illius *substantia*, pro aetatis ra-
tione, in senibus, ad instar supremae
partis (§. CCCLXXI.) *oscescit*.

*Quatenus
fistula spirae-
lis in osteo-
logia consi-
deranda?*

§. CCCLXXVII.

*Musculi laryngem diuersimode mo-
uentes* constituunt diuersa paria. *Vtrim-
que musculus sterno - thyreoides late-
ribus cartilaginis scutiformis inseritur;
hyo - thyreoides basi laterique eiusdem
cartilaginis infigitur; crico - thyreoides an-
terius a cartilagine cricoide ad thyreoi-
dem abit; crico - arytaenoides lateralis
transuersim inter binas eiusdem deno-
minationis cartilagine positus est, vti
et thyreo - arytaenoides, cum altero op-
posito rimam glottidis constituens.
Stratum fibrarum longitudinalium,
quod supra crico - arytaenoideum la-
teralem*

*Musculi la-
ryngem di-
uersimode
mouentes.*

teralem progreditur, et in scutiformi finitur, *teres* nominatur. *Cric*
arytaenoides posticus posteriori annu-
 laris superficiei, et *arytaenoides*, alii
cric aritaenoides superior, posticae ary-
 taenoidearum cartilaginum parti adhae-
 rent; in summitate autem *ary-ary-*
taenoides stratis fibrarum, oblique se
 inuicem decussantium, locum habet.
 Qui a diuersarum cartilaginum ante-
 riore facie ad pharyngem lateraliter et
 oblique descendunt, sunt thyreo et cri-
 co-pharingaei. *Ary-epiglottiei* demum
 ratione structurae, ad instar yo-epi-
 glotteorum (§. CCCLXX.), tenues et
 membranei, a cartilaginum aritaenoi-
 dearum apicibus oblique ad epi-
 glottidem diriguntur.



C A P V T III.

DE

DE TRVNCO SCELETI.

§. CCCLXXVIII.

Pars altera *sceleti*, post caput maxima, ex spina dorsi, thorace, peluique composita, *truncus* vocatur.

*Pars altera
sceleti truncus est.*

§. CCCLXXIX.

Spina dorsi, Graecis *ρῶξις*, a processibus, in modum *spinarum* deorsum extensis, dicta, in vniuersum denotat columnam ossilem flexilem et firmam, a capite ad anum vsque extensam.

Spina dorsi.

CCCLXXX.

Non in totum, sed ex parte tantum continuata est. Constat enim ex simplicibus et compositis vertebris, mirifice abrefactis. Priores septem colli, duodecim dorsi, et quinque lumborum, circa syntaxi vnitae, catenatam distinctorum, mobilium, orbiculariumque ossium compagem exhibent; posteriores vero duo sunt continua ossa, maximum et minimum, ex diuersis, in se mutuo fusis, composita vertebris (§. CCCCXX. CCCCXXX.).

*Eiusdem ex
simplicibus et
compositis
vertebris
compositio.*

§. CCCLXXXI.

§. CCCLXXXI.

Quibusnam
potissimum
partibus vi
compositionis
prospiciat?
quasnam
stabiliat, et
a quibus ful-
ciatur?

Mirabili hoc satisque *firmiter* domi-
cilio Sapientissimum Numen *securitatis*
medullae spinalis prospexit, fistulam-
que osseam, pro diuersis motibus cor-
poris peragendis, absque metuendo
laesionis, vel compressionis neruorum
et vasorum, quae tuto in vtrumque la-
tus ducuntur, periculo, reddidit mo-
bilem. Ad columnam erectam fulcien-
dam latum et constans apposuit funda-
mentum; pro figuranda pelvis caui-
tate lateraliter ossa iunxit innominata,
eaeque robustissimis, flexilibus, et in ex-
tremis latissimis stabiliiuit fundamentis.
Superius capiti, lateraliter costis, et
ab ipsis cum sterno formando magno
ac oblongo thoracis cauo, inferius au-
tem firmandis mollioribus abdominis
partibus, regulari simplicium vertebra-
rum dispositione, et conueniente stru-
ctura stabilitatem dedit, totumque de-
nique truncum ad varios vsus, corpo-
risque aequilibrium, superius et latera-
liter mobilibus instruxit vectibus.

§. CCCLXXXII.

Ratio diuer-
sae spinae fi-
gurae in re-
cens natis et
adultis.

Vertebrae ab agilitate Graecis σπόν-
δυλοι dictae, coniunctim *figuram* in
utero et recens natis *perpendiculararem*,
fereque *pyramidalem*, in adultis vero
et

et decrepitis instar *literae S*, plus minus *inflexam* referunt, quam inutationem ab ipsis musculis, prout spina ad necessarios vsus inclinari, flecti, et torqueri solet, prouenire, et omnia, quae dorsum ad certos fortiores, longeque continuatos motus determinant, figuram insimul spinae mutare concludimus.

§. CCCLXXXIII.

Candida inchoamenta ossificationis vertebrarum sceleti humani primo conceptionis mense distincte adparent, et in ouis incubatis post integrum diem iam obseruantur (§. XXIV.). Probat adsertum TAB. I. FIG. III, in qua *puncta albicantia* primordia ossificationis corporum, reliquae autem obscurae partes imperfectam illarum cartilagineo - membranaceam substantiam monstrant. *Eadem* illustrat icon sceleti trimestris (TAB. II. FIG. I. b. b. b.) *partesque pariter, ad latera foraminis ossescentes, in medio a se inuicem separatas, et ratione defectus spinosorum processuum periosteo iunctas*, TAB. II. FIG. II. e. e. ostendit.

Principia
ossificationis
vertebra-
rum,

§. CCCLXXXIV.

Tribus itaque partibus quaelibet vertebra in statu imperfecto composita est

illarum ex
diuersis par-
tibus compo-
sita.

(§.CCCLXXXIII), si colli verticillos, in plures diuiduos partes, excipias. Corporis pars superior et inferior diutius manet cartilaginea, lateralibusque, spinae rudimentum continentibus, eadem substantia interiecta est. Sub incremento lateralium, omnes eminentes processus instar epiphysium initio cartilaginei, ad loca vsque coniunctionis ossescunt, et a conglutinatione lateralium mucronati, seorsim tardiusque indurescunt.

§. CCCLXXXV.

et interna
ac externa
structura.

Partes inter se succeffiue in vnum os confluentes, leuissima faciunt ossa, spongiosa et fungosa, tenui obducta porosa, ac pro valis nutrientibus, medullamque fecernentibus, patula lamella.

§. CCCLXXXVI.

Generalis
vertebrarum
descriptio,

In vniuersum corpora magnitudine ac specie differunt, et crassiora, lata, magna, breuiora, compressa, lateraliter hinc inde depressa, anterieus conuexa, superius et inferius plana, posterius sinuosa sunt. Latera retrorsum flexuose excisa, diuersos emittunt processus, duos ascendentes, totidem descendentes, et transversales, postea arcuata latefcunt, et confluentia in singulis, magno in-

anteriorius relicto interstitio et forami-
ne, processum formant spinosum; ut
ideo quaelibet, exceptis prioribus (§.
CCCXCIII.), septem gaudeat apophy-
seis.

§. CCCLXXXVII.

Iuxta differentiam, quae in corpori-
bus vertebrarum animaduertitur, disse-
runt quoque interiacentes, et in ossium
marginibus instar epiphysium promi-
nentes lamellae. Vertebrae, quae ab osse
sacro sustentantur, et reliquam fistulae
osseae partem sustinent, maxima ha-
bent corpora, cartilaginesque crassissi-
mas, firmas, laeuigatas et elasticas,
quibus lumborum flexilitas augetur.
Reliquarum corpora ad superiora ad-
scendentia, successiue gracilescunt, la-
teraliter deprimuntur, planis superfi-
ciebus, quae tenuioribus incrustantur
cartilaginibus, exceptis primis supe-
rioribus dorsalibus, strictiorem exer-
cent motum, et pro firmando thorace
rigidiora fiunt. Corpora demum, quae
superius dorsalia excipiunt, latiora sunt,
et adscendendo volumine imminuun-
tur, donec ad supremam et latissimam
pertingant vertebam. Quum vero me-
diantibus crassioribus cartilaginibus laxa
nectantur, magis quidem obsequiosa
sunt,

corporumque
et iisdem in-
teriectarum
cartilagi-
num,

sunt, nihilominus tamen caput absque impedimento necessariae ipsius mobilitatis, stabiliunt.

§. CCCLXXXVIII.

nec non processuum, quos latera emittunt, differentia.

Tota columna posterius spinis eminet, superius crassioribus et tenuioribus, prominulis, rectis, vel simplicibus, vel mucrone bifido distinctis, postea circa medium et in illo decliuioribus, deorsum continuatis, sibi inuicem superimpositis, longioribus, breuioribusque, inferius autem crassioribus, et horizontaliter exporrectis. Lateraliter processus protuberant oblique ascendentes et descendentes, in collo et dorso minores, versus lumbos latecentes, et in lumbis crassissimi, ac latissimi. Transuersi demum valde inter se dissimiles sunt. Colli quidem vertebrae transuersim emittunt plus minus longiores, breuiores, in priora decliues, perforatos, sinuosos, dorsi crassiores, validiores, longiores, sursum retrorsumque ductos, anterieus in extremis leuiter sinuatos, lumborum autem tenues, longosque, non nihil sursum et retrorsum ductos.

Canalis ossei ex coniunctis vertebris, formatio et utilitas.

§. CCCLXXXIX.

A corpore demum et lateribus in quauis vertebra *amplum* fatis et *triangulare*

gulare componitur *foramen*, quod in *atlante amplissimum*, successiue decre-
scit, in vltimis *dorsi* et *lumborum* verte-
bris rursus *latefcit*, et in *osse sacro* de-
nuo *angustatur*. Ex compositis omni-
bus oritur *fistulae* oblongae, erectae,
ex parte rigidae, cum firmitate tamen
flexilis (§. CCCLXXXVII.), basi ossis
sacri innitentis, *canalis*, a productione
laminae externae durae matris inuestitus
(§. LXIX), *medullam spinalem* continens,
e quo per *semicirculariter excisa late-
ra*, ex parte a corporibus distantia, et
coniunctim ante productiones apo-
physium *canales communes* formantia,
nerui ad collum, dorsum, lumbos, pel-
uimque egrediuntur, superius vero
recurrentes WILLISII e medullae spi-
nalis parte posteriore cranium adscen-
dunt.

§. CCCXC.

Omnes autem vertebrae, tam quoad
corpora, quam processus, vel sibi in-
vicem, vel prima cum capite, dor-
siles cum costis, vltima lumborum cum
prima ossis sacri, sacrum cum inno-
minatis et coccyge committuntur (§.
CCLXXXI). Vbi partes aliæ alias tangunt,
cartilaginibus plus minus crassis obdu-
cuntur (§. CCCLXXXVII.), *leuiter* vero

Vertebrae,
vel inter se,
vel cum aliis
mobiles, li-
gamentis
colligantur.

in apophysibus incrustantur, vndique tamen pro impedienda dislocatione et asperitate, ob multiplicem, quem incurrun, motum, sufficienter *vinculis* constringuntur, et, ne determinata earum, vel inter se, vel cum aliis ossibus pereat mobilitas, quouis modo praecauetur.

§. CCCXCI.

Generalem
vertebrarum
considerationem
specialis
sequitur.

Ex praemissis generalioribus patet, qualis in vniuersum sit vertebrarum structura, spinaeque osseae, ex ipsis compositae, figura; quae vero in *diuersis speciebus*, et ab omnibus vertebrae accidant mutabilia, in sequentibus ad speciale examen reuocabimus.

§. CCCXCII.

Numerus,
dispositio et
distantia
vertebrarum
colli.

Iuxta ordinem specierum *septem vertebrae*, caput inter et costas primas, sibi inuicem superimpositae, *anterius collo, posterius cervici* formam, non quidem corporibus protuberantibus, sed planis, arcuatis, et compressis, superius sinuatis, inferiusque conuexis largiuntur. *Singulare hoc artificium* efficit, ne fistula spiralis et oesophagus ipsi incumbentes, sub inspiratione et deglutitione comprimantur, metusque suffocationis inde excitetur; determinata

minata vero distantia, caput inter et corpus, fundamentum est propulsionis aeris per longiorem fistulam, longiorisque primae ciborum in canali membranaceo digestionis.

§. CCCXCIII.

Plerasque nouem habere apophyses, Illarum processuum non nullorum est sententia, sed in perfectis septem sufficiunt (§.CCCLXXXIV.), si duas superiores, quarum primae una deest, et secundae, noua accrescit, excipias. *Reliquae colli*, a septima ad tertiam vsque in partibus omnibus fere similes, successtue gracilescunt.

§. CCCXCIV.

Suprema omnium, latissima colli, capiti subiecta, ab ἀτλάω, quod caput sustentat, *atlas* nominatur. *Corpus* Descriptio atlantis a) quoad corpus et illius internam structuram, habet tenue; compressum, anterius parum eminens, et orbiculatum. *Arcus osseus* osseus *marginē superiori*, posterius ad didiam ossis substantiam *fulcatus* efficit, ut vasa vertebralia, ibidem horizontaliter recubantia, tutissime ad loca determinata deduci possint. *Interior* et *anterius* in sinuum intervallo *compressione* gaudet *superficiali* et *ouali*, qua ad processum dentiformem epistrophei, sub diversis capitis inclinationibus,

bus, cum stabilitate, et absque metuenda medullae laesione admouetur. Sub sinuositatibus enim pro articulationibus cum capite, *lateraliter* adstant *eminentiae*, *validum* recipientes *ligamentum*, quod ab vna ad alteram *transuersim* ducitur, quodque non processum odontoidem solum firmat, verum medullam etiam in amplissimis omnium foramine tuetur.

§. CCCXCV.

b) processus
oblique ad-
scendentes, et
modum con-
iunctionis
cum capite,

Processus, qui ex *lateralibus superioribus* et *oblique adscendunt*, per omnia, figura, magnitudine, ac positione, externae condylorum ossis occipitis superficiei (§. CXXXV.) respondent, et profunde sinuati, tenuique cartilagine obducti sunt. Ratione huius coniunctionis cum capite, quam valido satis vinculo muniuit natura, atlas caput ita sustinet, vt cum illo vel in gyrum, vel ad partes laterales, absque villo impedimento, diuersimode commodeque moueri possit.

§. CCCXCVI.

a) apophyses
oblique de-
scendentes,

In *inferiori margine processus plani et declines*, cartilaginibus crustati, adscendentibus epistrophei superimpositi, laxius cohaerent, utique tamen, ad instar

instar omnium, pro fulcienda spina, vinculis abunde satis firmantur.

§. CCCXCVII.

Apophyses laterales, prae reliquis ^{et d) trans-}
colli *transuersalibus*, longae, crassissi- ^{uersales.}
maeque, *geminis radicibus* deorsum
vergunt. Ex arcu circuli vtriusque
prior latior et crassa, *posterior* tenuior,
inter oblique adscendentem, et descen-
dentem surgentes, in amplum, cras-
sum, inaequaliter eminentem, supra
gibbum, infra sinuosum coeunt *proces-*
sum transuersalem, relicto sub earum
commisura *foramine orbiculari*. *Defe-*
ctum processus spinosi parua et perpen-
dicularis supplet eminentia.

§. CCCXCVIII.

Altera, quae summam cum mobili- ^{Summam}
tate sustinet, *epistropheus* siue *axis*, ^{sustinet epi-}
Graecis ἐπιστροφεύς, ἄξων, dicitur, il- ^{stropheus.}
ludque proprie significat os orbiculare,
circa cuius appendicem caput cum pri-
ma vertebra, quasi rota circa axem, mo-
uetur. Olim *prima* eodem nomine ve-
niebat.

§. CCCXCIX.

Corpus eius reliquis colli crassius, soli- ^{Structura il-}
dus, magisque compressum, *superius la-* ^{lius corporis,}
tescit,

*anterius prominulum, asperum, inf
riori margine, pro firmiori cum tert
nexu, semicirculariter exsectum, angust
tur, et in vtraque lata et plana superfic
cartilagine obducitur (§. CCCLXXXVII.*

§. CCCC.

*processum-
que obliquo-
rum,*

*Duo ad latera illius superius oblique
posita tubera ovalia, plana, conuexa
supra corpus paullulum eminentia, car
tilagine laeuigata, summae excipiunt
processus oblique descendentes (§.
CCCXCVI.); inferiores vero et minores
obliquae eminentiae, planae, politae
quodam modo retrorsum ductae, eius
dem figurae et magnitudinis, process
bus adscendentibus tertiae iunguntur*

§. CCCCI.

*nec non
transuersa-
lium,*

*Gemina vtrunque radice eminentia
emittit transuersales, prioribus breuice
res, deorsum extrorsumque inclina
tes, extus gibbas, intus sinuosas, fco
ueisque ad latera corporis a priori pa
tentes.*

§. CCCCII.

*aeque ac spi-
nosi,*

*Latera latiora coniunctim cum co
pore non angustius solum, figura
triangularis, producant foramen, ve
rum posterius in latissimum, et reliqui
coll*

colli vertebrae crassissimum, abeunt
processum spinosum, infra mediam illius
 partem *bifurcum*, linea acuta diuisum,
 lateraliter sinuatum, et inferiore super-
 ficie inaequalem.

§. CCCCI.

Praeter arcum cum proximis verte-
 bris per vincula nexum (§. CCCXC.)
processu adhuc *proprio*, sese in *sum-*
mae capacitatem ope *transuersi liga-*
menti (§. CCCXCIV.) insinuante, et
altero, ex apice *ipsius* prodeunte *liga-*
mento, ossi occipitis alligatur.

Specialis
ipsius cum
vertebra pri-
ma et occi-
pite conne-
xio.

§. CCCIV.

Apophysis haec, in foetu vero *epiphy-*
sis, inter tubera (§. CCC.), crassi ad in-
 tar solidiorisque perpendiculariter ere-
 cti *processus*, axi, vel denti canino
 similis, e medio corporis surgit, in-
 deque *dentiformis* Gr. *ὀδοντοειδής*, *πυ-*
ρροειδής dicitur, in medio et lateraliter
 angustior et compressa est, *anterius* te-
 nes, tenuique obducta cartilagine, *po-*
sterius leuiter conuexa, graciliorque;
superius autem crassa asperiuscula in
 summo acuminatur.

Structura et
figura pro-
cessus denti-
formis.

§. CCCC.V.

Reliquarum
colli verte-
brarum, nu-
mero distin-
ctarum, con-
formatio quo
ad corpora
et processus
obliquos,

Tertiae vertebrae quidam nomen *axi* tribuunt; cum vero nihil habet, quod *axi* simile est, rectius *numero* a reliquis *colli* distinguitur. *Harum corpora* autem superiora versus successiue gracilescentia (§. CCCXCIII), et *processus obliqui*, prioribus multo minores, plani ac decliues in posteriora accliuies, in priora cartilaginibus leuiter crustati sunt, laxequae constricti, colli mobilitatem, flexionem, et lateralem inclinationem iuuant eumque insimul stabiliunt.

§. CCCC.VI.

transuersos
perforatos,

His interpositi *transuersi* latioribus emergunt basi, extremitatibusque posterioribus crassioribus, recuruantur *anterioribus* rectis, e corporum lateribus prouenientibus, eminent. *Utraque* in progressu deorsum oblique descendendo confluunt, ex confluentibus autem oriuntur processus breues decliues, superius sinuosi, inferius conuexi, foraminibus orbiculatis, in prioribus fursum, in posterioribus retrorsum spectantibus, pertusi.

§. CCCC.VII.

et spinosos;
ut plurimum
bifurcos.

Spinosae apophyses, a tertia ad sextam deorsum directae, sibi inuicem incumbunt

unt, superius conuexae sunt, inferius
 oncauae, lateraliter latiores crassiores-
 e, extremitatibus vero plus minus bi-
 arcae, exceptis vltimis, rectioribus,
 ongioribus, et quodam modo reclia-
 tis. Omnes coniunctim collum
 abiliunt, validisque ligamentis inter-
 pinalibus ad inuicem adducuntur, et
 etinentur.

§. CCCCVIII.

Septima HIPPOCRATI per excellen- *Differentia*
 am μέγας, magna, Graecisque a mu- *vertebrae vl-*
 ere, quod instar atlantis colli totius *timae colli a*
 olem, ipsique caput superimpositum *reliquis.*
 ert, ἄτλας quoque dicta fuit. Differt
 prioribus, dorsalibusque, latiore et
 ompressiore corpore, auctis obliquis
 ophyfibis, transuersis amplioribus,
 osterius crassis et latioribus, parum
 nuosis, deorsum oblique directis, an-
 erius gracilioribus et tenuioribus, nec
 on spinoso processu rectiore, longio-
 e, reliquisque in apice latiore, et ob-
 use reclinato.

§. CCCCIX.

Caeterum in *vertebris colli duo* adhuc *Canales pro*
 ctendenda; *primo*, quomodo verte- *neruorum*
 rae sibi inuicem superimpositae *cervicalium*
unctim pro nervorum cervicalium *egressu, et*
con- *vasorum*
nectim *vertebra-*
um *lium ad-*
egressu *sensu.*

egressu *canales* efficiant? et *secundum* qua ratione ex transuersis perforatis pro adscensu vasorum ceruicalium *canalis osseus* fiat? Quoad *prius*, ex ceptis primis superioribus, reliqua colli magis ad compositionem laterum communium foraminum confidunt, et in decliuioribus oblique descendentibus sinibus, neruos fouent ceruicales. Intuitu *posterioris* momenti ex transuersis patulis, sibi' supereminentibus, *canalis* quasi *perpendiculariter sursum* dirigitur, qui in superioribus *extrorsum retrorsumque* tendens (§. CCCCVI.), in *primae sinuositate* (§. CCCXCIV.), per anfractus ad magnum osis occipitis deducit foramen. Iuxta directionem *canalis* vtriusque ascendit arteria vertebralis, flexuoso cranium subit, comitemque habet venam, quae per foramen, post condyllum occipitis apertum (§. CXLI.) sinum adit lateralem.

§. CCCCX.

*Vertebrae
dorsales.*

Quae ordine iam sequuntur, *duodecim* sunt *dorsales*, numero potius, quam nominibus distinctae, quamuis fuerint qui istis nomina imposuerunt. Solim *prima thoracica* ἀσφαλεια, firma ac solida, ipsique *proxima* et axillis v

cii

ina *μασχαλισή*, *ultima* vero a *diaphragmate διαξώση* uocabantur.

§. CCCCXI.

Harum corpora superius inferiusque *Earum corpora*,
ata, plana, superiora versus a duodeci-
na ad secundam gradatim breuiora
unt (§. CCCLXXXVII.); interea *corpo-*
a binarum superiorum versus collum la-
escunt, et in medio *spinae* quodam-
nodo graciliora, anterieus prominent.
Vbi lateraliter deprimuntur, accipiunt
mpressiones foveasque plus minus latio-
res, ex parte supra corpora eminentes,
imperfectas, quae a secunda ad deci-
nam vsque, a *coniunctione duarum ver-*
tebrarum, et quidem circa marginem
inferiorem prioris, et superiorem sub-
iacentis perficiuntur; *prima* autem et
binarum inferiores in corporibus proprios et
imperfectos habent *sinus*. Omnes cartilagi-
nibus tenuibus obducuntur, maiora
recipiunt costarum capitula, et com-
muniter cum illis circulationem sub-
eunt.

§. CCCCXII.

E *lateribus*, horizontaliter extensis, et partes la-
superius leuiter, *inferius* vero profun- terales, ex
dus arcuatis, *coniunctim* ab omnibus quibus emer-
dorsi vertebrae vtrimque *duodecim com-* gunt diuersi
munia processus
obliqui,

munia pro nervis intercostalibus oriuntur *foramina*. *Processus* quoque emittuntur ouales in posteriora *acclives* et minores, ac priora *declives* et maiores proximiusque ad lumbares latiores, de reliquo vero plani, aequales, sibi invicem superimpositi, cartilaginibus crustati, et ita ligamentis muniti, vix absque nervorum pressione corporum cum firmitate antrorsum, retrorsum lateraliterque inclinari et incurvari possit.

§. CCCCXIII.

et transversales,

Qui *transversim* exporriguntur sursum retrorsumque tendunt. Ex his *superiores*, *posteriore margine* concavi longissimi, aequales, teretesque, *inferiores*, recti, brevioresque observantur; *ultimarum* vero brevissimi, tubercula aspera et inaequalia denotant, quae in ultima oblique retrorsum ducta, latissimam eiusdem processus spinosi summam continent partem. *Anterius*, excepta ultima, minora costarum capitula in *foraminibus* excipiunt. *Sinus* in apicibus superiorum ampliores, diversimode vel retrorsum lineamve rectam respiciunt, vel in inferiorum summitatibus minores, et inaequales, ex parte sursum diriguntur: omnes vero cartilaginibus politis crustati.

rustati, et capsularibus vinculis cum capitulis costarum constricti, iisdem praestant mobilitatem.

§. CCCCXIV.

Intuitu *spinosa*rum, posterius produ- Differentia
arum apophysium, quatuor superiores apophysium
 atescunt, duae priores vero, mediis mi- spinosa
 nores, magis a se inuicem distant, in in dorsali-
 apicibus non attenuantur, sed aspe- bus.
 riuscula et inaequalia referunt tubera.
Mediae decliniores, longitudine fere re-
 liquas superant, in summitatibus acu-
 minatae et extensae, sibi inuicem in-
 cumbunt, et a quinta ad decimam vs-
 que pro firmanda spinae arctius com-
 primuntur. Ex inferioribus vertebrais,
 in lateribus et apicibus lateſcentibus,
decliuitas processus spinosi in penultima,
 et maior adhuc in vltima obseruatur;
posterior vero vltimae dorsalis, *spinosa*
primae lumborum assimilatur.

§. CCCCXV.

Vertebrais his insignes *quinque lum-* Vertebrae
bres subiectae sunt. Harum *prima*, lumborum.
 thoracicam vltimam sustinens, ob re-
 num vicinitatem *μεσστής*, *postrema* ve-
 ro, tutam quasi ac firmam dices,
ἀσφαλής nuncupantur.

§. CCCCXVI.

corpora habent reliquis crassiora, et magis obsequiosa.

Corpora habent crassissima, maxima superius inferiusque lata, et plana, excepta *sinuata postremae* superficie, quae ossis sacri *primae*, tanquam stabili innititur fundamento. Ab inferioribus successiue gracilescunt, et ob cartilagines (§. CCLXXXVII.) nexumque vinculorum ad lumbos varie, commode, et tute torquendos vertendosque, mobilia et apte fabricata sunt.

§. CCCCXVII.

E productionibus lateralibus diversae longitudinis et latitudinis processus vel adscendunt, vel descendunt,

E productionibus lateralibus, superius leuiter, et *inferius* profundius excisist posteriora versus adscendunt *processus* lati, posterius concaui, anterius asperi; descendunt autem recti, in inferioribus latiores et longiores. *Omnes* se inuicem excipiunt, ligamentis firmanatur, et in superficiebus contiguas, cartilagine laeuigatis, mobiles conseruantur. *Speciatim* adscendentes *vertebrae primae* ab vltimae dorsalis descendentes, ac *postremae* latiores descendentes, ab erectis latis *primae* ossis sacri recipiuntur, et hoc quidem modo coniuncta ossa, *foramina*, reliquis *maiora*, oblique deorsum tendentia, pro nervis lumbaribus lateraliter constituunt.

§. CCCCXVIII.

§. CCCCXVIII.

Transversae eminentiae planae tenuesque, sursum retrorsumque ductae, latius a se inuicem distant, magnitudineque differunt. *Primae quartaeque* breviores, *reliquarum* longiores, et *tertia* longissimae sunt, earumque fabrica, ac disiuncta positione efficitur, ne sub varia corporis flexione, vel sibi inuicem vel costis, vel ilium ossibus impedimento sint.

vel transversim ex-
porriguntur,

§. CCCCXIX.

Spinosae, longitudine dispaes, in posteriora horizontaliter ductae, latioribus radicibus compressae, *lateraliter* planae, *superius* acutae, *inferius* asperae, *posterius* in superiorum summitatibus latioribus tuberosae, in reliquis vero obtusae, et instar omnium, cartilaginibus crustatae, a prima ad tertiam crescunt, et versus postremam decrescunt. Plus minus disiunctae, ligamentis spinalibus, absque impedimento mobilitatis spinae eiusdemque curvaturae, validissime colligantur.

vel spinosi
latiores ho-
rizontaliter
in posteriora
ducuntur.

§. CCCCXX.

Tota haecce columna, ex mobilibus Os sacrum, spondylis composita, *ossi sacro* ex immobilibus facto, veluti basi, subiicitur.

Est

Est autem *os sacrum*, spongiosum, e quinque vertebra, in mutuo in se fusis compaginatum, columnae ossae pelvisque fundamentum, seu trunci, sub lumbis caudam equinam recludentis pars posterior.

§. CCCCXXI.

Eius figura
et structura,
in statu per-
fecto.

Ratione figurae et structurae superioris et in basi longum, latum, crassumque inferius tenuius, angustum, et in mucronem oblongum extenuatum, intus fungosum, exteriori solida lamella cinctum, *anterius* laeve, aequale, ac recurvatum, *posterius* conuexum, et ob diuersas eminentes apophyses, inaequale et asperum, in *utraque* autem facie perforatum est.

§. CCCCXXII.

Diversae
ipsius deno-
minationis
ratio.

Respectu loci a Graecis ὑποσπόνδυλον, vel propter insignem latitudinem et amplitudinem (§. CCCCXXI.) πλατὺ ὀστέον, *os latum* appellatur. Quare vero antiquis temporibus ἱερόν dictum fuerit, diuersa est autorum sententia. Quidam a magnitudine ossis denominationis rationem deducunt, quum veteribus scriptoribus, poetis praecipue, familiare fuit, *grande* atque *magnum*, *sacrum* nominare. Sic oceanum ἱερόν πόντον.

πόντον, et in adplicatione ad ossa, spinam dorsi *ισχάν σύριγγαν* vocabant; alii rursus vim vocis ab ipsa *ossis forma* et *effigie* deduxerunt, falso sibi persuasi, illud instar diuini propugnaculi officium praestare, et proprio naturalique instinctu in partu ab ilium nexu referari, rursusque committi (§. 483.).

§. CCCCXXIII.

In *statu imperfecto initio cartilagineum* et *unicum triangulare os* est, quod circa *distincta corpora* et *latera primum* perficitur. *Haec* enim et *prouenientes* inde *processus*, ad instar *reliquarum* vertebrarum (§. 383.), ossescunt, atque lamellis cartilagineis, quae, more epiphysium, corporum superficiebus accrescunt, distinguuntur; interea *posterior superficies* circa radices spinosorum processuum, cartilagineo-membranacea, uti et *laterales superiores amplissimi parietes* tardius indurant, successu temporis tamen corpora, cum epiphysibus confluunt, et discreta non nunquam ad staturae incrementum, in omni autem aetate pristinae diuisionis vestigia in vtraque superficie relinquunt. E *partibus lateralibus* tardius *spinosi* emergunt, et ad quartae vertebrae corpus usque coalescunt, relicto post-

Natura ossis sacri in statu imperfecto, eiusque ossificationis modus.

postea *hiatu triangulari*, supra corpus
ultimae deorsum vergente.

§. CCCCXXIV.

Eiusdem la-
tera inae-
qualia, et
connexio
tam cum
ossibus inno-
minatis,

A processibus, quos corpora alia alii
supposita emittunt, *transuersis*, in-
ter se *concretis*, lateraliter compressis
et proportionatis, *latera ossis* fiunt
quae in statu maxime ossium perfectiorum
vbi in tribus prioribus vertebrae ilium
ossibus committuntur, instar *apophy-
sium* crassarum, inaequalium, et amplis-
simarum protuberant, in *medio* au-
tem, pro insertionem ligamentorum
quae ab ischii ossibus procedunt, *par-
tes* eminent, *inferius tenuiora* fiunt, ac
in *infima* et *mucronata* parte attenuata
longissime a coxis distant.

§. CCCCXXV.

quam verte-
bra ultima
lumborum
et osse coc-
cygis.

Oblique adscendentes et descendentes
processus, inter se confluentes, in *poste-
riore superficie* inaequalia efficiunt tu-
bera. *Erecti*, plani, lati, et cartilagineo
crustati vertebrae primae, *oblique descen-
dentibus lumborum infimae* respondent,
et cum illis nectuntur; minima autem
postremae vertebrae tubercula oblique
descendentia, *adscendentibus coccygis*
adunantur. Interea hanc coniunctio-
nem tam supra *amplissima ossis basis*,

tota

*ota ad sinuositatem vltimae lumborum
accommodata (§. CCCCXVI.), quam
infra extremum illius oblongum augment,
vinculaque valide retinentia firmant.*

§. CCCCXXVI.

Ab iisdem, accedentibus *processibus* Canalis ossei
directio et
spinosis, inter se *concretis*, breuioribus, capacitas,
a superioribus versus inferiores *graci-* ratio defe-
escentibus, in prioribus *femicirculari* ctus forami-
ncisura saepius distinctis, iuxta curua- num latera-
men autem osfis sacri deorsum inclina- lium, et an-
tis, latitudo, capacitas, et angustia teriorum ac
canalis, inferius *hiantis*, non determi- posterorum
nantur solum, verum etiam concur- locus, figu-
rente connexione sacri cum ilium osfi- ra, et usus.
bus, neruis in *reliquis* lateraliter egre-
dientibus, denegatur via: hinc loco
illorum *quatuor vel quinque paria fora-*
minum, in *utraque facie* per longitudi-
nem curuati canalis patentium, substi-
tuuntur. *Anteriora* oualia, plus mi-
nus sinuosa, in concaua et laeui super-
ficie, inter coalitum corporum cum
processibus, locum habent, superiora
maxima sunt, reliqua imminuta, omnia
autem notabilia, cum neruos osfis sa-
cri emittunt. *Posteriora* processus in-
ter transuersos et obliquos posita, in-
aequalia et minora, periosteo obte-
guntur.

§. CCCCXXVII.

§. CCCCXXVII.

*Utilitas ossis
sacri specia-
lis,*

Ex praemissis, *specialis et multiple* ossis *sacri utilitas* patet. Tanquam basis enim fulcit spinam mobilem (CCCCXX.), efficitque, vt supra illius stabile fundamentum flexiones vertebrarum mobilium commode fieri possint in canale fouet ac tuetur extremitatem inferiorem medullae spinalis, siue caudam sic dictam equinam, posteriorem peluis facit partem (§. CCCCXXIV.) instar propugnaculi, contenta defendit, os coccygis firmat (§. CCCCXXV.) musculisque variis locum praebet (CCCCXXV.).

§. CCCCXXVIII.

*et totius spi-
nae genera-
lis.*

Est igitur mirabilis *huius*, quam *totius spinae*, firmo hocce firmatae ossis structura, quae praeter expositos *speciales vsus*, in genere ad varias inclinationes et flexuras subeundas, apte figuratae cavitatem thoracis (§. CCCCXXVIII.) abdominis (§. CCCLXXXI.), peluisque (§. CCCCLXV.) fulcit, in collo caput pendulum, antrorsumque vi ponderis inclinans sustinet, partes in omnibus cavitatibus sitas ex parte defendit plurimisque musculis stabilitatem praestat (§. CCCCXXXII. CCCCXXXIII. CCCCXXXIV.).

§. CCCCXXIX.

§. CCCCXXIX.

Appendicis loco columnae ossae, prae- *Os coccygis,*
rimis sacro iungimus os coccygis, mini-
num, triangulare, et spongiosum, ex
liquot vertebrae (§. CCCCXXX.), suc-
cessive in mucronem attenuatis, com-
positum, caudae ad instar, aliter quam
in quadrupedibus, introrsum inclina-
um, et a similitudine vel ὀρθοπύγιον
caudae os, siue a rostro cuculi avis,
os coccygis, κόκκυξ, vocatum.

§. CCCCXXX.

Ab ipsis *primordiis quatuor* constat *illius compe-*
vertebrae cartilagineis, tardius in me- *sitio, ossifi-*
lio corporum ossescentibus; processus ve- *catio,*
ro vna cum corporibus decrescentes,
confluentes, et in adultis indurati, uni-
um conficiunt os, cuius basis, siue
terior pars, apici ossis sacri, et pro-
cessus eminentes, tuberculis descen-
dentibus ultimae eiusdem ossis verte-
brae committuntur (§. CCCCXXV.).

§. CCCCXXXI.

Indurato penitus osse *apophyses exi-* *structura,*
les vix distinguendae, transversae in *coniunctio, et*
primis, non nihil extuberantes, poste- *rius.*
riorem gibbam superficiem asperam red-
dunt; totum autem os, canale, latera-
libusque carens foraminibus, inferio-

P
rem

rem tantum peluis perficit partem, ciliari sessione inferuit, locumque xum *intestino recto, sphincteri ani, posterioribus coccygaeis, et glutaeis maximis* cedit. Flexile pariter et obsequiosum est; hinc in iunioribus cum mucro sacri laxum exercet motum, atque difficili partu, magnoque ad aluum exonerandam conatu parum recedit, annosioribus vero in rigidum, asperum, immobile os abit, atque cum mucro plane concrescit. Ne tamen hoc articulo, accedente vi, diuelli possit, vinculo firmissimo comprimitur et mediante minore ac tereti ligamento, vtrisque spinoso tuberculo, in posteriore margine ossium innominatarum protuberanti, alligatur.

§. CCCCXXXII.

Musculi spinarum dorsi affixi, diuersa loca habent vel in corporibus,

Omnes iam totius fistulae osseae enarratae partes, ipsa quoque corpora, fulciendos musculos varios, iisdemque partim originem, partim insertionem praestandam, aptissima sunt. Hinc quoque ad musculos, a media et antica vertebrarum parte prouenientes: a corporibus et processibus transuersis vertebrarum colli *recti antici maiores, et anteriores facie corporis atlantis, annuatores* COWPERIORIuntur. *Flexores* lo

gi colli a superioribus quinque dorſi incipiunt, et omnibus colli vertebrarum corporibus, ex parte etiam proceſſibus earum transuerſis, iuxta rectos anteriores maiores, inferuntur. *Corporibus* primae, ſecundae, tertiae, quartaeque *tendines diaphragmatis* implantantur, et lateraliter ab illis, vti et transuerſis proceſſibus magno vtrimque principio *pſoas magnus* incipit atque deſcendit. De *intervertebralibus* vero DOUGLASSII merito dubitatur.

§. CCCCXXXIII.

Qui *proceſſibus transuerſis* adhaerent, ſequentes ſunt: *Recti laterales*, ſive *externi capitis*, aliis *transuerſales*, a proceſſibus *transuerſis* atlantis eorumque ſuperiore ſuperficie ad os occipitis vergunt. Ab *his* quoque incipiunt *obliqui ſuperiores*, vel *minores capitis*; *inferiores* vero *maiores* in epitrophei *transuerſalibus* finiuntur. *Intertransuerſales* colli inter *eiusdem denominationis* vertebraſ et eminentias locum habent. *Complexi* ab inferiorum colli dorſique ſuperiorum *transuerſis* apophyſibus proueniunt. *Splenii* non ab *his* ſolum, verum *ſpinofiſ* quoque oriuntur. Circa externos ſpleniorum margines recedunt.

dunt *transuersales cervicis*, et superi-
 ribus colli tribus quatuorue digitatic
 nibus tendineis implantantantur; com-
 plexos vero, in superiore et externi
 facie quatuor superiorum dorsi verte-
 brarum oblique procedentes, *extensio-
 res capitis minores*, siue *trachelomasto-*
dei comitantur. Hos inter et scapu-
 larum leuatores *cervicales descendentes*
 DIEMERBROECKII, tribus digitatic
 nibus a *transuersis* secundae, tertiae
 quartaeque colli surgentes, descendunt
Spinales colli ab *eiusmodi* apophysibu-
 trium inferiorum colli et quatuor supe-
 riorum dorsi totidem incipiunt tendi-
 nibus, immo tres, vel duae superiores
 excepta prima, *elevatoribus scapularum*
 originem, *fasciculis* vero *scalenorum*
 insertionem praestant. Cum *longissi-*
mis, qui *transuersis* dorsi eminentiis
 tendines dant, *sacrolumbares* vniun-
 tur, et ab *his* aequae ac *spinosis* adscen-
 dentes, *transuersis* septimae colli infi-
 guntur. A processibus dorsi *transuersis*
libus leuatores costarum firman-
 tur, a *similibus* lumborum vltimaeque vertebrae
 thoracicae, *transuersi abdominis* stabi-
 liuntur, inque illis *quadrati lumborum*
 terminantur; *intertransuersales lumborum*
 demum *eiusdem denominationis* pro-
 cessibus interferuntur.

§. CCCCXXXIV.

Ad locandos quoque numerosos *muculos*, quibus collum, dorsum, lumbi-
que *posterius* constricta sunt, *processus acuti* maxime conferunt. Ex his
spinales colli spinoso epistrophei infe-
runtur. *Splenii a spinis* praecipue pro-
cedunt (§. CCCCXXXIII.), *ipsisque in*
ex colli vertebrae, quinque paria inter-
spinalium interiecta sunt. *Recti maio-*
res postici a spinoso epistrophei, et *mi-*
nores a posteriore atlantis superficie pro-
deunt. *Semispinosi* processus inter trans-
versos et *acutos* partibus dorsi et lum-
borum lateralibus incumbentes, *spinis*
vertebrarum dorsi infiguntur. *Sacro-*
lumbarium principia et fines antece-
dente §pho indicantur. *Trapezii a*
cota longitudine, quae ab occipitio ad
infimae fere dorsi processus pertingit,
perampli incipiunt, et *rhomboidei* ab
inferioribus colli ac superioribus dor-
si, ad bases lateraque scapularum de-
scendunt. *Serrati postici, superius a*
*duabus inferioribus colli dorsi*que supe-
rioribus, *inferius* autem, ab inferiori-
bus dorsi, primis lumborum, *ea-*
rumque posterius mucronatis processibus
proueniunt. *Latissimi dorsales* ab osse
sacro, *spinis* lumborum, et sex infe-
riorum dorsi amplissimo procedunt vo-

vel apophy-
sibus spinosis.

lumine. Denique *obliqui adscendentes* ex parte etiam a *spinosis* lumborum apophysibus oriuntur.

§. CCCCXXXV.

Quales mus-
culi ab osse
sacro orian-
tur?

Tandem ad *musculos* in parte *ossis sacri* posteriore sitos referimus *latissimos dorsi* (§. CCCCXXXIV.), a spinis *ossis sacri* supremis prouenientes; *extensores communes dorsi et lumborum* partibus tendineis intine iunctis, ibidem originitus adscendentes (§. CCCCXXXIII. CCCCXXXIV.); *glutei* maximos, ab *osse sacro* et *coccygis* prodeuntes; *pyramidales* siue *iliacos externos*, lateraliter *sacro* adpositos, et *ligamentis*, quibus *ischii ossa* cum *sacro* nectuntur (§. CCCCLXXVII.), adhaerentes. Caeterum de *musculis ossis coccygis* videatur (§. CCCCXXXI.).

§. CCCCXXXVI.

Observationes.

Supereſt, vt conſideratis fiſtulae ſpinalis oſſibus, illas adhuc obſeruemus *mutationes*, quae ipſi vel *praeter naturam*, vel *extra ordinem* euenire ſolent.

- I) Ob defectum proceſſuum ſpinalium in recens natis, partes laterales, tam in lumbis, quam oſſe ſacro, a tumore medullae ſpinalis feruntur.

feroso nonnunquam dehiscunt, indeque spina oritur bifida, malum testimonio TVLP II et RVYSCH II prorsus insanabile.

II) Fractura processuum *spinosorum* absque laesione medullae spinalis haud periculosa est; e contrario *transuersalium* et ipsorum corporum cum laesione medullae, et intercepta fluidi neruei distributione, partium, vertebris eiusmodi subiectarum, rigiditatem et immobilitatem efficit, ac pro ratione mitioris grauiorisque fracturae vel tardius, vel celerius mortem infert.

III) Vertebrae non penitus luxantur, nisi cum fractura et praesentissimo vitae periculo, interea et subluxationes plus minus periculosae sunt.

IV) Qui collum fregisse dicuntur, iisdem vel fractura superiorum vertebrarum cum processu denticiformi secundae, iuncta ut plurimum cum laesione occipitis, vel dislocatio atlantis e sinibus contigit.

V) Quando vertebrae relaxatis ligamentis a se inuicem paullulum recedunt, et e sede sua ex parte commouentur, mutatur corporum apophysium, ipsisque interpositorum lamellarum structura ac figura, spinaque vel *introrsum*, vel *extrorsum*, vel *lateraliter* incuruat. Optime autem ex coniunctionis modo demonstratur, quod ratione aliqualis plurium vertebrarum, in quibusdam partibus recedentium, subluxatio, ad formationem differentis gibbi concurrat. Pro eo enim ac columna inflexa est, maior vel minor in intermediis cartilaginibus observatur crassities, corpora hinc incipunt prominula, compressa et depressa sunt, processus diuersimode figurati, plus minus distantes. Aliquando vertebrae plane inter se concresecunt et processus conflantur, rarissime autem illam contrahunt inflexionem, quam RVFFSCHIVS observauit, ubi corpus *superioris* *premae* cum corpore *inferioris* coniunctum fuit. HIPPOCRATES et GALENVS quatuor malae conformationis species recensent. *Prima* ipsis dicebatur κύφωσις, κύρτωσις

σις, siue illa gibbi species, qua ob recuruum exterius dorsum prono capite aegri terram spectant; *secunda* erat Δύεδωσις, seu vertebrarum, anteriora versus inclinatio, iuncta cum pectoris tumore; *tertia* Σκολίωσις, lateralis spinae inflexio; et quarta denique Σείσις, illud vertebrarum spinae vitium, quo ob nimis laxata vincula, iuncturas et compages dimoueri quidem, vertebrae tamen evidenter suo quidem non moueri loco, obseruatur.

VI) Os sacrum in partu ab innominatis non recedit; interea non negandum, sub difficiliore partu in iunioribus subiectis, partialem non nunquam, quoad acumen, et os coccygis, accidere retrocessionem (§. CCCCXXXI). Omnis autem, quae in partu ad ampliandam peluim suscipitur labor, integra manu retrudendo os coccygis, caute et circumspecte instituat.

VII) Idem os nonnunquam carie eroditur, atque vna cum coccyge in lumbagine scorbutica adficitur.

VIII)

VIII) Aliquando ludit natura circ
 numerum vertebrarum, quo v
 easdem excedere, vel deficere
 auctorum obseruationibus manif
 itum est. Inter praeparata asse
 uo *sceletum* sex mensium, cuiu
 spina ex *septem colli* vertebris, *un*
decim dorsi, et *sex lumborum* com
 posita est, *aliun*que infantis uniu
 anni, in cuius columna, except
 reliquis completis, *tredecim dor*
sales numerantur.

§. CCCCXXXVII.

Generalis
 thoracis de-
 scriptio,

Videndum nunc, quomodo *dorsu*
les vertebrae costas stabiliant, atqu
 coniunctim cum *pectoris osse thoracem*
 h. e. magnum, mobile, superius angu
 stum, deorsum non nihil extensum
 inferius ex parte constrictum, sed e
 utroque latere patulum, anterius bre
 uius, posterius longius, lateraliter in
 interruptum, capacius, oblongum, can
 tilagineo - osseum, faciant concepta
 culum.

§. CCCCXXXVIII.

Illiusque de-
 nominatio-
 nis et com-
 positionis ra-
 tio.

Officina haec *vitalium organorum*
 non quidem ad mentem Stoicorum
 qui cor animae domicilium esse puta-
 bant, sed ex sententia GALENI a Doge
 respo

ectum nimirum *perennis motus*, quo
 o in- et expiratione agitur *Θωγαξ*
 citur. Ea enim est ipsius *mechanicae*
compositionis ratio, ut structurae par-
 um, cavitatem praecludentium, con-
 rmiter reciproci a musculis exercean-
 r motus. Quare nec membranacea,
 nec cartilaginea sola pressionibus et in-
 riis externis ferendis, defendendis-
 ue nobilioribus partibus suffecit, nec
 olidior et compacta ossea omnibus in-
 unctis natura, arcuum elongationem
 ater sternum et vertebrae producere
 otuit, sed mixta, et certis in locis de-
 terminata compositionis ratio, ad ster-
 um protrudendum, costasque ad li-
 eas rectas reducendas, necessaria fuit
 §. CCCCLI. CCCCLII. CCCCLIII.).

§. CCCXXXIX.

Ex his molle, leue, spongiosum et *Sternum*
 obsequiosum os, septem superiorum *quid?*
 costarum extremis cartilagineis inter-
 ectum, *anteriusque* figuram thoracis
 ualem circumscribens, CELSO, lati-
 nisque, *pectoris os, scutum cordis*, et
 Graecis, vel a *σεγέω*, solido, adeoque
 a firmitate, quam costis praestat, vel
 iuxta Stoicos a firma animae sub ster-
 no fede (§. CCCXXXVIII.) *σεγον* ap-
 pellatur. Hinc usitatae ipsis locutiones
 fue-

fuere: διὰ μέγαν ἔχειν, *memoria tenens*
 βαδύσεγνος, *homo iudiciosus*; εὐσεγνός,
placidus, et ποικιλόσεγνος, *astutus* ce

§. CCCCXL.

Eius figura,
 diuifio,

Ratione *figuræ*, qua cum similitudine gladii pugionisque antiquorum conuenire videtur, in *tres* potissimum *partes* diuifum fuit. Superior, latior et breuior, *manubrium*, media, longissima et angustior, *laminam ensiformem*, et denique inferior, breuissima *cartilagineam mucronatam* repræsentant. Ex parte quoque *triangulare* refertur *superius* latum, in *medio* latefcens, versus extremitatem cartilagineam diuerfimode acuminatum, *extrinsecus* leuiter conuexum, *intus* paullulum finuatum.

§. CCCCXLI.

et offificatio,

Si *primordia* eius intueamur, *primo* et *tertio* post *conceptionem* mense adhuc membranaceum, crassum, et opacum est (TAB. I. FIG. III. TAB. II. FIG. I.), *quarto* magis crassescit, atque in illo *duo* vel *tria* adparent *puncta albican* *tia*, obscure satis e centro proueniencia, et sibi inuicem supposita; *crescentibus* vero *mensibus* numero et volumine augentur, membrana successiue cartilaginea fit, *quotque puncta* offificationis

ni

obueniunt, tot quoque frustra seor-
a indurescunt.

§. CCCCXLII.

Ossa, ex quibus *totum* compositum Quousque di-
 (§. CCCCXL.), cartilaginibus inter uisum ma-
 concrescunt, ac diuerſas, ad perfe- neat, quan-
 um ossium omnium, et staturae in- doque partes
 umentum, constituunt partes. Ex his omnes con-
 minam mediam in quatuor et quinque crescant?
 st pubertatis tempus diuisam adhuc in-
 eni; hinc iudico, tot esse sterni par-
 s, quas GALENVS ipsi iam adscripsit,
 tot costae verae, quarum extrema
 rtilaginea ad illud circa distinctionis
 ca accedunt; interea in adultis omnes
 unum os coalescunt.

§. CCCCXLIII.

Manubrium superne crassissimum, duos In manubrio
 agnos fouet sinus, oblongos, lunatos, diuersi appa-
 teraliter decliues, per longitudinem rent sinus,
 minentes, lubrica cartilagine obdu-
 tos, anteriora clauicularum extrema
 ecipientes. *Eosdem* intercedit maior
 inuosititas, quae *intus* delitescens, tra-
 heae spatium relinquit, et colli radicem
 o in loco attingit, qui in summo in-
 car lunulae leuiter excisus, pecu-
 ari voce Graecis σφάγην, Latinis
 ugulum, quod vulnera profun-
 da,

da, hisce partibus inflicta, *iugula*
dictus fuit.

§. CCCCXLIV.

*Laterales
sterni foveae,
numero co-
stis veris re-
spondent.*

Infra sinus, lateraliter declives (*CCCCXLIII.*), *alii angulares*, cartilaginei crustati, *superius* magis a se inuicem distantes, *inferius* proximius ad se uicem accedentes, extrema costarum cartilaginea recipiunt, sustinent, ornant. *Priores* maiores, in parte laterali et superiore manubrii primis costis iuncti sunt, *sequentes* partim a lamina ensiformi, partim vero a manubrio formantur, et reliquorum *tres*, qui in eadem lamina quouis in latere reperiuntur, in interstitio confluentium ossium (§. CCCCXLII.) locum habent. *Sextus* utrimque ad costae sextae partem cartilagineam pertinens, in extremitate laminae orbiculari, et *septimus* hanc inter et cartilaginem ensiformem positi sunt.

§. CCCCXLV.

*Structura
laminae ensi-
formis,*

Os medium, modice latum, planius tenuius, leuiter conuexum, media pectoris firmat partem. *Illud* ipsum nonnunquam, praesertim in sexus fortioris subiectis, *magnis duobus trabusue foraminibus*, per quae vasa mammaria interna egrediuntur, supra cartilaginea

laginem ensiformem, et in ipsa perforatum vidi.

§. CCCCXLVI.

Tertium denique *os*, quod imae orbiculatae parti laminae ensiformis adhaeretur, *imperfectum* est, et in *seni-*
us tantum *naturam* induit *osseam*. Est autem *cartilago* diuersae figurae, lata, acuminata, orbiculata, plus minus inorsum et extrorsum ductilis, vel *simplex*, vel bifida, vel *perforata*, a figura *mucronata*, *ensiformis*, *gladialis*, Graecis *Ξιφοειδής* dicta.

extremi-
tisque mu-
cronatae.

§. CCCCXLVII.

Totum autem a *partibus* his compositum ob planitiem, latitudinem, ac inaequalem longitudinem, *mediam* ac *priorem* *thoracis* perficit partem, et hanc ob causam cordi, et reliquis organis vitalibus, in cavitatibus eius sitis, propugnaculo est, fundamenti ad instar costas, articulo non nihil mobili finibus inhaerentes, sustinet, media fere et concaua superficie mediastinum fulcit, et anterieus clauiculas, in sinibus semilunatis mobiles, recipit. Praecipue vero maximum *cartilago xiphoides* praestat commodum, dum lacerti musculorum obliquorum et diaphragmatis illud

Vsus sterni.

illuc vsque producuntur. Extrinsecus enim musculi *obliqui* abdominis bris suis *ipsi* adhaerentes efficiunt, attolli possit; *transuersorum* autem portiones, quae cum diaphragmati priori parte ibidem firman- tur, stabilisque loci constrictionem iuuant, praestant, vt aucta vi *sterno-costalium*, quorum vltimus valido tendine ad cartilaginem accedit, ad interiora ducta xiphoides, *diaphragma* commodius curuari queat. Sequatē igitur se praebet cartilago ad uitalem diaphragmatis motum, inprimis cum illud anterius nullum tam firmum habeat, ob costalium diu- aricatas, propugnaculum, quae xiphoidem.

§. CCCCXLVIII.

Quibusnam
musculis ori-
ginem et in-
sertionem
praestet?

Praeter *musculos* iam indicatos, alii quoque stabilitatem dat. Superius enim *sterno-mastoideis*, *sterno-hyoideis*, *sterno-thyreoideis*, et *subcutaneis* punctum fixum praebet; *inferius* recipit *rectus abdominis*; *externae* pectorales maiores ad cartilaginem fere ensiformem se extendentes, admittit; *interna* demum et *inferiore* parte, *triangularibus* *sterno-verheieno* *sterno-costalibus*, originem praestat.

§. CCCCXLIX

§. CCCCXLIX.

Sed satis de *structura et naturali os-* *Observatio-*
pectoris constitutione. Interdum *nes.*

- I) *illud ipsum* ab externis caussis violentis frangi, introrsum duci, et deprimi, indeque et sanguinis sputum cum spirandi difficultate, tussim suspectam, febrem, dolorificam loci adfecti sensationem, vasorum laesionem, aliaque gravissima produci symptomata, observationes testantur.
- II) Quando vasa mammaria laesa fuerint, vel propter haemorrhagiam periculosum vulnus fit, vel, si se retrahunt, sanguinis profusio intra praecordia et ipsum mediastinum contingit, qui aut suffocationem minatur, aut in pus abit, et comitem demum habet summam corporis hecticoideam extenuationem.
- III) Difficillime abscessus aliquis mediastini diiudicari, ne dicam sanari potest. Non nulli, qui de praesentia illius convincti sunt, praesidia externa quaerunt, et in dubia sterni perforatione vnicum solatium ponunt.

Q

IV)

IV) Cartilago xyphoides frequenter introrsum et extrorsum recurvatur, cum obsequiosa sit, nimis tamen quandoque rigescit, ossificatur, et in longitudinem producit. Si retractio *ipsius*, remanente circa praecordia excavatione magna, in illis accidit, quorum viscera abdominalia periclitantur, quibusque, ob qualemcunque labem, praeternaturalis accessit pondus, libera diaphragmatis expansio, flexio corporis anteriora versus, et actio ventriculi, impediuntur; violenta vero, quae cum fractura contingit ossis depressio, periculosa et lethalis est.

V) In gibbosis, aliquando etiam mammosis, et obesibus, angustatur thorax, pectus acuminatur, sternumque deprimatur; hinc mirum non est, quod continuam experiantur dyspnoeam.

§. CCCCL.

Costae

Ad formationem thoracis maximam partem conferunt, *costae*, Gr. πλάσται, siue a πνέω spiro, πνεύσαι, dictae, quae ossa semicircularia, spongiosa, mobilis.

ia et obsequiosa sunt, differentis ad
 instituendas pectoris laterales et prae-
 cuae partes longitudinis ac latitudi-
 nis, certo ordine disposita, incurua,
 minus laeua, posterius inaequalia et
 dilatata, anterieus tenuia, in diuerſae
 magnitudinis incuruas cartilagineſ de-
 ſcendentes, et vitalia cuſtodientia organa.

§. CCCCLI.

Haec ipſa ob mobilitatem ad motum earum vi-
thoracis peragendum et continuandum, litas et ne-
ceſſitas.
 tiſſima ſunt. Etenim viſcus molle
 ſculoſo-veſiculoſum, quod ab inſpi-
 rato aere extenditur, et exſpirato rur-
 ſus concidit, pulmo eſt. Quum vero
 motu *reciproco*, vel thorax ad pulmo-
 nes, vel pulmones ad thoracem mo-
 vantur, (per experientiam), arcus
 ſui autem maximam thoracis partem
 conſtituant (§. CCCCL.), motuſque
 ſtarum in articulis mobilibus cum
 vertebris doſſi et ſterno ope muſculo-
 rum, reſpirationi inſeruientium, et dia-
 phragmatis exerceatur (§. CCCCLX.
 CCCCLXI.): ſequitur, coſtas, tanquam
 ſa leuia, arcuata, obſequioſa et cum
 ſuitate mobilia, ad reſpirationis ne-
 ceſſitatem, motumque thoracis appri-
 me preſectas et neceſſarias fuiſſe.

Q₂ §. CCCCLII.

§. CCCCLII.

Motus costarum sub respiratione.

In genere quidem *arcuata ossa* versus planum tendentia, absque *flexura substantia anteriore*, ita eleuata sunt, quiescentibus extremis, amplius fauor maneat fornix: *eadem tamen substantia* distantiam thoracis plus minus auget, *costasque* ad extensionem et compressionem reddit aptiores. *Priori modo costae* a plano eleuantur, versus *costulas* extrorsumque coguntur, atque sternum ex parte protruditur; *posteriores vero* partes, quae costas stabiliunt introrsum pressae, maiorem flexionem et abbreviationem, sicque naturales efficiunt *constrictionem*, *extensioni illarum proportionatam*.

§. CCCCLIII.

Quomodo sub dilatatione et constrictione thoracis illarum figura mutetur?

Quomodo vero vi flexibilitatis *substantiae cartilagineae thorax* sub eleuatione *longior*, et sub constrictione *breuior* fiat, ex figurae costarum mutatione potissimum illustrandum. Nimis enim, prout extrema ossium a cartilaginibus recedunt, vel ad illa propius accedunt, anguli fiunt magis minusue obtusi, illosque ad rectos fere accedentes obseruamus, quando sub inspiratione eleuatio costarum cum extensione thoracis, adeoque linearum distantiae in-

er extrema augentur. Diuersam autem crurum a verticibus distantiam anteri-
us in costarum ductu et directione conspiciamus. *Prima* enim costa de-
iuis omnium est, *reliquae* deorsum inclinant, eoque magis, quo inferior costa; *anteriores* autem maiores minoresue rectae, obliquae, flexuosae *extremities*, exceptis prima duabusque ultimis costis, vtrimque sursum ad os pectoris recurvantur.

§. CCCCLIV.

His praemissis, ipsas iam ad speciale *Costarum ossificatio,* examen reuocamus *costas*. A principio in embrione vnus mensis maxima ex parte *arcus osseos*, in *fibras* distinctos, et circa *extrema* cartilagineos referunt (TAB. I. FIG. III). *Posteriores epiphyyses* (TAB. II. FIG. II. f. f.) citissime cum truncis, vbi ossibus iunguntur, concrescunt, et cartilaginibus obducuntur, pars reliqua mediante solida lamella interiorum coerces spongiositatem. *Anteriores partes* (TAB. II. FIG. I.) eandem cum sternum habent naturam, in statu ossium perfecto cartilagineae adhuc sunt, in senibus autem rigidiores et osseae fiunt.

§. CCCCLV.

numerus et
diuisio in ve-
ras, et spu-
rias,

Duodecim vtriusque *costae* num-
potius, quam *graecis* quibusdam ip-
impositis *denominationibus* distingu-
tur, ad quoduis latus, aliae infra al-
positae, et modicis disiunctae interu-
lis, extremis posterioribus verteb-
innituntur, diuersaeque magnitudi-
anterius ordinatae, ita locantur, vt v-
immediate sternum attingant, vel ex-
ceptis vltimis, quae a musculis firmat-
tur, cum cartilagine septimae con-
fluant. *Priores septem* in genere verae
et in specie ex illis *duae* summae ἀντιστοι-
χοι, *duae* proximae ἑξῆς, sequenti-
ἑξῆς inscindiuntur; *posteriores*
spuriarum, *mendosarum*, *notharum*
prima, ordine octaua, parti cartilagi-
nis inferiori septimae, nona octauae
et decima nonae adcrefcit. *Dextera*
autem *sinistrae* figura et magnitudo
respondent, et concaua se inuicem re-
spiciunt superficie.

§. CCCCLVI.

earumque
diuersa lon-
gitud.

Prima brevis et latissima est, reli-
quae ad septimam vsque successiue lon-
giores fiunt. *Sexta* interdum longitudo
ne omnes superat; *septima* vero rursum
decrefcit. Aliquando *octaua* longissima
imma

mediate sterni adhaerens, ut plurimum tamen *quinque inferiores* pedetentim gracilescentes, *ultimaque* breuissimae obseruantur. Dummodo a dorsi lateribus recuruantur, *superiores* latius stant, orbiculato ductu incedunt, et ad extremitates rectis, vel parum obliquis, cum sterni articulantur. A *sexta* ad *decimam* deorsum magis tendunt, caraginisque flexuosis sursum rursus curvantur (§. CCCCLIII.); *inferiores* autem rectiores in thoracis lateribus decedunt.

§. CCCCLVII.

Tria in costis omnibus considerantur, primo *extrema*, deinde partes eorum maximae, quae *corpora* vocantur. Pars latior *palmula* dicitur, Gr. *πλάτη*, quae spinæ dorsi vertebri committitur, *remulus*, *κόπιον*, et costarum spatia intermedia *μεσοπλεύρια*. Sunt vero *corpora* arcus, inter extrema positi, a quibus *thorax* potissimum in lateribus ampliatur (§. CCCCLII.), a posteriori deorsum, a priori gibbum fit. Differunt pro diuersa costarum magnitudine (§. CCCCLVI.), plus minus conuexis equalibus, sed in *secundis* inaequalibus superficiebus, extrorsum vergentibus

Corpora costarum differunt,

bus, exceptis *primis*, quarum interna et externa magis planae sunt.

§. CCCCLVIII.

nec non
margines
et anguli,

Margines primae et secundae Superficies vtriusque acuti, reliquarum obtusi sunt; inferiores posterius a capitulis utraque ad angulos obtusi, anteriora versus acuminantur. A capitulis arcus compressi incurvantur, teretes postmodum latescunt, angulosque faciunt rectorum quorum vestigia tantum in prioribus inveniuntur, in reliquis vero successive augentur, in illis capitulis posterioribus proximius accedunt, in his magis constant, ac in octava nona et decima latissimas costarum constituunt partes.

§. CCCCLIX.

fulcique costis
insculpti.

Superficies costarum interna in primis in sulcatis inaequalis est. Plurimae si ultimas excipias, interius et interiorius notabili quodam pro vasis nervisque intercostalibus gaudent sulcibus in superioribus leuiore, in reliquis praecipue inferioribus veris, et inferioribus spuris, satis profundo, maioribus capitulis infra minora flexuose parum, extrorsum prius, post introrsum progrediente, successive gracilescente, et anteriora versus euanescente.

§. CCCCLX.

§. CCCCLX.

Extremitates earum sunt vel anteriores, vel posteriores, utraque mobiles, aterea costae primae reliquis firmiores et fixae; quae vero sequuntur, et quae potissimum infimae, totae per se mobiliiores. Anteriores cartilagineae in costis primis brevissimae, durioresque prope sternum lateſcunt, immo cum osso, et ex parte cum claviculis, coalescunt. Reliquae sex, paulatim longiores et flexibiles magis, sursum feruntur, atque in fine crassiores, in sinibus, ossi pectoris insculptis (§. CCCCLIV.), neminem subeunt motum, ibidem vinculis propriis constringuntur, et sic quietem cum sterno latum, planum, et breve pectus efficiunt. Eadem est directio eam spuriarum superiorum confluentium (§. CCCCLIII. CCCCLV.), quam ultimarum, quas muscoli fulciunt (§. CCCCLXIII.), et quibus diaphragma adhaeret. Stabiles itaque priores costae, ob differentem elasticitatis gradum, reliquas omnes magis habent obsequiosas.

Extremitates costarum anteriores,

§. CCCCLXI.

Posteriorius cohaerent mobili articulatione vel cum corporibus vertebrarum solum, vel insimul cum processibus earum

et posteriores.

rum *transuersis*. *Secunda* nimirum a *undecimam* vsque duo habet capitula oblique posita, *anterius* maius, planum, vtrunque impressa linea, quae in duas diuisum superficies, cartilagine obductum, quo binarum vertebrarum corporibus lateraliter committitur (§. CCCCXI.), *posterius* minus, leuiter capitatum, cartilagine crustatum, *sinistri* processus *transuersi* respondens, et a eundem valido ligamento, quod asperiusculo inferitur tuberculo, alligatur (§. CCCCXIII.). *Bina capitula* osse medio, plano, oblongo, et, pro diuersa processuum transuersorum longitudine, plus minus longo, quod *collum* dicunt, disiunguntur. *Suprema*, *duaeque infimae*, sinibus, corporibus vertebrarum propriis, (§. CCCCXI.) diuersis inhaerent articulis. *Summae* capitulis, *anterius* minori, *posterius* maiori, fereque rotundo, interponitur *transuersale collum*, initio compressum, ex versus finem magis latescens. *Postremae tuberculis* gaudent magnis, rotundis, planioribus, et ex his *undecima* eminentia quadam transuersum recipiunt processum; breueque habet a commissuris interuallum. In *ultima* demum nullum eiusmodi eminentiae conspiciuntur vestigium, sed tantum cum corporibus

postremae dorsi vertebrae articulationem subit; omnes autem harum extremitatum prominentes partes, *cartilaginibus* politae, ita cum vertebrae iunguntur, ut cum firmitate sursum atque deorsum moueri queant.

§. CCCCLXII.

Osseus itaque *thorax*, qui a vertebrae formatur, ab osse pectoris vero et costis praecipue formatur, atque sub respiratione in vniuersum, folliis ad inspirandum, per varios gradus expanditur, rursumque angustatur, a summo deorsum mouetur, pulmones vna cum corde recipit, iniurias externas arcet, intrinsecus a mediaestino anteriore et posteriore bipartitur, accedentibus, egredientibus, et transmeantibus arteriis, venis, nervis, asperae arteriae, oesophago, ductui thoracico viam pandit, locumque concedit, ex parte in sternum musculos quosdam (§. CCCCLXVIII) mouet, septum transuersum aequanter sustinet, a lateribus autem praerectus *hypochoondria* munit, et antrorum tam *praecordia*, quam in fine cartilaginis ensiformis, *scrobiculum cordis* definit.

Utilitas thoracis.

§. CCCCLXIII.

§. CCCCLXIII.

*Quales mus-
culi vel a
costis orian-
tur, vel iis-
dem inseran-
tur.*

Extrinssecus in pectore, dorso, et lateribus, varios musculos, in diuersas actiones conspirantes, fulcit. Subclauarum tendines non procul a sterno primae costae inferuntur. Serrati anteriores antici a quatuor inferioribus veris et duabus superioribus spuriiis dentantur oriuntur principiis. Pectorales anteriores a sterno incipiunt, omnibusque costis veris cellulosa membrana adfixi incumbunt: minores vero secundae, tertiae, quartaeque adhaerent. De triangularibus sterni (§. CCCCLVIII.) iam dictum fuit. Posterius serrati posteriores superiores in quatuor superioribus veris, inferiores autem in totidem inferioribus spuriiis finiuntur. Intercostales interni et externi interstitia costarum replent, et in earum marginibus contrariis fibrarum directionibus firmitur. Duodecim costarum leuatores in parte illarum posteriori terminantur. Obliqui externi abdominis diuersis appendicibus costis mendosis et veritimae verae, circa commissuram cartilaginis cum parte ossea, adhaerent. Interni a spuriiis ad cartilaginem xiphoidem usque extenduntur. Transuersales superficiem internam omnium notharum tegunt, et in septima vera proxima

e ad diaphragma accedunt. *Recti* exteriorae quintae, sextae, et septimae superficie inferuntur. *Extensores* inferius confluentes, circa infimam vtriusque in *sacrolumbarem*, et *longissimum dorsi* diuiduntur. *Sacrolumbares* posterius ad angulos costarum adscendunt, omnibus dant tendines, siue productiones inferius carneas, ad septimam vsque nouos accipientes musculos, qui, a costis spinam versus sursum, a prioribus contraria directione distinguuntur, et *accessorii STEPHANONIS* appellantur. *Longissimus dorsi* nouis in latere cum sacrolumbari circa locum insertionis adunat tendinem, et inter hunc ac semispinosum supra *costas* adscendendo, iisdem diuersis inseritur tendineis productionibus. *Scapularum primi fasciculi musculares* externe a medio costarum primarum, *secundi* ab earum externa et posteriore superficie, *tertiique* a posteriore ac interiore primarum secundarumque origines trahunt. *Quadrati* demum *lumborum*, siue *triangulares*, ad internam partem marginis inferioris vltimarum pertinent.

§. CCCCLXIV.

Caeterum, quemadmodum ossa reliqua, sic *costae* etiam vel per iniurias, Observationes.
incu-

incuruari, deprimi et frangi, vel in statu naturali ratione structurae diuersimodum mutari solent.

- I) Itaque, in quibus ob aetatis rationem, partes anteriores costarum osseam induerunt duritiem (§. CCCCLIV.), thorax difficiliter dilatatur, hominesque inde, imprimis si dorso incumbant, suspiriosi fiunt.
- II) Costae fractae, depressae, et luxatae non vacant periculo. Depressiorem violentam, spirandi difficultas, pectoris oppressio, febris inflammatoria, cet. comitantur. Luxatio ut plurimum ad interiora contingens, thoracis partes grauiter adficit. Si sub fractura fragmenta introrsum maxime spectent, atque vasorum laesionem coniunctam habeant, tam inflammationes, quam profusiones sanguinis in caua, suppurationes cum acerbissimis symptomatibus, et comite funesto euentu sequuntur.
- III) In pectoris paracentesi caueatur, ne, depressius perforato pectore, diaphragma laedatur, nec vasa

vafa lacerentur intercostalia (§. CCCCLIX.).

IV) In quibus dorsi vertebrae incuruantur, costae insimul diuersimode distorquentur. Oritur inde inaequalis thorax, a cuius, vti et contentorum organorum vitalium impedita sufficienti expansione, et dilatatione, respiratio difficilis fit, quae eiusmodi gibberosos reddit anhelosos. Vidi in gibboso, phthisi et lenta corporis extenuatione mortuo, ob malam tam costarum, quam spinae, conformationem, partes in thorace corruptas, nimis compressas, et angustatas, viscera autem abdominalia ex parte extra situm naturalem posita.

V) Variat non nunquam costarum numerus, non quidem pro sexus diuersitate, sed prouti natura saepius ludit. Sceletorum, quorum (§. CCCXXXVI. n. VII) mentionem feci, vnus vtrimque tredecim, alter vndecim costis gaudet. Praeterea alium adhuc ab his discrepantem asseruo, qui vtrimque praeter septem veras, et quinque

que spurias, imperfectam, ad *tera ultimae colli vertebrae* posita habet, quae ratione extremis posterioris et capitulorum *mae* similis, cum corpore et transuerso processu *dictae vertebrae* articulatur, sed statim acuminatur, et, ob breuitatem, sternum non attingit. *Altera ipsius*, ordine naturali prima, in semicirculum fixa, sinuositatem sterni superiorem recipit, et anteriorem claviculae extremitatem attingit. *Rest* quae omnes, omnibus in punctis cum naturaliter constitutis et ordinatis conueniunt, excepta *ultima spuria*, cuius vestigia tantum conspici possunt.

§. CCCCLXV.

Ossium innominatorum generalis descriptio,

Spina inferius et lateraliter a *coxae* ossibus sustinetur, quae, tanquam transuersa, longa, lata, valida, ab anteriore parte profunde sinuosa et gibbinaeque inaequalia, figura irregularia, natura spongiosa, *interius* laeuigata, *posteriorius* et *superius* ad spinam resupinata, *anteriorius* in prominula descendunt. Fecundissimo adunata articulo, rursus reccantur, parum quidem in viris, in quibus *inferius* rectiora sunt, magis an

ter

m in feminis in exteriora recuruantur (§. XCV). Magnis praeterea distincta raminibus, *inferius* et *posterius* turosa, versus amplam, qua ossi sacro agmentantur, superficiem, inaequaliter incisa, et aliis adhuc, cum sacro et occygis ossibus, ligamentis firmata, elum faciunt, fulcrum istud spinae, quod pedibus suffultum, totum sub umbis et super femora cum firmitate mobile est.

§. CCCCLXVI.

Antiquitus nulla peculiari denominatione et diuisione distincta, *innominata*, *ἀνόνομα*, dicebantur, idemque generale haecenus retinuerunt nomen. *coxendicum* et *coxarum* voces vel *latiorem*, vel *strictiorem* significatum habent. *Late* *uniuersa ossa* denotant, in *strictiori* sensu inferiores eorum partes exprimunt (§. CCCCLXXV.).

*eorumque
latior et strictior
significatus.*

§. CCCCLXVII.

Ossa, ex quibus componuntur *superiora* et *posteriora ilium*, *anteriora pubis*, et *inferiora ischii*, initio cartilaginea, tribus in locis puncta ossificationis accipiunt. *Omnia* diuerso perficiuntur tempore, atque ex illis *anteriora* et *inferiora serius*, *superiora* vero

Coxarum ossificationis, compositio ex diuersis ossibus,

R

citius

citius ossescunt. In *acetabulis* interueniente cartilagine conglutinantur, quae vero sensim ab illis absumitur, licet rugandum non sit, multum eiusdem imperfectae substantiae ad tempus usque pubertatis ossibus adhaerere.

§. CCCCLXVIII.

*mutatio, et
perfectio.*

Hoc igitur modo et ordine ex cartilagine in ossa *spongiosae indolis* vertuntur, atque ita inter se coagmentantur, ut in *statu perfecto* amplius separari nequeant, et vix, ac ne vix quidem *pristinae diuisionis* remaneant vestigia. *Ossescunt* autem ad sinuositatum profundarum et superiorum partium laterum *crustas* usque *cartilagineas*. *Interposita ossibus pubis* crassior lataque *cartilago*, quae nihil aliud, quam *interstitium* substantiae imperfectae portionem, e qua primum constabant, indicat, successu temporis exsiccatur, immo *margines* ossium hinc inde *cartilaginei*, *cristae ilium*, *tubera ischii*, *condyles* rigescunt et indurantur.

§. CCCCLXIX.

*Ratio denominationis
ilium.*

Superiorem et latissimam innominatam partem, magnitudine, figura, crassitie, pro subiectorum et aetatis mutatione diuersam, *ilia* faciunt, Graeci

γόνες. Vbi enim *os ilium*, omnium
amplissimum, superius *semicirculi* fere
 imaginem refert, *locus* Graecis λαγών,
percilium, *spina*, *margo*, *collum co-*
xa, *dorsum coxendicis*, vocatur, circa
 nem vtriusque lateralis mollis abdo-
 minis pars, siue *regio iliaca* determi-
 natur.

§. CCCCLXX.

Vtraque ossium, ultra *sacrum* non ni-
 l productorum, *superficies* parum gib-
 bosa est; *substantia* autem *in medio* ex
 parte tenuissima, *cellulisque* destituta,
reliquis locis spongiosa et crassa, po-
 teriusque crassissima, amplissima, va-
 riosissima, inaequalis et aspera obser-
 vatur.

eorum su-
 perficies et
 diversa cras-
 sities.

§. CCCCLXXI.

Superficies cuiusvis crassissimae partis
 respondet *lateralibus ossis sacri* portio-
 nibus (§. CCCCLXXIV.), atque *eminen-*
tis irregularibus, acutis et obtusis, fo-
 reisque *superficialibus*, immo *in medio*
et posterius irregulari ac profunda
abundat sinuositate; quae omnia pro
 miniori cum *lateralibus ossis sacri* co-
 aensione, *apte figurata*, *firmissime* co-
 agmentantur, et *coniunctim validissi-*
 mo *vinculo omnibus in punctis*, prae-

Singularis
apophysium
fabrica, qui-
bus sacro
committun-
tur.

fertim posterius, vbi coxae mo-
ce a sacro recedunt, constringu-
tur. Fortissimus hic per $\sigma\upsilon\gamma\chi$
 $\theta\epsilon\omega\sigma\iota\nu$ factus articulus totam corporis
molem, a spina lateraliter et aequaliter
diuisam, sustinet.

§. CCCCLXXII.

*Margo ilium
superior.*

A parte harum commissurarum, ossa in
micircularem spinam, initio *crassissima*
paullo post *tenuiorem*, versus interici-
autem *crassam*, procedunt, et in diue-
sum a se inuicem non nihil discedunt.
Vi differentis huius crassitiei *superior*
ilii *spina*, vtrunque in *tuberculo* *super-*
riori terminata, in *margines*, recte
partes, *interiorem*, *mediam*, et *exter-*
rem diuiditur.

§. CCCCLXXIII.

*Spinae an-
terioris me-
diantibus
tuberculis in
superiorem
et inferiorem
diuisio,*

A termino *tuberculi superioris*, *ma-*
gò, ad *eminentiam minorem* usque orbi-
culatim excisus, postea ex parte *super-*
acetabulum *crassus*, ex parte in *prior*
tenuis, *acutus*, leuiterque pro vasis *cr-*
ralibus *neruisque* *anterioribus*, et
potiori sexu, pro *spermaticis* *infin-*
fulcatus *descendit*, ac ad *pubem* *cras-*
fescens *recuruatur*. *Tuberculo* *vero in-*
feriori, quod alii, alio habito respectu
spinam ilii inferiorem, ad *superioris* *di-*
ferentiam

entiam, nominant, *margo anterior* in
superiorem et *inferiorem* distinguitur.
anterior, *minor*, a *tuberculo maiori* ad *minus*
oblique progreditur; *posterior* autem,
magis, a *minori* incipiens, in *symphyfi*
pubis finitur.

§. CCCCLXXIV.

Anteriora coxarum, siue *ossa pubis* *Ossa pubis*,
et *pectinis*, a priori angustiora, et paul-
lum tenuiora, lateſcunt, crassitiem
maiores induunt, et, mediante cartila-
ne, inter se coeunt (§. CCCCLXVIII.).
Graecis $\eta\beta\eta$, Latinis *pubes*, locus in
fimo ventre audit, quo pili nascun-
tur, et, statu pubertatis incipiente,
primum erumpunt; hinc ossa ipsi sub-
iecta *pubis*, et *regio externarum media*,
eodem sita, *pudenda* appellantur. Sub
symphyſi a se inuicem rursus discedunt,
cum ischiorum partibus *inferiores*, qui
in eorum tuberositatibus terminantur,
efficiunt *margines*, coniunctim inferio-
ri abdominis parti formam et stabilita-
tem dant, magnam pelvis oram faciunt,
eandemque anterieus finiunt.

§. CCCCLXXV.

Ossa a Graecis $\iota\chi\lambda\alpha$ nominata, in sen- et coxarum
su strictiori proprie *coxae* sunt, *infe-* proprie sic
rioresque innominatorum denotant *par-* dicta, siue
ischia.

R 3

tes,

tes, quae crassae satis, et arcuatae deorsum et retrorsum diuersis in loca protractae, intus modice excauatae aequales, lateralem peluis constituu partem, atque dum sedemus, *crassissimis tuberositatibus*, veluti stabili basi superiora corporis immobiliter sustentent.

§. CCCCLXXVI.

Directio et tubera ischiorum,

Anterius tenuia, plana, *extrinsecus* parum reflexa, *sursum* oblique in prius *ra* ad infimas ossium pubis partes ascendunt, ibidem cum iis confluunt *marginesque inferiores* (§. CCCCLXXIII) efficiunt; *posterius* et *inferius* vero crassissima, gibba, oblonga, aspera, inaequalia, *extrorsum* sub acetabulis in prius *ra* protracta, valida quidem, sed non nihil angustata faciunt *tubera*.

§. CCCCLXXVII.

Connexio eorum per ligamenta cum sacro et coccyge, nec non diuisionis spinæ posterioris in inferiorem,

Ab iisdem tuberositatibus, *posterius et inferior*, *leuiter* vtrimque *excisus marginis* *go*, ad eminentem et *acutam* ab *spinam* quae, e posteriore et media *ischii* parte emergens, *ligamentum teres*, quod *coccygi* inseritur (§. CCCCLXXI.), firmatur. Quum autem illud ipsum partibus his deorsum protensis, et longo interuallo ab osse sacro seiunctis, firmissimum

acc

unandis insufficiens fuerit, aliud
 modum fatisque validum accessit,
 quod ab *inferiore* et *interiore ischii* par-
 te ad *latus ossis sacri* procedit (§.
 CCCXXIV.), indeque etiam *ischia-*
co-sacrum dictum fuit.

§. CCCCLXXVIII.

Posterior demum ac *superior, profun-* et *superio-*
de incisus margo, a processu acuto ad *rem, pro-*
 cum coniunctionis ilii cum sacro *funde inci-*
 (§. CCCCLXXI.) sese extendens, pro-
 prie dictam *ischii incisuram*, quae vasa
 utraque cum nervo maximo transmittit,
 significat.

§. CCCCLXXIX.

Praeter margines ossa coxarum *di-* *Superficies*
versis adhuc distinguuntur *superficiebus,* *coxendicum*
 ex quibus *exterior* porosa valde, vtrim-
 que in *parte superiore* et *posteriore* pro-
 niusculis leuiter *sinuosa*, in *medio* ve-
 ro, lateraliter, et *anteriora* versus, pro-
 guranda *profunda*, *rotunda*, et *maxi-*
ma femoris excavatione, non nihil ex-
 correcta est.

§. CCCCLXXX.

Sunt autem *amplissima caua* tam miri- *Acetabulo-*
 ce coxis adposita, vt *iisdem* coxae cum *rum stru-*
 toto trunco diuersimode super femora *ctura, et*
usus,

moueri et inclinari possint. *Quaели sinuositas* caput femoris profundius excipiens proprie *acetabulum*, Gr. *κορυνη* vocatur (§. LXXVI.), ex concussu trium ossium componitur (§. CCCCLXXVII.), et crusta cartilagine obducitur ac augetur (§. CCCCLXXVIII.). *defectus* vero in imperfecta ipsius *cavitas minor* ab opposita cartilagine suppletur, per *incisuram* (§. CCCCLXXXI.) vasa compressione libera, tutissime admittuntur. *Totus* denique *sinus* validissimo, ex supercilio eius inaequali predeunte ligamento, firmissime cum capite ossis femoris vnitur.

§. CCCCLXXXI.

eorumque
minor in
ima parte
cavitas,

Quum vero *anterius* et *lateraliter* parte dehiscat, *supercilium* illius imperfectum et inaequale fit, immo sinuositas, quae in medio et versus ilia latet, ad hiatum rursus angustatur. *Cavitas minor*, quam in ima parte continet, simili gaudet *marginem imperfecto inaequali*, ac *aspera superficie*, eaque non solum *ligamentum teres* siue *placenta* recipit, verum etiam *glandula mucilaginosa* tutissimum concedit *lubricum*, efficitque, ne *tota* sub motu commoveatur.

§. CCCCLXXXII.

§. CCCCLXXXII.

A confluxu ossium ischii et pubis *Foramina*
terius in utroque latere fit foramen magna oua-
lia.
maximum, fere ouatum, extrinsecus ad
etabuli incisuram (§. CCCCLXXVIII),
modammodo compressum, et versus
nuiolem ossis pubis partem semicir-
lariter excisum. In superiore loco sub
pubis osse, ad oram praecipue exter-
nam, profunde et oblique sinuatum, va-
neruunque cruralem posteriorem
nittit, de reliquo vero membrana
musculisque obturatoribus clauditur,
ex quibus internus e pelui supra
marginem minorem arcuatum (§.
CCCCLXXVII.), et cartilagine crusta-
ta, quasi supra trochleam, relictis ab-
interfectionibus tendineis, impressio-
nibus, ad locum insertionis reflectitur
§. DXCV.).

§. CCCCLXXXIII.

Tota haec ossa coniunctim cum sa-
cro et coccyge posterius et inferius
§. CCCCLXXVII. CCCCLXXXI.),
lateraliter (§. CCCCLXXV.) ac a priori
§. CCCCLXXIV.) peluim, seu amplis-
simum et rotundum faciunt cauum,
in quo portio intestini ilii, rectum, ve-
fica urinaria, in sexu potiori vesiculae
seminales cum deferentibus vasibus, in
R 5 sequi-

Pelvis for-
matio et
usus.

sequaliori vagina, vterusque cum annexis partibus continentur, disponuntur et firmanantur. *Anterius* sub triangulo osseus, et symphyse ossium pubis (§. CCCCLXXIV.), in viris peni, mediante ligamento suspensorio adfixus, cruribusque eius, marginibus inferioribus ischii ossium (§. CCCCLXXVI.) adherentibus, stabilitatem dat; in feminis autem extremitatem vaginae interioriorem, et sub commissura ossium pubis clitoridem, membranarum fibrisque corpori urethrae superimpositam, simili ligamento symphyse, longioribus autem ipsius cruribus marginibus ischii appensam, firmat. *Inferiori* demum et amplissimo interstitio, quod inter ischiorum disiunctionem (§. CCCCLXXVII.) sacrique et coccygis ab illis distans (§. CCCCLXXIV.) proficiscitur, partem intestini recti extremitatem inferius et posterius emittit.

§. CCCCLXXXIV.

Quinam musculi ab ossibus innominatis incipiant, vel quosnam illa excipiant?

Demum vero *musculis*, a diuersis marginibus, superficiebus, eminentiis, sinuositatibus, prodeuntibus, in quibus illis sese terminantibus, locum et fundamentum praebeant. Ab *externa* nimirum *spinarum superiorum parte oblique descendentes* et *glutaei maximi oriuntur*.

Pe

sterius ab *eadem latissimi* dorsi, et *adrati lumborum* adscendunt; *glutini medii* et *minimi* vero ab externa superficie proueniunt. *Musculi fasciae latae* vtrimque circa coniunctionem marginis anterioris cum superiore a tuberculo maiore incipit. *Iliorum internorum* origines situsque sunt *superiores spinarum superiorum partes*, uitatesque *ilium internae*. Ab *iis* *marginibus transuersales abdominis*, et a *mediis obliqui interni* firman-
 r. *Sartorii* ab anteriore *ilium* parte tuberculis superioribus procedunt, primo ab his *peculiaria* POVPARTII *amenta*, in medio compressa, et circumferentiam latiora, ad ossa pubis obliqua ascendunt directione. *Recti femoris* a minoribus oriuntur tuberculis. *Iliaci* cum *psois* supra acetabula ante *ilia* leues habent impressos. *Liuidi* supra foramina oualia a partibus ossium superioribus deorsum incedunt; contrario *recti*, *pyramidalesque abdominis* a commissura ossium pectinis ascendunt. Vbi ischia cum ossibus pubis adunantur, *graciles* incipiunt. *criceps* vtrimque *duobus fasciculis* ab ossibus pubis, et *tertio* ab ischii tubere prouenit. Vidi nuper *quatuor distincta huius musculi capita*, cuius *quartum*
 a re-

a reliquis separatum, et a tuberositate ischii ortum, cum *tertio* asperae femoris spinae inferebatur. Cruribus *penis* et *clitoridis* (§. CCCCLXXXII) subiacent *erectores*. Interius a tuberositatibus *levatoris ani*, nec non *gemini* oriuntur. Ex *geminis inferior* ab exterioriore tuberis parte, et superiori ligamento quouis in latere incipiens, teriacente tendine obturatoris interni a *superiore*, qui ex acuto enascitur processu, distinguitur. *Pyramidibus* partim os sacrum, partim margines iliorum superiores et posteriores, partim ilia ligamenta capsularia originem praestant. Principia *bicipitum*, quoad longiora corpora, sunt ischiorum tuberositates quae superius insimul *semimembranae* et posterius *seminervosis*, ac *quadratus femoris* stabile dant fundamentum. Internam demum foraminum ovalium *περιφελίαν* obturatores interni, externam vero *externi* ambiunt.

Quaestiones
de ossium pubis in partu diuulsione, et intestinorum per superiorem foraminis ovalis hiatus profusibili lapsu?

§. CCCCLXXXV.

Caeterum, quando de ossibus peragitur, *quaestiones* saepius proponuntur: verane sit quorundam, de ossibus pubis tempore partus inter se diuulsis antiquitus affirmata sententia? et per superiorem unius alteriusue foraminis

ualis hiatus intestinorum prociden-
 fieri possit? Quoad prius momen-
 tum: negandum non est, in iuniori-
 s a violenta foetus extractione laxio-
 n ossium pubis coniunctionem dis-
 ui, ossaque ita diuidi posse, vt a se
 uicem mutuo dehiscant; praeterna-
 ralem tamen eiusmodi dissolutionem
 is naturae nisibus nec fieri, nec ex-
 suam horum ossium vim ad foetus
 clusionem requiri, plures, variis
 nuicti obseruationibus, mecum as-
 unt. Intuitu posterioris: vtrum-
 e quidem foramen membranis
 isculisque propriis obturatur (§.
 CCLXXXIV.), sed in superiori lo-
 (§. CCCCLXXXII.) non vsque adeo
 miter munitur, vt intestinis re-
 ti satis queat. Si igitur partes mol-
 res relaxentur, et exiguus hiatus su-
 rius dilatetur, possibilis est por-
 onis intestini cuiusdam per illum
 olapsus, et obseruante DVVER-
 NEYO rarissimi tumoris herniosi
 generatio.



CAPVT IV.

DE

EXTREMITATIBVS
SCELETI SVPERIORIBVS.

§. CCCCLXXXVI.

*Extremi-
tes superiores
ex diuersis
mobilibus
compositae
ossibus,*

E*xtremitates*, quae a trunco pendent, eundemque stabiliunt, *superiores*, vel *inferiores*. *Superiores* a summo humero ad apices digitorum vsque extenduntur, et reclusis validisque ossibus, *duabus* nimirum *scapulis*, et *claviculis*, totidemque *humeris*, *cubitis*, *manibusque* compositae sunt.

§. CCCCLXXXVII.

*motibus
omnibus
peragendis
aptissimae
sunt.*

Diuerfos referunt *vectes*, trunco *superius* appensos, inter se admodum *mobiles*, proportionatae longitudini et crassitie, ita quidem figuratos, longissimi in motu cum *scapulis*, minores minimique describendis *motibus* conis aptissimi sint, indeque *motus* ad quoduis *latus*, ad se inuicem immo *lateraliter* inclinato et flexo *corpore*, ad *terram* pedesque *admoventur* celerrime in quolibet *situ* *agitari*, *inde*demque, ope *variorum* *instrumentorum*

ru

n motricium, magna pondera eleuet
et e loco in locum ferri possint.

§. CCCCLXXXVIII.

Humeris vero apte et cum stabilita- Scapularum
denomina-
tio, nume-
rus, connec-
tio,
trunco committendis *ossa scapula-*
n inseruiunt, quae cum summam
rum constituent latitudinem, Grae-
πλάται, ὠμοπλάται, dicta fuerunt.
mirum *unum* vtrunque mediantibus
isculis laxè ad thoracem applicatur
(CCCCLXXXIX.), iisdemque vel *de*
o mouetur, eleuatur, deprimitur,
ducitur, abducitur, vel, omnibus
nul agentibus, *immobile* firmatur.

§. CCCCLXXXIX.

Cuiusvis adplicatio ad partem thoracis situs, figura,
superiorem, posteriorem, ac externam,
internam inter ac quintam, vel sextam
tam veram, ita quidem fieri solet, vt
situ corporis erecto, quiescentibus
indulis humeris, ratione *figurae*, qua
angulum fere aequicrurum refert, tam
si sursum, quam cruribus antrorsum
trorsumque spectet, et perpendicu-
is linea, basin aequaliter bisecans, ex
vertice duos faciat angulos contiguos
quales.

§. CCCCXC.

§. CCCCXC.

ossificatio,
perfectio,

In principio lata et tenuis scapula pars membranacea, reliqua vero cartilaginea est. Illa statim ossescit, haec vero serius perficitur, indeque angulus margo posterior, pars magna ceruicis processus rostriformis, et spinosus, parte diu manent imperfecta. Additamentum unicum in adultis cartilagineum in foetu periosteo distinctum est; alii processus in modum verae eminentiae corpore totus cartilagineus enascitur et a radice, siue latiore parte, successim versus coniunctionem cum clauicula rigescit et ossescit.

§. CCCCXCI.

substantia,

Ratione diuersae huius structurae differunt quoque ossis substantia. Leue enim os in parte latissima, tenuissimum et pellucidum, ex interiore et exteriori lamina, absque interiacente cellulositate compositum, in angulis, cruribus collo, eminentiis, plus minus crassum, spongiosum et solidum fit.

§. CCCCXCII.

margines,

Intuitu figurae (§. CCCCLXXXIX) cuiusuis crura et basis margines determinant, qui vel ad spinam dorsali, vel antroorsum ad costas, vel sursum ad ceruicem

in diriguntur. Ita quidem prior posterior, alter ipsi oppositus anterior, et superior basis erit. Quodsi vero, alio bito figurae situsque respectu, scapula ob latera inaequalia, ad figuram anguli scaleni reducatur, tunc, quae hactenus inualuit, retinenda laterum diuisio, et margo posterior pro basis assumendus.

§. CCCCXCIII.

Spina, in quam scapula posterius abit, et anguli, superiori, veluti resecto, et ad rectum angulum accedente loco, tenuis, longius, flexuose paullulum ad inferiora excutitur. Superius in acutum breuem angulum obliquo vergit ductu, nemis supra summum emineat humerum: inferius autem cum anteriore, in inferiore latere, in longiorem, remotiorem, crassiolemque protrahitur.

§. CCCCXCIV.

In parte anterieus et lateraliter a collo remota, os breue quidem fit, cuius tamen et planum facit collum, in quo supercilium enascitur, et pollicis parum excavata glenoides, oblonga, superius paullatim angustata, in infima parte amplior, semiorbicularis cartilago,

Collum scapulae eiusque cavitatis superficialis.

go, in qua caput humeri, siue segmentum sphaerae illius admodum laeuitum, absque peculiari interiori gamento, solo vinculo capsulae quod quasi sinui cartilagineo continuum, cum ossis humeri capite articulationem sustinet, mobilissimum. Tendo enim, qui superiori sinu cavitatis, aliis acetabuli minoris, margini adhaeret (§. DXVI.), non articulum ipsum, sed tendinem bicipitis articulo firmat.

§. CCCCXCV.

Processus rostriformis,

Superiori colli parti, vbi crassest (§. CCCCXCIV.), *processus minor*, *στροφακοειδής*, *κορακοειδής*, *ἀγκυροειδής*, *cruciformis*, vel *anchoralis*, adglutinatus in adultis in apophysin spuriam mutatur (§. CCCCXC.), ac incuruus, superius gibbus et inaequalis, inferius aequalis et concavus, in exteriora priora reflectitur, supra collum protrahitur, atque in progressu obtusum acuminatur. Firmus satis, claviculae sustinet, quae minori tuberculo, mediante *lato ligamento*, in loco concretionis cum ceruice, alligatur, *aliquandoque* insimul ad medium marginis superioris dimittit, relicto *ovali interstitio* per quod vasa scapularia vna cum ne-

feruntur, immo mediante *transuer-*
si processum spinosum iungit firmat-
 e; praeterea musculis quibusdam
 cum dat (§. CCCCXCIX.), atque im-
 dit, quo minus humeri os ad supe-
 ra et interiora facile luxetur.

§. CCCCXCVI.

E superficie *externa* siue *dorso scapu-* *et spinosus.*
 e mox infra arcuatum superiorem
 arginem latissima basi *crassus* surgit
processus, qui successiue gracilescens
 curuatur, supra ceruicem longius
 protensus rursus latefcit, extrorsum
 erorquetur; hinc quasi supereminens,
 positu in specie *summus humerus*, Gr.
ῥόμμιον, aliis a figura *spinosus* appella-
 r. Extremum *acromii* margine inte-
 re in *transuersali* et *oblongo sinu*, car-
 agine crustato, mediam partem ex-
 emittatis posterioris clauiculae reci-
 c, et ligamento firmissime cum ro-
 iformi (§. CCCCXCV.) adunatur.

§. CCCCXCVII.

Hoc modo quouis in latere clauiculae *Scapulae su-*
 lae processuique coracoideo iuncta, *perficies,*
 articulationi humeri praeposita *apo-*
ysis spinosa, brachium sustentat, im-
 ditque, ne sursum excidat, muscu-
 s firmat, *superficiem extimam*, leuiter

in medio gibbam et protuberanter
quam Graeci dorfum, χιλώνιον, a fim-
litudine dorsi testudinis, appellarunt
diuidit in *superiorem*, *minorem* ac *pro-*
fundiore *excauationem*, et, quae in *sp-*
inam est, *maiores*, *parumque* *circu-*
marginem *anteriorem* et *radicem* *pro-*
cessus *sinuata*. *Prior* *cauitas* *supra-*
nata; *ambae* *altera* *infra-*
spinam *pari* *solet*, *eiusdem* *denominationis* *m-*
sculis *teguntur* (§. CCCXCIX), *ipsisq-*
subscapularis, *seu* *interior* *et* *anterior*
uiter *excauata* *superficies*, *qua* *scapu-*
costis *instar* *scuti* *incumbit*, *opponit*

§. CCCXC VIII.

usus,

Ex his cum pateat, quomodo *sc-*
pulae *clauiculas* *excipiant*, *et* *firme-*
(§. CCCXCV. CCCXCVI.), *brach-*
cum *trunco* *iungant* (§. CCCXCIV.),
protuberantiisque *insimul* *praepositi-*
ex *parte* *luxationes* *eorum* *impediant*
immo *posterius* *quodammodo* *thorac-*
contenta *defendant* (§. CCCCLXXXIX),
videndum *nunc*, *quibusnam* *in* *part-*
bus *locentur* *musculi*, *scapulas* *cum* *c-*
pite, *collo*, *eiusque* *transuersis* *et* *sp-*
nos *processibus*, *dorso*, *lumbis*, *cost-*
veris *et* *spuriis* *iungentes*, *easque* *diue-*
simode *mouentes* (§. CCCCLXXXVII).

§. CCCXCIX

§. CCCCXCIX.

utroque margine posteriore vtrunque ^{et muscoli.}
 obliunt *rhomboidem*, et *serratum an-*
terius maiorem; spina superiore, et
 nunquam processu rostriformi
coraco-hyoideum; angulo superiore
scapulae maiorem; inferiore *rotundum ma-*
ius, ac *portionem latissimi dorsi*; co-
 anteriore *teretem minorem*, et in
 dem, versus ceruicem, *extensorem*
brachii; processu coracoide *pectora-*
li minorem, *coracobrachiale*, caput
 e latum *bicipitis*; summo humero
scapulae, et *deltoidem*; in fossa su-
 a spinam *supraspinatum*; in dorso
 o spinam *infraspinatum*; et anteriore
 cauata superficie *infrascapularem*.

§. D.

Paucis adhuc monendum, quatenus ^{Fracturae}
 scapulis contingentes ^{scapularum.} *fracturae mitiores*,
 et *grauiores* esse soleant. *DiffRACTUS*
processus spinosus facile quidem in se-
 rem reponitur, sed difficillime con-
 utinatur. Incipiens enim solutae par-
 s *conglutinatio* vel ex motu *trapezii*
deltoidis, vel ipso brachii pondere rur-
 s dissoluitur. Quae in *collo* vel *infra il-*
lud contingit *fractura*, non vacat pericu-
 lo, ipsique, ob iunctam ut plurimum ali-
 ualem neruorum, vasorum, tendinumq;

laesionem, impotentia brachium m-
uendi, inflammatio, aliaque grauic-
mala, immo ipsa mors superuenire
lent. In reliquis vero partibus laesi-
ones vt plurimum esse solent *mitiores*.

§. DI.

Claviculae,

Quae scapulis subnixa sunt ossa d-
oblonga, figurae ad instar *s* transuersa
plus minus *geminio* inflexa *femicircu-*
aliquando *rectiora* (§. XCIV.), sub in-
colli in pectoris summo, ad scapu-
cum sterno firmandas, transuersim po-
sita, *claviculae*, a *clauibus* aedium an-
quis, Gr. *κλειδες*, aliis *iugula*, a iug-
gendo, vel *iugularia*, a iugulando, qu-
ob loci securitatem natura apposi-
ta ossa, denominantur.

§. DII.

*earum ossifi-
catio.*

Citissime omnium in paruulis et
bryonibus *ossescunt* (TAB. I. FIG. III.)
hinc in maturis foetibus *corpus* cuius
uis *compactum solidumque*, et *extr-*
ma quoque, quamuis natura porosa
spongiosa sint, iam *perfecta* rep-
riuntur.

§. DIII.

*Extremitas
claviculae
anterior,*

Quaelibet clavicula duo habet *extr-*
ma interposito corpore. Mobilis *anterior*
fin

pectoralis extremitas capitulo ob-
 go, crasso, cartilagine obducto,
 pectoris innititur (§. CCCXLVII),
 um illo vinculo membranaceo vni-
 inferius autem minori et *ouato tu-*
tulo cum costa prima articulatur et
 natur; quare super priorem costam
 bilis quidem, facile tamen in adul-
 cum illa concrefcit.

§. DIV.

Altera posterior, transuerfa, *hume-* et *posterior*,
is, siue *scapularis*, priore tenuior,
 summitatem processus spinosi, pro
 bilenda scapula, vtrimque contra-
 modo recuruata, mediante cartila-
 e recipitur, et valido vinculo fir-
 tur (§. CCCXCVI.). Vbi autem
 itur, in summitate huius extremita-
ouata quaedam et *plana* obseruatur
superficies, cartilagine crustata. Quae
 ora *processum rostriformem* inferius
 cedit obtuse *acuminata eminentia*,
 iori et firmo vinculo cum illo adu-
 tur (§. CCCXCV.).

§. DV.

Corpus modice crassum, incuruum, *eiusque*
 a pectore distans, *anterius* inaequa- *corpus*
 et conuexum, *posterius* concuum,
reca eminente, quae a tuberculo mi-
 S 4 nori,

nori, cum processu corocaideo coh
rente, incipit, paullo post acumi
tur, statimque gracilescit, ex parte
partitur; *infra* autem pro vasis neru
que *sulcatum*, atque in binis super
ciebus, *marginibus* flexuosis, super
et inferius latis, planis, et obtusis pro
ditum est.

§. DVI.

Qualem
quaenis
praestet uti-
litatem,

Ratione distantiae (§.DV.), cur
turae (§.DI.), et coniunctionis *clau*
icularum (§.DIII.DIV.), liberior
merorum fit mobilitas, brachioru
pondera tanquam fulcra sustinentu
prolapsus humerorum in priora imp
ditur; hinc, cum homo erectus in
dit, brachiis vel deorsum pendul
vel diuersimode inflexis, vel dum
dorso magna onera fert, aut quan
diuersas humeris peragit actiones, *ei*
modi ossibus partim *obsequiosis*, et s
pulae firmissime alligatis, partim *ve*
dum exercentibus renisum, maxim
opus fuit.

§. DVII.

et quibus-
nam muscu-
lis stabili-
tem det?

Quamuis vero *claviculae* scapu
anterius sustineant, earum tamen
quantur motum, et vti CELSVS c
cte iam innuit, per se non moue

, sed cum humeri motu consensunt. Diuersis praeterea *musculis* dantur et stabilitatem; ex quibus ab *antere clauicularum parte* incipiunt *deltoidei*, *cleido - mastoidei*, raro *scaleni*, *omohyoidei* quoque ac *thyreoidei*, si iora habeant principia. *Eidem* inserviunt *trapezii*; ab antica et media promaniunt *pectorales maiores*; ab interioribus deum et inferioribus marginibus oriuntur *subclauii*.

§. DVIII.

Supereft, vt hac occasione *observationes* quasdam et *cautelae practicas* subingam. *Observationes et cautelae.*

- I) Fracturam et luxationem clauiculae in extremitate posteriore brachii in loco adfecto sequitur resolutio, et mouendi impotentia.
- II) Rarissime clauicularum, ob firmissimum per valida vincula (§. DIV.) nexum, in extremis posterioribus contingit luxatio; interea anterius tam introrsum, quam extrorsum, ob maiorem mobilitatem (§. DIII.), excidere possunt.
- III) Quando in fracturis resoluta fragmenta repositionem partium

impedientia eximenda sint, et haec ob causam incisio instituenda caueatur, ne vasa (§. DV.) laedantur, et haemorrhagia lethalis fiat. Haec quoque cautela

IV) in anatomia forensi obseruanda praecauendo, ne in aperiendis cadaveribus, quibus, imprimis circa clauiculas thoracis vulnera inflata fuerunt, sub separatione sterni a clauiculis, vasa discindamus, ipsamque hanc sub sectione factam solutionem, et inde productam sanguinis in caua extrusionem, pro causis mortis habeamus, adeoque in deuiis ducamur, saltem in inquirendis veris causis, ferendoque iudicio, dubii haereamus.

§. DIX.

Ossis humeri
significatus,
eiusque ab
humero dif-
ferentia.

Adiutorium scapulae vtriusque humeri os est. Hoc de prima brachii parte dicitur, quae per excellentiam brachium vocatur, quia βραχίον in vniuersum ossa denotat, quae a summo humero, ad extremam vsque manum extenduntur. Humerus autem, humerusque os differunt. Locum enim, quod caput ossis humeri cum superficiali scapula

ae sinu articulatur, Graeci ὤμων, ad
 ar humi, in microcosmo ferendis
 eribus aptum appellarunt; interdum
 m sub illo *caput ossis*, vel *scapulas*
 is, quas alii rursus partes humeri
 teriores nominant, intellexerunt,
 eque *partem scapulae superiorem* hu-
 ri, articulo superiectam, ἐπωπιδν, *su-*
humeralem, os vero *scapulae subie-*
 m, *humeri os* proprie dixerunt.

§. DX.

Sunt autem *ossa humeri* longa, cras- *definitio.*
 ex parte rotunda, *fistulosa*, magna
 us cavitare, pro continenda medul-
 in extremis vero reticulari et spon-
 osa substantia, pro fouendo medul-
 o succo praedita, e trunco laterali-
 pendula, superius cum scapulis, et
 ferius cum cubitis mobilissima.

§. DXI.

Instar reliquorum ossium fistulosorum *ossificatio et*
 . XXXIX.) in *media longitudine* *fibris* *perfectio.*
 ngitudinalibus, quibus interposita
 nt interstitia porosa, incipiunt, tar-
 usque in extremis, intus spongiosis,
 tus porosis, ossescunt. Hinc primo
 quentibusque mensibus *trunci* qui-
 em *perfecti*, sed *extrema imperfecta*
 thuc obseruantur. *Extremae adnatae*
 car-

cartilagine e medio pedetentim rificunt, ossi mediante periosteo vniuntur, ac osseae fere, cartilagine quasi teriacente, ad plenam corporis statum ram vsque in superioribus praepritis partibus adhuc distinguuntur; *citius* vero *inferiores epiphyses* cum ossibus confluent, sicque ex *epiphysibus spur.* fiunt *apophyses*.

§. DXII.

Caput eius,
modusque
vnioris cum
scapula et
clauicula.

Vbi *caput ossis humeri* vtrimque firmatae scapulae committitur, ibidemque firmatae humeri os introrsumque dirigitur, *segmentum sphaerae* refert; pro libera vero et mobilissima articulatione cartilagine constitutum, politum, mucilagineque articulari illinitum, laxo valido articulo cum scapula ita quidem adunatur (CCCCXCIV.), ut inaequali eius radicibus, cui ligamentum capsulare inferitur, sustentetur, insimulque sursum introsumque a clauicula et acromio, sursum vero, et ex parte retrorsum a rostri formi processu, ductisque ad summum humerum ligamentis, probe muniatur atque defendatur (§. CCCCXC. CCCCXCVI.).

§. DXIII.

ad partem capitis huius exteriorem
tuberculum maius, extrinsecus *triplicis*
pressionis vestigia sistens, eminet,
 ad *sinu* oblongo, superius profundo,
 progressu infra caput mox attenuato,
 iniori, ad priorem partem posito,
 inguitur. Fit autem *profundus* ma-
 ne *sinus* a tuberculorum *marginibus*,
 orum *exterior* magis eminet in-
 ore.

Tubercula
 ad partem
 capitis exte-
 riorem posi-
 ta, ipsisque
 interiacens
 sinus.

§. DXIV.

infra caput ossis humeri *fistula*, ini-
 rotunda, in linea recta versus me-
 m, et in ipso gracilescens, spinam
eram, aliasque *inaequales* hinc in-
 obtusas habet *lineas*, postea intror-
 n leniter incuruata, succesive late-
 , et in infima latissima parte, *caui-*
e anterieus ante trochleam *superficiali*,
 interiecta eminentia *bifida*, *posterius*
 em *profunda* fatis, *septoque osseo* a
 ori diuisa, gaudet. *Viraque*, flexio-
 n et extensionem cubiti sustinet,
 nque ob causam duos vlnae proces-
 alternatim excipit.

Structura
 tam trunci
 ossis humeri
 in media et
 infima parte,

§. DXV.

Extremitas inferior trochleam refert,
duabus eminentiis et media sinuofita-
te,

quam extre-
mitatis infe-
rioris, qua
cum cubito
articulatur.

te, orbiculatim ab anteriore facie
posteriorem tendentibus, composuit.
Hanc *gracilior* excipit sulcus, desinens
exteriora versus in *capitulum anterius*
rotundum, et ex parte *posterius* praeter-
itum; tota vero *extremitas* cartilagine
cruetata, succo articulari illinita,
retrosum vlnam et extrorsum radii
mobili recipit articulo, et arctis vlnae
disque constringitur ligamentis. Praeterea
laeuigatis etiam cartilagine con-
lis, in quibus tanquam latissima par-
margines, *internus* et *externus*, termi-
nantur, quorumque *interior* mai-
conuexus, oblique retrorsum directus
est, *exterior* minor, parum antri-
sum extuberat, non articulationi soli
humeri cum cubito, ne leuiori cedat
firmatur, verum *iisdem* etiam exten-
sores et flexores carpi ac digitorum m-
nus, et muscoli supinationem et pro-
nationem eius adiuuantes (§. DXVI)
stabiliuntur.

§. DXVI.

Quibusnam
musculis
fundamen-
tum prae-
beat?

Quum vero vi structurae et coniun-
ctionis prae reliquis omnibus liber-
tum et amplissimum exerceat motum
impressionibus, lineis, eminentiis, mar-
ginibus, sulcis, foveisque, variis
validis *musculis*, diuersimode brachium

mo

uentibus, fixam quoque sedem et
 ilitatem dat. Maioris quidem tu-
 culi superiori impresioni (§.DXIII.)
 inque inseritur *supraspinatus*; me-
 e *infraspinatus*; et inferiori ro-
 dus minor. Minori tuberculo (§.
 III.) adhaeret *infrascapularis*. A
 te superiore supercillii sinus scapulae
 go tendine, instar ligamenti, per
 um oblongum descendit *alterum bi-*
tis caput. In *marginibus* tubercu-
 um (§. DXIII.) intrinsecus *latisfi-*
s dorsi et *rotundus maior*, extrinse-
 vero *pectoralis maior* finiuntur. In-
 pectoralem, in medio fere trunci, li-
 e eminenti asperae (§. DXIV.) in-
 tur *deltoides*; iuxta praecedentem
 ae proximae *extensor brevis*; spinae
 ernae *brachiaeus externus*; quo-
 n tendines, vna cum *extensore longo*,
 CCCCXCIX.) infra mediam humeri
 tem posterius adunati, *tricipitem*
 si faciunt. *Brachiaeus internus* mox
 ra deltoidem ab origine supra fa-
 n humeri anteriorem procedit. Ex
 cosito fere musculi deltoidei in su-
 iore et interiore humeri parte ter-
 natur *coracobrachialis*. Supra con-
 um humeri externum in spina, quae
 erior est, *supinator* incipit lon-
 Tandem vero ab ipsis condy-
 lis

lis (§. DXV.), externo nimirum, proueniunt radiaeus externus, extensor communis digitorum, ulnaris externus, anconaeus, et supinator brevis; interni autem radiaeus internus, ulnaris internus, sublimis, palmaris, et pronator rotundus.

§. DXVII.

Quomodo
humerus exci-
dat?

Quod restat, ex praemissis et modo coniunctionis cum scapula (§. CCCXCIV.) facile colligitur, brachium saepissime omnium *anterius, posterius, et inferius, raro retrorsum* elabi posse; *sursum* autem non excidere, nisi, accedente magna vi, processus (§. CCCXCV. CCCXCVI.) vna fuerint comminuti.

§. DXVIII.

Quid scrip-
tores Graeci
cubiti voce intellexerint?

Brachium interiore extremitate excipit *cubitus* (§. CCCCCXV.). *Cubiti* voce scriptores Graeci vel *gibberositate* et *acumen* in brachio medio, ὠλέκρον, κύβιτον cet. dictum, vel *ossa distenta fistulosa*, humerum inter et carpum posita, extremis se inuicem tangentia, intermedio lato ac membranoso copulata ligamento, vel *mensurae certum genus* indicarunt.

§. DXI.

§. DXIX.

Potest itaque *cubitus* vel in *sensu la-* *Quaenam*
ri, vel *strictiori* considerari. In *prio-* *sub generali*
generatim quaeritur: cur bina firma, *et speciali*
 longa, gracilia et fistulosa ossa inter- *cubiti consi-*
 dia brachii constituant? quaenam in- *deratione*
 illa ratione magnitudinis, figurae, *perpenden-*
 sitiei, positus, articulationis, mo- *da?*
 que intercedat differentia? qua-
 nam inter se inuicem exercent mo-
 tum? et quomodo coniunctim cum
 humero et carpo diuersimode mo-
 vantur? In *posteriori inspecie* tan-
 tum *ulnae*, quae per excellentiam
cubitus nominatur, ratio habetur.

§. DXX.

Ulna *focile maius*, Gr. *πυχὺς, προ-* *Ulna eius-*
χόν, est os cubiti posterius, fistulosum, *que modus*
 priori intus gaudens cauitate, solidum *ossificationis.*
 men, radio longius, superius cras-
 sius, et versus inferiora gracilescens.
 In *media longitudine primum ossescit;*
 citius in *extremis*, quae *epiphyses*
 sunt. Ex *his* quidem citius *infer-*
 ior rigescit, sed diutius cartilagine
 quasi distincta manet, et sub praepara-
 tione sceleti, post tempus pubertatis
 huc secedit; *superior* autem perfe-
 ctionis gradum nata, citius cum trun-
 coalescit, et post pubertatis annos,
 T quan-

quando homo ad plenam staturam productus fuit, iam continuat, nec, prior, coctione separari potest.

§. DXXI.

*Descriptio
generalis ex-
tremittatis
vlnae supe-
rioris,*

Epiphysis vlnae superior fidissimè coniunctione per γύγλυμον cum humero articulatur. Gaudet nimirum duobus processibus fere triangularibus, quorum pro validi ambientis ligamenti capsum, rursus firmiori insertione, asperiusculis orbiculatim exsecuti, et intermedia sinuositate, laeuigata, lunata, seu sigmoidea eminentia diuisa, trochleam humeri (§. DXV.) alternatim expleunt.

§. DXXII.

*et specialis
processuum,
anterioris
et posterioris.*

Anterior, inferior, et minor processus a figura Graecis κορώνη dictus, latius et eminentia in duas aequales superficies sinuatas diuisus, sub flexione cuiuslibet, quando versus humerum ad lineam rectam extenditur, obtuso acumine subit sinuositatem anteriorem, et interioriorem, (§. DXIV.), posteriorque tumet. Maior autem, superior et posterior, crassus, inaequalis, superius quoque tenui cartilagine opertus, Graecis ὠλέκρانون, ἄγκων (§. DXVIII.), posteriorem humeri partem constituit.

extrorsum recuruatus sub flexione et
 extensione supra trochleam libere mo-
 tur, superiore autem summitate ob-
 a posterioris humeri cavitatis fun-
 um in extensione attingit, et ad se-
 um osseum (§. DXIV.) allidit; quo
 o resupinatio cubiti ad posteriorem
 meri faciem impeditur, et extensio
 matur.

§. DXXIII.

Praeterea sub infima cavitatis sigmoi- Sinus latera-
lis pro arti-
culatione
cum radio.
 ae parte *extremitas superior* exterior-
 versus, et lateraliter *leuiter sinuata* est.
us hic paruus, oblongus et transuersus,
 tissime cum *crista radii* congruit,
 inque, ad exercendum supinationis
 et pronationis manus motum, mo-
 i iunctura recipit (§. DXXX.).

§. DXXIV.

Ab extremitate hac *truncus* successi- Corpus vi-
nae eiusdem
que in tres
spinas di-
uisio.
 gracilescens (§. DXX.), non tereti,
 d *triangulari forma*, inferius versus
 dium pallulum recuruatus, descendit,
 si posterius, *lateribus* vero aequali-
 s, vel introrsum vel extrorsum spe-
 ans: hinc in situ cubiti naturali, in-
 itu *trium* adparentium *spinarum*, acu-
 , posteriori superficiei opposita, *an-*
 rior vocanda; reliquarum vero obtu-

farum vna, quae ad processum styloideum directa est, *externa*, altera ipsi opposita, *interna* appellanda. *Margini acuto* adcrefcit ligamentum inter osseum, *reliquis* vero inferuntur musculi (§. DXXVI.).

§. DXXV.

Structura
extremitatis
inferioris,
eiusque cum
radio et me-
tacarpo con-
iunctio.

Inferius procedit in *capitulum rotundum*, antcrius non nihil eminens, ea maxime parte orbiculatum, qua cum superficiali cauitate radii (§. DXXX.) lateralem subit articulationem, tamen in hac, quam inferiore leuiore superficie, cartilagine tenui opertum. Hinc trinfecus malleolum quasi constituit, *processu oblongo, obtuso*, quem Graeci a figura *συνοειδέα* vocarunt, deorsum procedente, articulationem et ligamentum firmat, inferius autem inaequali polita tamen superficie, ligamentum et cartilagineum, quod ab ima eius parte ad infimam radii ducitur, quo cum solidiori et laeuigata triquetri ossiculi superficie committitur, mollis iunctura sustinet.

§. DXXVI.

Quales mus-
culi vel ab
vna orian-
tur, vel ei-
dem inseran-
tur?

Sic *vna inferius* cum carpo, et *superius* mobili articulatione cum humero *lateraliterque* cum radio iuncta efficitur.

totus cubitus in angulum acutum flexus, rursusque in lineam rectam extendi possit; quare variis *musculis* extendentibus, flexoribus, tam cubiti, quam manus, uti et digitorum communibus, propriis quibusdam, nec non supinationem et pronationem insimul adiuuantibus, originem, locumque insertionis praestat. Ex his utrimque *extensor longus, brevis, et brachialis externus*, confluentes, unum conficiunt *indinem*, qui eminentiae sub processu anteriore inseritur, lateraliterque extensionem aponeuroticam dimittit, *extensores digitorum*, similiter, ac *ἀποκλῆσις* bicipitis flexores manus, obtinentem. *Anconaeus* aliquot infra olecranon digitis, in linea breui, lateraliter emittente, radiumque respiciente, finitur. Iuxta finem illius *extensor communis digitorum* a parte superiore processus posterioris insimul oritur. *Brachialis internus* ad interiorum extremitatis superioris pertingit partem. *Supinator brevis* a tuberculo praecipue aspero, intra sinum (§. DXXIII.) deorsum exportecto, procedit. *Sublimis* a processu anteriore prope sinum lunatum et articulum cum crista radii oritur. Aspero eiusdem eminentiae margini adhaeret *radiaeus internus*. *Flexor profundus*

T 3

in-

infra radicem olecrani, et superficia inaequalem, cui brachialis est adfixa a tota superiore, plus quam dimidia ulnae amplitudine incipit. *Vlnaris tertius* a posteriore olecrani margine infimul prouenit, atque per totam tertiam cubiti longitudinem perpendicularis ad manus initium decurrit; *tertius* vero infra cubiti articulum finem anconae in spina ulnae externa descendit. *Indicator* posterius in spina circa medium ulnae principium coarctat. *Pronator* tandem *quadratus* a parte interiore et inferiore, praeprimis coarctatus longa et ad radium ibi directa eminens per transuersum incedit.

§. DXXVII.

Motus cubiti in pronatione et supinatione manus.

Ulnae inflexae atque *extensae* motum *radius* semper quidem sequitur (§. DXXVI.); interea ad humerum utramque partem quasi circa axem: huc verti, et *bina cubiti ossa* *semiorbita* *culatim* ad se inuicem circa *extremorum latera* moueri, atque cum manu in *pronatione* et *supinatione* diuersimode tractari possunt.

§. DXXVIII.

Radius quid?

Est autem *radius* os cubiti minus ante ulnam situm, fistulosum, pri-

gis obliquum, crassum, latum, et
num, ampliore interna gaudens ca-
ate, superius per ἀγδῶδιαν capitulo
meri, inferius prioribus carpi ossi-
s, et in medio, mediante ligamento
eroffeo, lato et valido vlnae (§.
XXIV.) vnitum. Nominatur etiam
differentiam vlnae (§. DXX.), *focile*
mus, Gr. κῆκλις, cet.

§. DXXIX.

Dum *truncus ipsius osseam* iam induit ^{eius ossifi-}
iditatem, extrema, versus quae spon- ^{catio,}
osum est, adhuc *cartilaginea* sunt, et
nquam *epiphyses* diuerso temporis
atio in *spurias* mutantur *apophyses*,
iarum *superior citius* perficitur *infe-*
ore, vtpote quae post pubertatis an-
os adhuc separari potest.

§. DXXX.

Radii capitulum rotundum est, su- ^{extremitas}
erius tamen superficiali sinu excaua- ^{superior,}
um, latiore ambitu orbiculato et cru-
a cartilaginea obductum. Pars, quae
i sinu vlnae laterali (§. DXXIII.) mo-
etur, a quibusdam *crista* vocatur:
bi vero totum os vel vlnam recipit,
el ab ipsa recipitur, vinculis probe
nunitur.

§. DXXXI.

pars media,

Post capitulum, *collum* eius *rotundum* incipit, quod ad *anterior*, oblongum crassum, asperumque vsque procedit *tuberculum*; *truncus* vero superficie *externa* gibbosa, et *interna* leniter concaua, inferiora versus magis magisque latefcens, ad extremitatem inferiorem obliquo fertur ductu, atque ob curvaturam in medio, in directione *spinæ acutæ* ad acutum vlnæ marginem (§. DXXIV.), latissimo distat spatium. *Spinam* hanc, versus finem extremitatis imæ rursus dehiscentem, ad differentiam *oppositæ*, quæ a tuberculo asperiori ad processum styliformem *anterior* tendit, *posteriorem* nominamus.

§. DXXXII.

et inferior.

Inferiore demum *extremitate radii* fit latissimus, et pro articulatione tantum cum ossibus, naviculari ac lunato, quæ sic dicta *crista vlnæ inferius lateraliter* *que sinuosus*. Ob coniunctionem cum superiore priorum ossium carpi superficiei, *inferior superficialis sinuositas*, cartilagine crustata, *eminentia transversa* quasi bipartitur, et *apophysi* crassa, brevius, obtusa et *styliformi*, antè luxationi resistente, angustatur; vbi versus posterius *lateralis* oblongus, transuer-

salu

is, tenui cartilagine obductus, a margine dehiscente (§. DXXXI.) inclusus, extremis ibidem terminatus leuior, partem capituli ulnae (§. DXXV) circumuerti finit; *extremitas* rursus *laxa* fit, atque adeo *tota*, praedictis ossibus vinculis probe firmata, diuersimode mobili committitur articulo.

§. DXXXIII.

Vi conformationis huius ad duplicem subeundum articulationis motum, *radius* summa celeritate manum in orbem vertit, eandemque, ulna siue quiescente, siue sub extensione et flexione ad qualemcunque mota angulum, antrorsum ac introrsum, nec non retrorsum et extrorsum torquet. Has quidem mutationes *propriis* potissimum, in vniam actionem conspirantibus *musculis*, peragit: interea *aliis* adhaec, quibus stabilitatem dat, manum adducit, carpum digitosque extendit atque flectit.

§. DXXXIV.

Ad locandos autem fulciendosque *musculos*, interna praecipue *radii superficies* pro flexoribus, ad volam manus tendentibus, *sinuata* est: *externa* vero *inaequalis* diuersis impressionibus le-

eiusque diuersa pro musculis superficies.

uioribusque finibus, *extensores*, tam communem digitorum, quam proprium pollicis, *aliosque iisdem* firmissime nexos recipit.

§. DXXXV.

*Horum
principia et
insertiones.*

Ex *his* notari *utrimque* merentur *profundus*, quatenus a superiore, anteriore, ac interiore parte prope articulum cum ulna incipit, et *sublimis*, a medium vsque anterioris radii parte origine se extendens; *biceps*, qui tertii tendine in superiori tuberculo (DXXXI.) finitur; *flexor pollicis longus* infra tuberculum, ab inaequalitate, super ipso adparente, procedens, internatque et anteriorem radii superficiem atque pronatorem vsque quadratum substantia sua carnea replens, et *supinator brevis* circa radium superius se flectens. Huc porro pertinent: *pronator rotundus*, cuius finis in media fere externa posteriore radii parte; *radiaeus externus*, in externo ipsius latere situm habens; *extensor communis digitorum*, proprius tam *longus pollicis*, in superiori et posteriore radii facie, quam *brevis* sub priore ab eadem, media tamen parte, ut et ligamento insimul interosseo interdum etiam ab exteriori ulnae superficie, incipientes; *supinator der-*

longus, qui margini priori capituli inferioris radii inferitur, et *pronator quadratus*, cuius finis pars radii inferior, et margo eius posterior.

§. DXXXVI.

Caeterum ex modo coniunctionis *Quomodo cubiti cognoscimus, totum rarissime, sua dimoueri possit?* *interdum ex parte introrsum, extrorsum, antrorsum et retrorsum, frequentissime* tamen in posteriorem partem, in priorem autem excidere non posse, nisi pars vlnae comminuta, atque breuissima validaque ligamenta capsularia relaxata fuerint.

§. DXXXVII.

Imis cubiti extremis *manus extrema* *Manus etymologia,* quouis in latera adposita est. *Haec* Latinis a *manando*, aut quod e brachio *promanare* videtur, aut quod ex illa *digiti emanant*, dicta fuit; Graecis vero ab usu *χειρ, ἀπὸ τῆ χειρὸς, capere*, cum digitis obuia quaeuis arripere solemus.

§. DXXXVIII.

Manum antiqui in *tres* secant *partes*, *eiusque generalis ratione figurae vsusque descriptio.* *καρπὸν, μετακαρπὸν, δακτύλος.* A *carpo* autem incipit angustata, versus ossa metacarpi latescit, in postbrachiali amplissima et latissima fit, atque in *discretis*

secretis diuersae longitudinis digitis, qui vel adduci, vel abduci et extendi, introrsum, sed non extrorsum flecti possunt, finitur, et circa medium digitum acuminatur. Hinc, ad contrahenda, apprehendenda, retinenda diuersa corpora, volae dorisque manus configurationem, nec non digitos collerrime mouendos, iisdemque, ope instrumentorum fidicinalium, minutos perficiendos motus, diuersae longitudinis, parum incuruis, sed validis, inter se mobilibus constat ossiculis, e quorum naturali positione et structura proportionata *manus* longitudo fit, manique et aptissima in omnem partem agilitas.

§. DXXXIX.

Prima manus pars seu carpus.

Κάρπος cubiti extremum immediatum sequitur; hinc *brachiale* vulgo vocatur siue prima palmae pars, ex octo ossiculis, sibi inuicem per *Διάρθρωση* strictam vnitis, composita.

§. DXL.

Descriptio generalis ossiculorum, ex quibus componitur.

Haec parua sunt, spongiosa, diuersae figurae in duos ordines disposita, externa superficie conuexa, et pro multis ossiculorum quorundam tendinibus inaequalia; intrinsecus vero magis aequalia.

, etque pro tendinibus, vasis sanguinis, nervisque ad digitos deducendis, sinuata.

§. DXLI.

Quaelibet series quatuor continet: Quanam quatenus series nominatim continetur?
 Prima ad cubitum posita, os naviculare, triquetrum, pisiforme; altera, cum ossibus metacarpi et pollice adnata, multangulum maius, multangulum minus, capitatum, et hamatum.

§. DXLII.

Tota haec, quae a figura diuersas acceperunt denominationes, post natiuitatem adhuc cartilaginea sunt, et succrescunt, tanquam minima corpuscula, hinc inde rigescunt. Quodlibet e centro, ad crustam vsque externam cartilagineam ossescit; hinc omnia tardius ossibus metacarpi in ossa conuertuntur. Quae primum autem perficiuntur, capitatum et hamatum esse videntur. Eorum modus ossificationis.

§. DXLIII.

Naviculare *σκαφοειδές* superiore superficie gibbosa in sinu radii articulatur (§. DXXXII.); parte capitata priora secundi ordinis ossicula deorsum et extrorsum attingit, siue multangulorum minus latere anteriore, et ex parte inferiore recipit; profunde sinuata anteriori

riori et superiori capitati ossis super-
ciei iungitur; *posteriore* demum ad ma-
iorem incuruam, et oblongam lunae
ossis partem accedit.

§. DXLIV.

Lunatum.

Lunare amplissima, gibbosa, et *sa-*
periore superficie cum radii sinuositate
posteriore (§. DXXXII.), *inferiore* vo-
ro profunde sinuata et lunata cum po-
steriore et superiori capitati ossis pa-
te committitur; *antere* facie recipi-
naiculare (§. DXLIII.), et *posterior*
leuiter gibba os triquetrum.

§. DXLV.

Triquetrum.

Cuneiforme, aliis *triquetrum*, est par-
uum ossiculum, quod posterius e-
deorsum modice descendit, ac instat
cunei reliquis infigitur. *Superficie an-*
teriore, plana magis, lunato adunatu-
(§. DXLIV.); *superiore* conuexa et la-
tiore insimul ad ligamentum accedit
quod ab vlna ad radium inferius duc-
tur (§. DXXV.); *inferiore* ampla, et
leuiter concaua, sed exteriora versu
rursus conuexa, osi hamato, et *post-*
rior parum gibbosa, ossiculo subro-
tundo iungitur.

§. DXLV

§. DXLVI.

Minimum omnium subrotundum, siue **Pisiforme,**
biculare, lenticulare, pisiforme, prio-
, cui adiacet, antèrius aequante su-
perficie adplicatur; reliqua parte sur-
sum ac introrsum vergit, et tam mu-
sculis quibusdam (§. DLIII.), quam
samento valido transuersali, diuersa
sinu carpi firmanti (§. DXL.), fun-
amentum praeſtat.

§. DXLVII.

Ordo osſium carpi ſecundus, cum ſe- **Coniunctio**
e prima, excepto subrotundo, ſupe- **osſium carpi**
us immediate cohaeret; inferius vero **ſecundi or-**
um quatuor osſibus metacarpi manus **dinis in-**
pollice adunatur. **genere.**

§. DXLVIII.

Horum primum in priore manus parte **Multangu-**
*ositum, multangulum maius, siue tra- **lum manus.**
pezium vocatur, quod superiore leuiter
sinuata facie particulam capituli osſis
trapezicularis recipit (§. DXLIII.); ante-
riore, partim oblonga et sinuata, par-
tem transuersali, in medio eminente
convexa superficie, phalangam primam
pollicis mobili articulo firmat; inferio-
rum parum convexa cum anteriore et la-
terali osſis metacarpi primi superficie
unitur; posteriore demum ampla satis
*oblon-**

oblonga, non nihil sinuata, cum anteriore multanguli minoris committitur et praeter fundamentum, quod musculus dat (§. DLIII.), tam *interiore apophysi* ligamentum transuersale, quae in *fulco* flexorem longum pollicis sustinet.

§. DXLIX.

Multangulum minus.

Multangulum minus, seu *trapezoides* *antere*, quodammodo gibboso latere, ad prius (§. DXLVIII.), *posteriori* vero, sinuato satis, ad os capitatum admouetur; *superius* partem capituli ossis navicularis (§. DXLIII.) recipit et *inferius* ampla, oblonga, lateraliter sinuata, et in medio eminente facie, maxima parte sinuositatis primi metacarpi ossis recipitur.

§. DL.

Capitatum.

Maximum, *crassissimumque omnium* in medio inter multangulum minus et hamatum positum, superiusque a naviculari et lunato tectum, *capitatum* est. *Capite* nimirum magno cum navicularis (§. DXLIII.) et lunati (§. DXLIV.) sinuosis superficiebus articulatur; *antere* et *inferiore* gibbosa facie cum multangulo minori mobilis est (§. DXLIX.); *posteriore amplissima* leuiter concaua cum hamato unita

infima

feriore demum lata in *tres* diuersae magnitudinis partes subdivisa est. *Pri-*
ma compressa, oblonga, et sinuata par-
tem capituli superioris ossis metacarpi
primi recipit; *altera* siue *media* latissi-
ma, et plana magis, os metacarpi se-
cundum; et *tertia* exiguum particulam
ossis metacarpi tertii.

§. DLI.

Agmen demum horum claudit ha- *Hamatum.*
atum, aliis *unciforme* et *cuneiforme*
nuncupatum, quod magnum, crassum, posterius
interius, ceu *uncus* incuruatum, ha-
bitans *suo processu* musculos ac ligamen-
tum transuersale fulcit atque sustinet.
Superficies *anterior* latissima *superficie*
capitatum attingit (§. DL.); *super-*
iore paullulum conuexa, et postero-
ac exteriora versus oblique descen-
dente, concava, inferiorem triquetri-
s recipit (§. DXLV.): *inferiore* ve-
ro mediante transuersali eminente li-
nea, in duos fere aequales diuisa sinus,
in maxima parte tertii ossis, et tota
parti metacarpi adunatur.

§. DLII.

Tota itaque haec ossa, figura, positu, *Ossium carpi*
magnitudine, et crassitie differentia, *ad motum*
cum cubito, quam inter se, et cum *exercendum*
aptitudo, et
U *ossibus*

praeterna-
turalis eo-
rum immo-
bilitatis
causae,

*ossibus metacarpi manus ac pollice co-
nexa, ligamentis breuibus validis
capsularibus alligantur, et cum mo-
litate firmanantur, seorsim periosteos
cartilaginibus, vbi superficies se co-
tingunt, incrustantur, ac liquore M
uersiano, qui continuo motu e cryp-
tuis exprimitur, inunguntur, sicce
variis subeundis conuersionibus apti-
ma redduntur. Si in vno aut alte-
ro marsupio callus ad articulum ossis
ecti nascatur, vel ligamenta rigescant
vel exostosis ad iuncturas contingat
vel mucus inspissetur, vel plane de-
ficiat, frequens oritur articulationis et
duriori tumore immobilitas, siue an-
kylosis. In fracturis minuta ossicula co-
ficillime in sedem reponi ac conglu-
nari possunt; hinc facile illas immobi-
litas articulorum, abscessus, suppu-
rationes, fistulae, ossiumque caries
sequuntur. Si ab externis violentiis
luxentur et distorqueantur, manus ri-
da fit.*

§. DLIII.

Quibusnam
musculis ori-
ginem et lo-
cum inser-
tionis con-
cedant?

Propter motum autem, quem ex-
cent (§. DLII.), partibus inaequa-
bus sinuatis et gibberosis, diuersos vtri-
que locant et stabiliunt *musculos*. *M
naris* nimirum *internus* forti tendit

qua

arto primi ordinis eminenti et sub-
 tundo ossi inseritur, a cuius antero-
 et posteriore parte insimul prouenit.
Abductor minimi digiti. Abductor polli-
, vti et hypothhenar ab ossiculo pol-
 lem sustentante, siue multangulo ma-
 ri, origines ducunt, ipsique *tendo-*
diaei externi, si *bicornis* vel *tricornis*
 , infigitur. Demum ab incuruo et
 o processu vnciformis ossiculi, antea
 memoratus *antihypothhenar* digiti mini-
 , vt et *adductor eiusdem* procedunt.

§. DLIV.

Alteram manus partem, μετακαρπὸν, Pars manus
e postbrachialem, quatuor consti- altera siue
unt ossa fistulosa, diuersae magnitu- metacarpus.
 nis et crassitiei, superius in cellulis
 ccum medullosum, ipsam vero me-
 llam in medio fouentia, oblonga,
 acilia, firma, extrinsecus leuiter con-
 exa, intus parum concava, alia iuxta
 a, relictis interstitiis, posita, volam
 anus expandentia.

§. DLV.

Trunci eorum citissime exceptis addi- Modus ossifi-
mentis, perficiuntur (TAB. I. FIG. cationis et
 I. et TAB. II. FIG. I. et II.). *Epi-* perfectionis
pysses superiores, ossium bases, citius,
 uam inferiores cum truncis concre-
 U 2 scunt;

scunt; hinc *inferiores* post annum p
bertatis, perfecta iam corporis stat
ra, separabiles adhuc sunt.

§. DLVI.

*Specialis ex-
positio ex-
tremittatis
offis meta-
carpi primi.*

Omnia habent capitula superiora,
regularia, inaequalia, *iisdemque* vel
teraliter inter se, vel *superius* cum
inferiori ordine ossium carpi articula
tur. *Primum* longissimum et crassi
mum, *superficie superiore amplissima*
in medio sinuata, et in extremis hinc
inde eminente, recipit multangulu
minus (§. DXLIX.); *antere*, leui
re, *exigua* et oblonga sinuositate, par
culam multanguli maioris (§. DXLVII)
et *minima posteriore*, gibbosa, port
nem capitati (§. DL.): *lateraliter anter*
re, leuiter sinuata *lata facie*, *super*
ad articulum pollicis primum, et *pos*
riore hinc inde conuexa, ad laterale
et anteriorem ossis metacarpi secun
accedit.

§. DLVII.

secundi.

Alterum, priori breuius, *superiora*
que crassum, amplissima facie, ex pa
te sinuata, ex parte gibba, aptissim
conuenit cum inferiore capitati parte
cui in medio iungitur (§. DL.); *ante*
rius a styloformi quasi processu firm
tu

; *lateribus* autem, *priore* nimirum
 plissimo, *duobus* paruis et *oblongis* si-
 us ad capitulum ossis metacarpi pri-
 (§. DLVI.), *posteriore* vero minore,
transuerso sinu ad capitulum tertii ad-
 uetetur (§. DLVIII.).

§. DLVIII.

Reliqua paullatim breuiora et te- ^{tertiū,}
 iora fiunt. *Tertium* minori gaudet
 bitulo, quod inferiori ossis hamati
 superficiem committitur (§. DLI.),
 in *anteriori* latere transuersali et
 longa eminente planitie cum se-
 ndo metacarpi osse, *posteriore* autem
 iter conuexa parte, cum quarto
 itur (§. DLVII. DLIX.).

§. DLIX.

Quartum denique amplam *superius* ^{quartique.}
 bet superficiem, quae in medio *sinua-*
 , in extremis *capitata* est. *Partes gib-*
sae recipiunt posteriores et inferio-
 s vnciformis ossis sinus, et *media si-*
uositas aptissime cum transuersali ha-
 ati eminentia conuenit (§. DLI.).
superius et *anterior* exigua cauitate ad
 rtem capituli ossis metatarsi tertii po-
 riorrem accedit; *posterius* vero in-
 quale et liberum est.

§. DLX.

Corporum
ossium me-
tacarpi fi-
gura, di-
rectio, et
distantia,

A superioribus extremitatibus o-
parum incuruata longitudinaliter d-
scendunt, a *lineis* quibusdam obliqu-
inaequalia, intus vero *concaua*, et
eminente spina, quae in quouis osse
superiori capitulo per medium corp-
ris ad inferius ducitur, acuminata fiunt.
Gibbosa eorum pars *dorsum* et *sinu*
volam, siue *palmam manus* facit; pro-
portionatam vero ipsius *latitudinem* in-
sta efficit *ossium* a se inuicem *distantia*.
Quae enim superius se contingunt,
medio insigniter diuergunt, et longi-
ri distant interuallo, rursus autem ve-
sus capitula inferiora coeunt, et ad
inuicem accedunt.

§. DLXI.

nec non in-
feriora co-
rum extre-
ma, ac ra-
tio modus-
que articu-
lationis tam
cum digitis,
quam in-
ter se.

Inferiora capitula, pro diuersitate
ossium, magnitudine differentium, plu-
minus maiora, ab exteriori parte
interiorem *orbiculata*, et cartilaginibus
crustata, superficiales digitorum cau-
tates, in articulis primis superius con-
spicuas, recipiunt, propriisque vi-
culis capsularibus constringuntur; *in*
liquae sibi inuicem commillae partes
cartilaginibus obductae, vbi se aliae
ossa contingunt, *superius* strictissimis
breuissimis et valentibus coagmentantur.

ligamentis, ac, quo metacarpus in planitiem explicari, vel quouis situ commodè cauus reddi possit, neque impedimento motus ipsius, lateraliter alligantur; *inferius* autem, ne diductione *metacarpi ossa* nimis a se vicem diuergant, ligamentis, quae capitulorum lateribus inferuntur, insinuantur retinentur.

§. DLXII.

Praeterea *interstitia ossium metacarpi* Quinam musculi eorum interstitia repleant, ab illis procedant, iisdemque inserantur? plentur a *musculis interosseis*, qui diducunt ossa vel adducunt, vel abducunt. *Interossei* in dorso manus positi sunt, et quilibet vtrimque a vicinis oritur ossibus. *Digitus medius duos* habet *externos*, quorum *prior* in externum ipsius inferitur, *posterior* in internum, *tertiusque* ad annularis externum. *Interosseorum*, ossibus metacarpi suppositis, *primus* interno infigitur indicis, *alter* externo eiusdem, et *tertius* externo auricularis. Quoad reliquos, qui vel ab ossibus metatarsi incipiunt, vel iisdem *inferuntur*; ab interno latere ossis metacarpi indicis *musculus* oritur, intuitu medii digiti, *abductor indicis*, et respectu pollicis *abductor* dictus. Superiori parti ossis metacarpi indicis inferitur *radialis internus*;

ternus ; *externus* vero *tendine* uno anteriore et superiore eiusdem os parte, *altero* vero in secundo metacarpi osse finitur. *Hypothenar* , siue *phalanx brevis pollicis* , superius ab ossibus metacarpi indicis et digiti medii prouenit. *Antithenar* a tota incedit longitudine ossis , medio digito supposita. *Vlnaris externus* superius osse , quod digitem minimum fulcit, inhaeret. A eodem procedit *ligamentum*, os subrotundum carpi firmans. *Palmaris* denique *brevis* superius et exterius illud ducit originem ; nec non *antithypothenar* minimi digiti ab interno eiusdem incipit latere.

§. DLXIII.

In quam partem ossis metacarpi excidere possint?

Ex indicato iam positu , et connexionis ac articulationis modo cognoscimus, *extrema eorum* , quae indice et auricularem fulciunt, accedente extrorsum tantum, omnia autem in priorem et posteriorem partem ab ordine carpi secundo dimoueri posse.

§. DLXIV.

Partes tertiae manus, siue digiti.

Tertiam et *extremam manus partem* constituunt *digiti* , Gr. δακτύλοι, ex ossiculis oblongis, rectis, fistulosis magnitudine, figura, et crassitie differentibus.

antibus, cum carpo, metacarpo, et
ter se ad omne punctum mobilibus,
impositi.

§. DLXV.

Singulis manibus *quinque* tribuun- Digitorum
numerus, de
nominatio,
compositio,
r: *pollex, index, digitus medius, an-
gularis, et auricularis.* Quilibet ter-
a habet *osficula*, quorum ordines,
um veluti in aciem structi sint, Φά-
γγες in genere, in specie ossa meta-
carpo proxima προκόνδυλοι, media κόν-
δυλοι, et postrema μετακόνδυλοι, vel,
um unguium radices constituent, εν-
ονύχια antiquitus insignita sunt.

§. DLXVI.

Cum ossibus metacarpi successive ossificatio,
erficiuntur (TAB. I. FIG. III. et
TAB. II. FIG. I. et II): hinc in foetu
ars eorum media solida iam, extrema
ero cartilaginea adhuc sunt; superio-
a tamen additamenta citius, quam in-
eriora cum ossibus continuant.

§. DLXVII.

Omnes autem *digiti* sic sibi natura- magnitudo,
ordo, dispo-
silio,
ter appositi sunt, vt *medius* longissi-
mus supra omnes emineat; *index* et *an-
gularis* aequali fere longitudine ad late-

ra adstent ; his vero auricularis *breuio* sit, et *pollex* omnium breuissimus.

§. DLXVIII.

et composi-
tionis ratio.

Quo vero *manus* apprehendendis capiendis, firmissimeque retinendis corpusculis, minimis etiam, aptissimè redderetur ; oportuit *digitos* naturaliter *disiunctos*, neque ex vno rigido sed, pro augendo robore, *pluribus diuersae longitudinis*, in internam tantum partem flexibilibus, *ossiculis* compositos esse.

§. DLXIX.

Articuli di-
gitorum su-
periores,

Quatuor primi ordinis longissima ossa excepto pollice (§. DLXXIII.), *superius sinuata*, cartilaginibusque operata capitatis extremitatibus metacarpi inferioribus per *αρθρώματα* committuntur (§. DLXI.). *Corpora eorum extrinsecus conuexa, intus plana et concava* successtue gracilescunt, abeuntque in *capitula* minora, *lateraliter et introrsum tumentia*.

§. DLXX.

medii,

Media, siue secundi ordinis, breuiora, superiusque per *γυγγλυμον* cum prioribus mobilia sunt ; hinc *quodlibet* duobus gaudet *sinibus glenoideis*, inter
ieca

Ha eminentia extrorsum tumente dissis, cartilagine crustatis, prioribus articularum priorum capitulis exacte conuenientibus, et mediantibus ligamentis capsularibus vnitis. Instar superiorum graciliora, teretia extus, intus lata et plana descendunt, similiaque cum sulco interiecto capitula forment.

§. DLXXI.

Tertii demum ordinis ossum brevis- et inferiores, *et triangularium superiores extremitates*, tanquam bases, cum inferioribus articularum secundorum adiacentis (§. DLXX.) conueniunt, et simili modo inferiora eorum laeuigata recipientes capitula, peculiaribus neantur ligamentis. Ab his vero breues descendentes trunci, imis partibus extus obtusis, intus instar sagittae dissis, unguis fulciunt.

§. DLXXII.

Omnes hi, pro digitorum differente longitudine, maiores minoresque articuli ad miram digitorum faciunt agilitatem, quibus, quum discreti sint (§. DLXVIII.), vel coniunctim, vel separatim in extensione, flexione, adductione, abductione utimur. Sub expli-

Vsus digitorum.

plicatione manus non digitos solum sed ipsum etiam diducimus metacarpum. Ad manus claudendas digitos vel omnes simul, vel seorsim quosdam diuerso flectimus gradu, eosdemque siue ad fines ossium metacarpi, siue ad truncos illius et volam manus, siue ad principia eorum adducimus.

§. DLXXIII.

Pollex.

Quo vero versus pollicem reliquae rite moueri et curuari possint, *pollex* caeteris quasi *aequipollens*, ex tribus robustioribus et crassioribus articulis, in omnem partem mobilibus, compositus, instar *minoris manus* prioribus oppositus, lateraliterque appositus est. Hinc Graeci eleganter illum ἀντίχειρ vocarunt, quasi *promanum*, quod vel instar *omnium* sit, vel caeteris *oppositus*.

§. DLXXIV.

*Eiusdem
coniunctio,
articulatio,*

A reliquis differt *crassitie* et *mota*. Nullum enim recipit os metacarpi, sed cum multangulo maiori immediate iungitur. Hinc *articulus ipsius primus*, *superius* fatis amplius, duobus sinibus politis, et interiecta eminentia, cum praedicti *ossis* inferiore superficie quae ad latera capitata et in medio fulcata est (§. *DXLVIII.*), conuenit, a

pe

er γίγγυμιον vnitur; *lateral*i vero bre-
 , et oblonga *eminentia* , cartilagine
 uftata , ad impreflionem ofsis meta-
 rpi primi admouetur (§. DLVI.) ,
 nculisque firmatur. Praeterea articu-
 tio phalangae primae cum fecunda, et
 cundae cum tertia coincidit cum
 otu fecundae et tertiae ceterorum di-
 torum.

§. DLXXV.

Intuitu *articulationis fitusque liberio-* *motus et*
m exercet *motum* , adducendo et ab- *usus.*
 ucendo , *palmamque manus* vel am-
 lam et planam, vel constrictam, com-
 reffam et acuminatam , vel , flexis
 x opposito reliquis , curuam reddendo.
Curuati omnes orbiculatim ad *pol-*
cem et inter fe inuicem coeunt ; in
 ecie vero *pollex* ad omne punctum
 mobilis, quiescentibus aut motis re-
 quis, diuerfimode, et non nihil quo-
 ue extrorsum moueri, curuatus cum
 mnibus committi , vltimaque ipsius
 halanga intra reliquorum flexos articu-
 os claufa manu abscondi, vel extensus
 ollex, quando tota fcilicet manu digi-
 sue nonnullis aliquidprehendimus,
 d reliquos parum flexos adduci, atque
 deo inexplicabilibus modis, aliis di-
 uerfo succurrere potest motu.

§. DLXXVI.

§. DLXXVI.

Quinam di-
giti valen-
tiores ac de-
biliores sint,
et vim polli-
cis augeant?

*Vim vero pollicis maxime auget in-
dex digitus*, magnam cum illo exer-
longissimus, ac *praecipuam manus fac-*
partem; reliqui illam perficiunt, et, quan-
uis prioribus debiliores sint, *eorum* tu-
men numero partium multiplicatur vi-
atque hoc modo in capiendis, com-
primendis, mouendis, ac retinendis
diuersis corporibus, digiti digitos,
manus manum, iuuant.

§. DLXXVII.

Ossa sesamoi-
dea.

In manibus pedibusque frequenter
hinc inde obseruantur *ossicula*, incerti
numeri, *lunatis* perquam *similia*, *exte-*
gibbosa, *intus* parte, qua articulis in-
haerent, *lunatim* excisa, et a figura *se-*
minis sesami, *sesamoidea* dicta, plus im-
nus maiora, *initio cartilaginea*, *postea*
in adultioribus et senibus duriora, atque
firmiora.

§. DLXXVIII.

Eorum diui-
sio, vsus,

Haec vel *vera*, vel *spuria* sunt. Pri-
ra sunt hypomochlia, quibus muscu-
li inferuntur, et maiorem in ele-
uanda parte vim acquirunt, quorum
que frequentia in gracilioribus mani-
bus robur augetur, et illa suppletur
vis, quae a torosioribus alias proficiscit-
tu

r musculis : *neque enim ex sola ma-*
nitudine, sed fabrica machinae aesti-
mandae sunt vires. Posteriora, irregu-
 ria, a tendinum callositate proueniunt;
 quidem ab illorum ad ossa continuo
 tritu callus, et lenticularis induratio,
 quae in cartilagineam et osseam abit na-
 turam, proficiscitur.

§. DLXXIX.

Ex veris in manu ea potissimum no-
anda, quae in coniunctione arti-
culi primi auricularis digiti cum os-
se quarto metacarpi, indicis cum
secundo metacarpi osse, phalangae
secundae pollicis cum prima, se-
sem habent. *Rariora sunt in secun-*
dis reliquorum digitorum internodiis,
curiaque non nunquam inter multan-
gulum minus ac capitatum, quartum
metacarpi os et hamatum, aliisque in
locis enata, et ab auctoribus passim ad-
notata.

et locus in
manibus.

§. DLXXX.

His perpenfis, musculos, quibus di-
gitis, ossaque sesamoidea insertiones
praestant, considerabimus. *Flexores*
quidem in interna phalangarum super-
ficie, et extensores in externa firman-
tar. *E flexoribus quatuor lumbricales*
 lon-

Quibusnam
musculis tam
digiti omnes,
quam ossa
sesamoidea
insertiones
praestent?

longis tendinibus lateribus phalangium primarum in directione verticis pollicem inferuntur. Nuper horum *quinque* vidi, quorum *quintus* posteriorius lateri medii digiti infixus erat. *Perforatus* quatuor tendinibus finitur in parte superiore ossium secundorum quatuor digitorum: *perforans* vero, totidem filius tendines priores perforantes, ad prima quatuor digitorum ossa abit. *Flexor pollicis proprius* ultimo pollicis ossi adhaeret, vel duplici tendine articulis, secundo et tertio, inseritur. In phalanga prima secunda, ubi ossicula sesamoidea habere solent (§. DLXXIX.), terminatur *abductor pollicis*; in capitulo inferiore primae phalangiae *hypothenar*, primo ac secundo eiusdem internodii *antithenar*. *Adductor pollicis* ad internum latus ossis primi pollicis procedit. Tendineis extremis posteriori parti capituli ossis primi digiti minimi *hypothenar*, et *antihypothenar minimi digiti* implantantur. Quoad extensores: *extensor communis digitorum manus* superiorem partem ordinis secundi quatuor digitorum totidem obtegit tendinibus; *extensor proprius pollicis* duobus, tribus, immo etiam quatuor, cecidi vidi, in tribus pollicis articulis terminatur.

natur

tur; *indicator* autem eundem cum
mmuni extensore finem habet.

§. DLXXXI.

Praeterea inquirendum, cur *digiti* *Quaestiones.*
ilius, et in quas partes e sede di-
oueri possint? quid consilii in gra-
ore et violenta digitorum commi-
tione? quidque sentiendum de di-
is, numero vel excedentibus, vel
deficientibus, difformibus, et
praeternaturalibus?

CAPVT V.

DE

EXTREMITATIBVS
SCĒLETI INFERIORIBVS.

§. DLXXXII.

Extremities inferiores, inter se simi-
les, ac proportionatae magnitu- *Extremita-*
dinis, ex *ossibus* validis et cum *tes inferiores*
bilitate obsequiosis, structura, *constant co-*
e, magnitudine et figura in vniuer- *lumnis osseis,*
n differentibus, compositae, trun- *basibus suf-*
fulcimenta sunt (§. XCIII.), ad *fultis.*
ae *femora patellae, crura, pedibus*
remis tanquam *basibus suffulta*, re-
untur.

X §. DLXXXIII.

§. DLXXXIII.

Mira illarum ad diuersos motus peragendos aptitudo.

Mira harum partium agilitas et firmitas in diuersis cognoscitur mutationibus corporis localibus. Etenim vel vni vel binis pedibus *in statione* erectis tantum corpus ponderosum tenere, et vni tantum innitimur, altero varias gyrum versiones peragere possumus. *In gressu*, relicto vnico, pro sustentando corpore, immoto pede, alterum flectimus, flexumque, siue extensum etiam, ante priorem antrorsum, retrorsum, et lateraliter proiicimus. *In cursu* velociores exercemus gressus, et ternis extensionibus, eleuationibus flexionibus pedum, corpus cum stabilitate agitamus. *In saltu* centrum gravitatis totius corporis, flexis genibus magna vi eleuamus. Super pedes pedum articulos coxarum truncum erigimus, et ad omnes partes flectimus, committimus, sedemur, recumbimus. *In variis locationibus* compositis artibus corpus ita disponimus, vt linea directionis per centrum illius ducta intra basin maneat, hinc iisdem tanquam firmissimis columnis praecauemus, ne truncus facile super pedum vertices mobilis, retrorsum, retrorsum, dextrorsum, sinisterorsum propendens, in terram cadat, adeoque tam in his actionibus, quam in

me

otibus omnibus localibus, pro variis
 corporis flexionibus et inclinationibus,
 ductis pedibus, *basin* plus minus
 gemus, *pedesque* innumerabilibus fere
 modis, et vna cum ipsis totum cor-
 pus, e loco in locum commode mo-
 uemus.

§. DLXXXIV.

Quo autem de his rite et apte iudi- *Transitus ad*
 care valeamus, adcuratori, quoad *specialiora.*
structuram et positum horum ossium, va-
dasque eorum absque mobilitatis im-
 edimento *commissuras*, nec non *pe-*
liarem, ad vastissimos et valentissi-
 mos stabiliendos musculos, *conforma-*
onem, opus est scrutinio.

§. DLXXXV.

Prima et superiora, a coxis ad ge- *ossa femoris,*
 ua extensa, *a ferendo femoris ossa*, Gr.
ἄνω, quod circa eorum principia cor-
 pus quasi diuidatur, adpellantur, pro-
 prieque valentissimas, longissimas, cras-
 sissimas (TAB. III. FIG. I. g. h.), fistu-
 las columnas, totius corporis mo-
 um ferentes, et cum insigni stabi-
 litate supra et infra mobilissimas, de-
 notant.

§. DLXXXVI.

eorum ossifi-
catio et per-
fectio.

Robustissima haec ossa fistulosa, *maximam* pro medulla continent *cavitatem* (TAB. III. FIG. I. l.). *Pars media citissime ossescit* et rigescit; *superiora* tamen *extrema* cum *trochanteribus* ut et *inferiora*, tanquam cartilaginea porosa additamenta, *tardius* cum *trunco* confluunt; confluunt autem *primum* *trochanteres* et *caput*, postea *condylus* remanente post *pubertatis* statum adhuc *extrinsecus* aliquamdiu *diuisionem* linea, quae *successiue* tamen *deletur*. In *nuper natis* magis *rectilinea* sunt, *postea successiue* ab ipsa *musculorum* *actiuitate*, *anterius* quodam modo *gibba*, et *posterius* *similia* fiunt. (conf. TAB. I. FIG. III. et TAB. II. FIG. I. et II.)

§. DLXXXVII.

Superior ossis
femoris ex-
tremitas
capitata,

Quoduis in *superiore extremitate* *truncato*, *magno*, et *sphaerico* incipit *capite*, cartilagine *operto*, cum *acetabulo* *circumferentia* et *figura congruente*, et, pro *mole corporis sustentanda*, *firmiter*, *fursum introrsumque* *vehementem*.

§. DLXXXVIII.

eiusque inae-
qualis fossa,
qua liga-
mentum te-
res adnascitur.

In *medio profundam* et *inaequalem fossam* habet, ex qua *ligamentum femoris* *transversum* *adnascitur*.

issimum, crassum, et elasticum educitur, quod propriae acetabuli crenae aseritur (§. CCCCLXXXI.), et, vi officii, *suspensorium* dici meretur.

§. DLXXXIX.

Quum vero oportuit ab hac parte totum corpus circumferri, pro firmitate statione et commodiori gressu, latius quandoque ossa disiungere, femur, vel etiam pedis extremum super alterum os femoris cum facilitate inclinare, atque cum firmitate ossa diducere; a capite collum non perpendiculariter, sed *oblique extrorsum* et *antrorsum*, circa basin latefcens, procedit.

Colli femoris obliqua directio.

§. DXC.

In commissura capitis cum collo femoris, et *circulo* praecipue circa basin cervicis *aspero*, *ligamentum* vasis referissimum, robustum, validumque capsulare, quod caput ossis femoris cum acetabulo iungit (§. CCCCLXXX.), firmatur. Quo vero liberius in centro acetabuli versari, et absque vasorum, illud ingredientium (§. CCCCLXXXI.) compressione, ex glanduloso-pinguedinoso organis mucus capsam inter et caput femoris exprimi, nec, relaxato forsam articulari vinculo, os prorsus

Connexio capitis femoris cum acetabulo.

ex articulatione elabi possit ; natura suspensorio prospexit ligamentum (§. DLXXXVIII.).

§. DXCI.

Trochanter.

Basii cervicis duo insignes adpositi sunt processus, qui ab officio, τρεῖς, siue rotatores dicuntur, et quorum alter altero maior productiorque est. Maior ab exteriori crassius, convexus, et inaequalis, ab interiori vero parte inaequaliter ac profunde sinuatus est, et tam his, quam reliquis locis musculos extensores, abductores, rotatores (§. DACI.) firmat, eorumque vim auget. Minor, priori inferior, et introrsum positus, cum ipso posterius mediante linea prominens obliqua communicans, oblongus, aequalis magis, et in latam summam terminans, insertioni quorundam flexorum femoris inferuit (§. DACV.).

§. DXCII.

Pars femoris maxima, cuiusque figura, superficies, et distantia ab alio.

A ceruice os cum aliqua descendente curvitate (§. DLXXXVI.), qua antrosum eminet, utrumque vero iuxta curvationis directionem, et naturaliter a se inuicem positum, maximam superius, in medio modicam, et infra minimum facit distantiam. Posterius a ro-

re minore *linea* abit ad *asperam*
mandam protuberantem *spinam*, quae,
 medio *dehiscens* et *diuisa*, ad *con-*
dylos ducitur, et *posterio*rem partem in
duas quasi *superficies* distinguit. Par-
 uis his omnibus tota longitudine
 musculis validissimis firmissimum con-
 dedit fundamentum (§. DXCV.).

§. DXCIII.

Inferiora versus successe latefcit, *Capitula ossis*
 in *inferiore extremitate* latisimum *femoris in*
 t. *Haec* maxima ex parte componi- *condylos de-*
 tur ex *duobus capitulis*, in totidem *sinientia*,
condylos, seu tubercula, oblonga, crassa,
 o anteriore facie ad posteriorem pro-
 ducta, posterius diducta, figura rotun-
 da, superius reclinata, desinentibus.
 his supra partem cartilagineam liga-
 mentum adhaeret capsulare, atque tan-
 quam hypomochliis contactus puncta
 dearticulationis firmitas augentur,
 musculique ab axe motus remouentur.
Exterior condylus minor, vltra femur
 productus planiorque, in exteriori
 latere *peculiarem* habet *foueam*. *Inter-*
ius maior, rotundus, et gibbus, late-
 re interiori leuem *sinus* accipit inpres-
 sionem. *Binis* cartilagine crustatis ti-
 bia innitimur sinibus.

§. DXCIV.

ipsisque in-
terposita si-
nuositas.

Praeterea *condyli* a priori et posteriori plus minus maiori et profunda gaudent *sinuositate*. Anterior intra illorum margines *cavitas*, lata quidem, cartilagine polita, patellae superficiebus respondet (§. DCI.), quae in illa, et capitula sub extensione et flexione biae libere mouetur (§. DCII.). Anterior sinus, condylos instar septi diuidentem, excurrit quoque *ligamentum cruciatum* et *transuersale*. Posterior, autem inaequalis, intermedius et profundior *sinus*, Graecis *ὀψύς*, Latinis *pyramides* dictus, tantum relinquit spatium quantum distantia et tuberositas condylorum, pro insertione ligamentorum cruciatorum, tutoque vasorum: tibiae transitu, efficit atque permittit

§. DXCV.

Musculi, qui-
bus femur
instructum.

A binis osibus quum summus rerum creator corpus circumferri praeccepit, validis illa instruxit *musculis*. Ex his vtrimque *pyriformis*, *gemini*, *extensores*que sinui trochanteris maiori inferuntur. *Gluteus maximus* in eminentia femoris, quae posterius a radice trochanteris maioris deorsum porrecta est, finitur; *medius* vero in latere externo radice trochanteris maiore

s, et *minimus* in interna eius superfice terminantur. Posterius *quadratus* femoris maiori infigitur trochanteri. *soas magnus* et *iliacus internus* trochanteri minori inferuntur. *Linidus* educitur ad lineam a trochantere minori aliquantum deorsum ductam (§. DXCII.). *Caput secundum bicipitis* ab insertione glutaei maximi in media fere longitudine ab aspera linea incipit. *Vastus internus* a tota parte femoris interna ac postica, *externus* ab externa trochanteris maioris parte, nec non tota externa ac postica femoris facie, et *cruralis* ab anteriore tota ossis superficie, proueniunt. *Triceps* ad mediam fere longitudinem, ibique eminentem spinam asperam descendit (§. CCCCLXXXIV.). Ab externo condylo originem ducit *popliteus*; ab inferiore procedit *plantaris*; posterius eundem *gastrocnemius* ex lateribus ossis femoris mox supra condylos oritur.

§. DXCVI.

Quamuis vero femoris ossa probe iuncta sint, saepius tamen franguntur; rarius luxantur. Luxationem in his a causis externis non facile admittunt grauissimi Medici et Chirurghi, sed a internis potius, quando in ischiadi-

Raro contingit femoris luxatio.

cis humor spissus, propter moram ac redditus, ligamentum teres arrodit vel ab humorum destillationibus ligamenta relaxantur et infirmantur, vnde pinguedo ibidem deferri desit, capsula (§. DXC.) inflammatur ac suppuratur. Hinc HIPPOCRATES, *sect. V. aphor. ultimo*, quibus, inquit, a diuturno coxendicis morbo vexatis coxa excidit, *his crus tabescit, et claudicant.* Antecessor, et præceptor honoratissimus B. CASSEBOHMIUS anno MDCCCXXI Argentorati virum secuit subito mortuum, quo, quum per plures annos claudicasset, sedem mali rite intueri posset. Vidit in clune tumorem, separatisque integumentis, musculisque glutaeis, totum caput femoris finitum cum collo femoris, membrana capsulari adhuc constrictum, in superficie externa illi eiusdem lateris impressione circula rem nouamque articulationem fecisse, ligamentum teres ab attritione plane consumptum, totumque fere acetabulum cartilagineum, ac difformi. Extra articuli cavitatem itaque *totum* quamuis raro, in *diuersas partes* exire potest, maxime vero *interius et deorsum* versus foramen ouale. Illud enim ibidem acetabulum depressum maiorque musculorum obseruatur.

bilia

litas. Quod si contigerit malum, pes luxatus altero longior fit; sique eiusmodi claudicantes ambulare possunt, pedem luxatum supra alterum semicirculariter proiiciunt. Quando in anteriorem partem elabatur, pes intus inclinatus, breuior altero, non nisi summis digitis, terram attingit.

§. DXCVII.

Longe facilius autem *fractura colli femoris* accidit, cum spongiosa ceruicis femoris oblique posita (§. DLXXXIX.) fractura, ab innitente mole, et renitente columna, maiori vi cedat. Tunc quidem caput ossis in loco suo manet, pes vero sano breuior et resolutus, supra introrsum et extrorsum cum strepitu verti potest, pars ossis inferior, difficillime reponenda, extra sedem anteriorem ut plurimum a musculis trahitur, nouum sibi successiue parat articulum, eoque efficit, ut eiusmodi homines non super articulum incedant, sed claudicando totum corpus in alterum latus traiciant.

frequentius vero fractura et praecipue circa illius collum.

§. DXCVIII.

Ad extremitatem femoris inferioris adpositum est remotius quoddam hypomochlion, versus quod *genu* extendi

Patella,

tendi potest. Γόνυ significat articulationem femoris cum tibia superius anterius *patella* firmatum : hinc os figura μύλη, *patella*, aliis *rotula*, *scutula*, *forme*, cet. dictum, a Graecis ἐπιγονὴς vocatur.

§. DXCIX.

eius figura,
substantia in
statu perfe-
cto et imper-
fecto,

Est autem *patella* crassum, paruum spongiosum, pendulum ac obsequium os, quod, ratione *figurae* coram formis, latiore basi in mucronem abit, intuitu substantiae spongiosae, post maturitatem ad tempus adhuc cartilagineum manet.

§. DC.

coniunctio,

Anterior et externa ipsius superficies conuexa et aspera, tota a ligamento robustissimo et lato, tibiā cum femore iungente, necitur, atque mediante m. vasto communi quatuor extensorum tibiae tendine, superiori et priori tibiae tuberculo (§. DCIX.) inspecie adhuc affigitur.

§. DCI.

interna superficies, ad articulationem cum osse femoris apte figurata,

Posterior et interna facies inaequalis cartilagine laeuigata, ab intermedia eminentia crassa, obtusa, oblonga, bipartita titur. Latus externum minus, superius

non nihil sinuatum, sed de reliquo le-
ter gibbum, *internum* autem *maius*
rumque concavum est: tota vero
perficies sic apte figurata, vt, vi liga-
enti patellam tibiae iungentis, lon-
gitudine ad latus internum capitulo-
m eorumque interuallum, tanquam
trochleae sinu, moueri possit.

§. DCII.

Vi structurae huius *patella*, genu siue *et usus*.
tenso, siue ad quamcunque partem fle-
o, *obsequiosa* est, *motumque* exer-
t *adscendentem* et *descendentem*. In-
rim robustissimi alias extensores, qui
directo cum tibia positi sunt, nullas
tercere potuissent vires, nisi remo-
us quoddam, quod quam citissime ex-
nsionis et flexionis femoris cum tibia
otibus se accommodat, vtrunque ad-
positum fuisset hypomochlion; et hoc
sum est, quod, notante CELSO, in-
r omnes crurum flexus iuncturam
etur, musculorumque vim auget ac
stinet, quo eo firmitus stare et in-
dere valeamus. *FRACTA* enim *patella*,
enu perpetuo vacillat, quumque sit
ratu difficillima, rigida et expedita
inus redduntur genua, indeque pe-
s oritur infirmitas, insanabilis fere
bilitas, et incommoda gressio.

§. DCIII.

§. DCIII.

*Ambigua
cruris vox.*

A *genu* (§. DXCVIII.) perpendiculariter descendit *crus*. *Vox cruris*, non secus ac cubiti, *ambigua*, vel *bina* et *fistulosa*, inter *genu* et *pedem* extremum sita, vel *maximum* ex his in quibus uis latere peculiariter denotat.

§. DCIV.

Tibia,

In specie *interius*, maius, crassum et fistulosum os, figurae triangularis, quod *magnam* intus pro medulla fouens *cauitatem*, superius femur sustinet, nihil gracilescens deorsum ducitur, inferiusque modice intumescens laxiori motu talo insistit, a figura, ut aiunt tibiarum pastoralium, *tibia*, ab aliis *cile maius*, *canna maior*, Graecis *ῥαβδος*, appellatur.

§. DCV.

ipsius ossificationis et perfectio.

Similiter ac *reliqua fistulosa ossa* *longitudinem increfcit*, fibrae ipsius longitudinales interruptae ex centro extrema porosa diriguntur (TAB. II. FIG. III. n. n. n.), et epiphyseos (TAB. III. FIG. III. p. p.) adhaerent. *Interior tibiae in foetu structura*, in *media caua* (TAB. III. FIG. IV. t.), versus *extrema* (TAB. III. FIG. IV. f.) *reticulata*, nec non in *epiphyseis* (TAB. II. FIG. IV. f.)

FIG.

(G. IV. q. q.) *cartilaginea* et *imper-*
fecta est; progressu aetatis vero post
 ubertatem, perfectis redditis omnibus
 artibus, *scissura* (TAB. III. FIG. III.
 o.), qua antea epiphyses ab ipso
 unco distinguebantur, in totum obli-
 ratur, et tunc quidem *tibia* vtrunque
 unum continuatum os refert, eiusque
 corpus initio *cylindricum*, nunc *angu-*
stum fit.

§. DCVI.

Incipit vero superius crassa, leuiter-
 que capitata, *latiore basi*, quae ab in-
 terposita *bifida quasi eminentia* in duas
 diuiditur *sinuositates* superficiales et
 quatuor, quarum *interior* profundior,
exterior rotundior, *anterior* leuiter ex-
 auata, ac *posterior* conuexa est; *tota*
superficies ossis femoris condylis, eorumque
 differenti magnitudini apte congruit.

Extremitas
tibiae su-
perior.

§. DCVII.

In *cavitatibus* cartilagine opertis, et
 mucilagine illinitis, nec non limbo cra-
 ssiori cartilaginoso obductis, condyli
 ossis femoris articulantur, insimulque
 peculiare, quibus cavitates instruun-
 tur, et quae mobilitatem augent, attin-
 unt cartilagine *semilunares*, *sum-*
me elasticae, inferius conuexas, supe-
 rius

Cartilagi-
num semilu-
narium stru-
ctura, con-
nexio, usus.

rius cauas, vbi ab vtroque tibiae latere ad centrum interius vergunt, magis extenuatas, exteriori superficie prorsus liberas atque solutas, inter se cum vinculo capsulari, et cartilagine supremam partem obducente, colligatas, cornibusque subiectis foueis inplantatas.

§. DCVIII.

*Ligamenta
tibiae cum
femore inn-
gentia.*

Ne vero genu antrorsum, nec in alterutrum latus inflecti possit, ibidem ligamenta valida, neruosa, *cruciformia* posteriorius ab eminentibus tuberculis (§. DCVI.) ad sinum capitulorum ossis femoris posteriorem (§. DXCIV.) procedentia, obstant, et praeter tenuissimum illud *transuersale*, quod ab anteriore extremitate media tibiae parte ad sinum condylorum femoris abit (§. DXCIV.), validum *capsulare vinculum*, totum genu ambiens, articulum tibiae cum femore firmat.

§. DCIX.

*Tibiae truncus, eiusque
in spinas et
latera di-
uisio.*

Tibia a latiori capite, infra quod *exterius tuber magnum*, posteriorius vero *minus*, cartilagine crustatum, eminent, gracilior fit, et versus extremitatem inferiorem nonnihil crassescens (§. DCX.), linea fere perpendiculari

lari descendit. *Latera corporis triangularis* (§. DCVI.) *tribus* distinguuntur *in*. *Anterior* a tubere magno incipit, in medio acutissima, versus extrema euanescit, et sola cute et perioseo tecta est; hinc in contusionibus modum sensibilis. *Interior* crassa et versus medium aspera, obtuse a superiori ad inferiorem procedit extremitatem. *Exterior* inaequalis, acuta et tenuis, lato ligamento interosseo locum et originem praestat. Ab his, bene monente VESALIO, *tria* conficiuntur *latera*; *anterius* conuexum, illo prorsus obtectum musculo, quod Graecis *ηγέα*, et frequentius adhuc *αντινήμιον* vel *προκνήμιον*, *antetibiale*, *protibiale*, nuncupatur; *externum* *παρὰννήμιον* pro musculis sinuatum, et planum (§. DCXII.); et *posterius*, siue *εξοκνήμιον*, quasi tibiae venter, Latinis *crura*, parum sinuatum, validisque multum musculis (§. DCXII.).

§. DCX.

Inferius rursus *tumescit*, atque in *extremum* abit amplum, oblongum, et superficialem, qui cartilagine crustatus, in malleolo interno profundior fit; in reliqua autem parte magis aequalis, *eminentia transuersali*, parum in medio *pro-*

*Extremi-
tas ipsius
inferior.*

protuberante, diuiditur. *Hac* namque *tibia* tali sinuositate, partibus *superioribus* modice *excauatis* gibbosam *extremam* superficiem recipit, et sic quod *superior* *tibiae* *extremitas* sciti-
me cum superiori tali parte co-
gruit.

§. DCXI.

Malleolorum
descriptio et
usus.

Ne vero, ob laxam *tibiae* cum *tibia* mobilitatem, leuioribus ex causis *disiunctio* haec facillime a se inuicem recedere possint; praeter ligamenta capsulae quibus antè, postè, et laterè firmissime iunguntur, duobus re-
tentibus *malleolis*, tanquam repagulis muniantur. *Interior* in adultis ossi co-
tinua est apophysis, crassa, latiori gi-
dens radice, foris gibba, infra sinu-
extrorsum inaequaliter recurvata, et
introrsum ad latus tali obliquo acumi-
ducta. *Exteriorem* capitulum fibulae
inferius constituit (§. DCXVII.), quod
extremitas tibiae inferior, lateraliter
exterius latissima, *transuersim* modè
excauata, cartilagine obducta, recipit.
Sinus hic a dehiscente margine ex-
tremo initio angustus incipit, ac
in ima parte latissimus finitur.

§. DCXII.

§. DCXII.

Praeterea os anterius et inferius cras-
 sum et aequale, posterius autem inae-
 quale, et praecipue pro *tendine tibiaei*
antici profunde et oblique *sinuatum*
 est, aliasque ab extensoribus tam digi-
 torum, quam pollicis, accipit *impres-*
siones; lateribus *musculis* accumbenti-
 bus cedit, et capite superiore diuersos
 recipit fulcitque. Interiori enim et su-
 periori tibiae parti vtriusque *sartorius*,
peroneus, *seminervosus*, et *semimembra-*
nosus inferuntur. *Biceps* ex parte etiam
 in caput tibiae iuxta capitulum fibulae
 intrat. Anterius tuberculo (§. DCIX.)
 insidendo quatuor extensorum tibiae infi-
 nitur hacque insertione patella fir-
 mitur (§. DC.). A superiore et ex-
 teriore parte *tibialis anticus* incipit, et
 ab eadem tam *extensor digitorum com-*
munis, quam *pollicis longus*, intra inte-
 riorem et anteriorem spinam ad exte-
 riorem pedis descendentes, procedunt.
 Superiori et posteriori implantatur *po-*
steus; ab eadem *tibialis posticus*, sub
 splintaei origine *solaus*, extrinsecus
 digitis flexor *pollicis longus*, ad latus au-
 tem internum *profundus* siue *perforans*
 inferuntur.

Quales mu-
sculi a tibia
oriuntur, ei-
demque in-
ferantur?

§. DCXIII.

Fibula,

Gracile os, solidum tamen et fistulosum, ad extremum tibiae latus affans, ipsi quidem crassitie, non vero longitudine cedens, Graecis *περόνη* Latinis *sura* et *fibula* vocatur.

§. DCXIV.

*eius ossificationis
ratio,*

Modus ossificationis eius conuenit cum illo, quem in generatione et perfectione interioris et crassioris ossis (§. DCV.) adnotauimus, exceptis articulationibus, quae tardius cum truncis continuant.

§. DCXV.

*extremitas
superior,*

Superior ipsius extremitas, sursum deorsum oblique acuminata, *exteriori* et *posteriori* gibba ac prominula, *interiori latere sinum* leuem insculptum lubrica incrustatum cartilagine, ostendit, cui laterale tibiae appendicis *ulna* (§. DCIX.) coarticulatur. *Hic* non adeo alte adscendit, ut femur contingat, sed ad partem tibiae *exteriori* rem et *posteriorem* ligamento satis valido religatur, firmissime ibidem coartatur, motuque proprio carens *uni* tibiae sequitur.

§. DCXVI.

§. DCXVI.

A superiori epiphyfi *truncus* debi- *truncus,*
 r, inaequalis, initio teres et graci-
 cens, in medio paullatim crassior,
 retrorsum recurvatus, *triangularem* ac-
 cipit *figuram*, ac, per totam tibiae lon-
 gitudinem descendens, plus minus ab
 ea distat, cum illa tamen ligamento in-
 termedio, quod lineae internae inferi-
 or, iungitur (§. DCIX.). Ratione
curvae, ad instar tibiae, *lineis*, *vna an-*
teriore et acuta, *duabusque posteriori-*
bus, quarum *interior* acuminata, *exte-*
rior vero obtusa est, distinguitur; iis-
 dem autem *latera*, *interius*, *anterius*,
posteriusque, pro musculis, pedem di-
 ctosque mouentibus aptissime locan-
 s, determinantur (§. DCXVIII.).

§. DCXVII.

Dummodo autem versus *infimam* et extremi-
 partem procedit, in sinu tibiae laterali *tas inferior.*
 (§. DCXI.) quiescens, in crassum, in-
 terno malleolo longiorem, oblongum,
 apice obtuso retrorsum ductum, exter-
 neque gibbum, intus sinuosum, et car-
 tilagine politum, vergit processum,
malleolumque externum constituit, qui
 inter externo tali appositus (ine-
 viante ligamento firmissime nequitur,
 et vna cum interno illum amplectitur

(§. DCXI.), ac, in quantum fieri potest, luxationem pedis exteriora verius praecauet, immo etiam tendinibus quibusdam, pedem mouentibus, locum concedit tutissimum; *posterior* enim pars malleoli externa *sinuositas tendines peronei* tam *antici*, quam *postici*, mouet, et ad insertionis loca ducit.

§. DCXVIII.

*Musculi ad
fibulam per-
tinentes.*

Ex *musculis*, a fibula procedentibus, nunc ipsis infixis et accumbentibus, nunciamus *bicipitem*, qui proprie superior et posteriori capituli fibulae parti insertus plantatur (conf. §. DCXII.); *fasciata latam*, in parte eius exteriori et inaequali terminatam; *peronaeum anticum maiorem*, superius et anterius a capitulo ipsius; *minorem*, a medio et anteriori sinuato latere; ac *posticum* a posteriori, prouenientes: immo etiam *extensorem digitorum pollicisque* legum ab interiore pariete; *flexorem proprium longum pollicis* a posteriore incidentes.

§. DCXIX.

Observationes.

Caeterum adhuc *obseruari* meretur.

- I) crura initio mollia adhuc et flexilia, vel in utero materno, vel post natiuitatem, a variis causis interdum

incuruari, et vel genua, vel pedes in articulo tibiae cum tarso, *introrsum*, *extrorsumque* distorqueri;

II) fibulam in quavis aetate a tibia et externo tali latere vi dimoueri posse, et tunc pedem in exteriorem partem protrudi. Vitium hoc *διάσυνσις* vocatur. Pes autem, a recessu malleoli huius dislocatus, secum trahit incessus impedimentum, et ob exquisitum illius sensum, ligamentorum contusionem, tendinumque retro illum quiescentium laesionem, acutissimi dolores, aliaque grauissima mala accidunt.

§. DCXX.

Columnarum infimarum *bases* et *Pes extre-*
ndamenta, quibus lato et stabili ve-
mus.
 glio in terra insistimus, *pedes extre-*
i sunt, *ambo*, iustae et proportiona-
 e magnitudinis. Pes, Graecis $\pi\tilde{\eta}\varsigma$,
 el *late* pro tota extremitate inferiori,
 vel *stricte* pro pede extremo sumi-
 tur; qui, vti manus (§. DXXXVIII.),
 a *trifariam* quoque partem, *tarsum*
imirim, *metatarsum*, et *digitos*, di-
 uiditur.

§. DCXXI.

*Generalis
eius descri-
ptio.*

Est autem *pes extremus* pars ima corporis, ex diuersis flexilibus, non nil incuruatis, certo ordine sibi appositi et dispositis, partim strictiorem, partim laxiorem motum exercentibus composita, scilicet lida, lata, praelonga, initio angusta, in medio latior, et successiue in fine pollicis angustata, posteriorius parum, sed in priora maxime producta, ac, pro stationis incessusque firmitate, tectoque, et ab omni compressione libero seruando vasorum neruorum, tendinumque ad plantam pedis progressu, *inferius concaua, superius in dorso* ipsius, in primis in parte ad alteram tibiam directa, conuexa, hac autem extrorsum et lateraliter ciliis.

§. DCXXII.

*Quibusnam
potissimum
pedis extre-
mi ossibus in
terra insi-
stamus?*

Vi structurae huius, vel quiescentibus, vel motis pedibus, *non tota in pedum superficie* terram premimus, sed *ossibus aequaliter oppositis, ossi calcis posteriorius* producto, supra cuius solam imam partem, sublati metatarso et digitis, incedere etiam valemus, *inferius et interius cuneiformi maximo*, ipsique iuncto magno, crasso, et valenti primo metatarsi ossi, *exterius vero cuneiformi*

armi; atque supra illud *retrosum* du-
ae apophysi; potissimum innitimur.
 interea *solis metatarsi* ossibus, in con-
 iunctione cum digitis, *totam corporis*
viuam sustinere, iisdemque stando,
 ambulando, saliendo, saltando, cur-
 endo, totum corpus supra vnum pe-
 dem in gyrum vertendo, aliisque sub
 actionibus vti quoque possumus.

§. DCXXIII.

Superior, vel posterior pedis pars *tar-* Tarsus.
us vocatur, *seriemque septem ossium*;
 aliter quam in carpo (§.DXL. DXLI.)
 ordinatorum, et magnitudine, figura
 ac vsu differentium, complectitur. Sunt
 autem illa *talus*, *os calcis*, *naviculare*,
tria cuneiformia, et *cuboides*; omnia in-
 ter se adunata, ac validis ligamentis
 constricta, *quaedam* ad tibiā et vtrum-
 que malleolum religata, et *quatuor an-*
teriora in vnam structa seriem, inter se
 coarctata, et cum quinque metatarsi
 ossibus mobilia.

§. DCXXIV.

Omnia foetui diu *cartilaginea*, ad ^{Offificatio}
 crustas vsque cartilagineas, quibus se ^{eius.}
 inuicem aliaque ossa contingunt, *suc-*
cessiue perficiuntur, *spongiosa* intus fiunt,
 et solida lamina externa obducuntur.

Obferuamus inde in embryonibus membranam non nifi cartilagineam (TAB. I. FIG. III. et TAB. II. FIG. I. et II.). Quodlibet autem obfcurum offefcit, et *primum* quidem *aftagalus* et *calcaneus*, excepta epiphyfi in posteriora prominula, nec non *cubiformis*: *reliqua* ferius rigefcunt et in naturam offeam conuertuntur.

§. DCXXV.

Talus.

Tarfi primum, quod tanquam bafis osfibus cruris fubiicitur, cum iisdem extenditur, flectitur, et ad latera mouetur, *talus*, os *baliftae*, Graecis *ἀστρος* et *ἀστέριος* nominatur.

§. DCXXVI.

*Pars eius
superior,*

Pars eius superior fere quadrangulata, anterieus latior, pofterius non nihil anguftata, ad latus vtrumque emittens, in medio finuata, Graecis a forma *τέτραγος*, Latinis quibusdam *quaternio* dicta, aptiffime tibiae finuofitati refpondet (§. DCX.).

§. DCXXVII.

lateralis interna et externa,

Laterata, quibus natura malleolos veluti opices appofuit (§. DCXI.), funt *internum* vel *externum*. Prius minus, quodammodo gibbum, *inferius* finuo-

inuosum et asperum, *posterius*, ob alius descendentem fibulam, amplius, parum sinuatum, et inferius extrorsum productum est. In mobili articulo cum tibia et locis coniunctionis cum malleolis, partes tali laevi cartilagine obductae, ligamentis articularibus, quae ossa tibiae talo colligant, excipiuntur.

§. DCXXVIII.

Anterior astragalus in praelongam *anterior*, obbit *cervicem*, intra latissimam superficiem superioris (§. DCXXVI.) partem excavatam, porosam, et cartilagine crustatam, ad quam sub flexione pedis ad angulum acutissimum capitulum tibiae, malleolo interno oppositum, albidit. *Finitur* autem *capite* oblongo, conuexo, deorsum et introrsum modice vergente, cartilagine polito, quo cum ossis navicularis sinuositate articulatur, et cum illa mediante ligamento, a margine capituli tali ad eminentem navicularis circumferentiam procedente, coarctatur.

§. DCXXIX.

Posterior superficies, minima omnium, *posterior*, inaequalis, superius pro ligamento capsulari (§. DCXXVII.) *fulcata*, inferius pro

pro tendinibus, ad internum calcanei
latus tendentibus (§. DCXLII.), in me-
dio oblique *sinuata*, *introrsum* magis.
extrorsum vero minus *tuberosa* est.

§. DCXXX.

et inferior.

Inferior demum cum calcanei capite
mobilis *sinum* refert *magnum* oblon-
gum, lunatum, a superiori deorsum
et extrorsum oblique excurrentem, car-
tilagine crustatum, atque *processu obli-*
tuso, in priora exporrecto, sinui ossis
calcis insidentem.

§. DCXXXI.

Quaenam
adhuc in in-
feriore cer-
uicis tali
superficie
notanda?

In parte ceruicis inferiore tam *tu-*
berculum ouale, in medio leuiter gib-
bum, cartilagine laeuigatum atque
sinu magno (§. DCXXX.) fulco quo-
dam profundo inaequali et obliquo di-
stinctum, sinum processus calcanei mi-
noris, in priora et inferiora eminentis
(§. DCXXXIII.) recipit, quam parte ca-
pitis oblongi (§. DCXXVIII.) inferiore
a priori tubere *linea transuersali* distin-
cta, ad internum processus anterioris cal-
caniei latus admouetur (§. DCXXXIII.)
vinculisque breuissimis probe firmatur.
Vbi talus haec calcanei loca non attin-
git, in latere ceruicis exteriora versum

lunata

matim excisus, profundam calcanei inuositatem (§. DCXXXV.) auget.

§. DCXXXII.

Alterum tarsi os, priori substratum, *Os calcis*, irregulare, omnium pedis extremi-
 rasissimum et longissimum, a calcane-
 o *calx*, *calcaneus*, *calcar* pedis, Grae-
 is $\pi\lambda\epsilon\gamma\upsilon\alpha$ dictum, pedis fundamen-
 tum est, quo potissimum in terra insisti-
 mus (§. DCXXXII.), cuiusque directione
 (§. DCXXXVI.) praecauetur, ne homo
 in priora pronus vel antrorsum, vel su-
 pinus facile cadat.

§. DCXXXIII.

Ad talum autem firmissime sustinen-
 dum, *superius* in medio *conuexum* et
capitatum est. *Caput* hoc anterieus an-
 gustatum posterius latefcit, et apprime
 inuositati inferioris tali superficiei re-
 spondet (§. DCXXX.). Supra illud in-
 terius ad latus *internum minor* in prio-
 ra protuberat *processus*, qui superficiei
 ouata, parum sinuata, sed plana po-
 tius, *tuberculum ceruicis tali* (§.
 DCXXXI.) recipit.

*Pars eius su-
 perior, su-
 pra quam
 minor pro-
 tuberat pro-
 cessus.*

§. DCXXXIV.

Processus anterior, satis amplus, su-
 pra minorem extrorsum versus in prio-
 ra

*Processus
 calcanei ma-
 ior et an-
 terior.*

ra producitur, ac in superficiem latam planam, in medio et introrsum sinuam, tenui cartilagine crustatam denit, qua posteriori cuboidis superfici coarticulatur (§. DCXLII.); versus internum autem latus *minimo* adhuc gaudeat *tuberculo*, depressio, ouato, tenuissima cartilagine polito, et apte cum inferiore capitis tali parte, ad quam accedit (§. DCXXXI.), conueniente.

§. DCXXXV.

Calcanei sulci atque sinuositas,

Partibus his, tam superiori, quam anterioribus (§. DCXXXIII. DCXXXIV.) interiacent fulci: alter *longior* a sinu calcis, inter partem superiorem capitam et tuber minus, oblique deorsum tendit, et cum alio inaequali, a talum pertinente (§. DCXXXI.), coniunctim *communem* constituit *canalem*; alter *minor* et *transuersalis* inter processum anteriorem, maiorem, ac minorem superius positus est. Bini concurrunt in *sinu profundo*, modice lato in medio superioris superficie coraspicuo, cui e regione tali pars sinuosa exterior et lateralis ceruicis tali respondet, *eundemque* perficit (§. DCXXXI.). *Totus* autem substantia glanduloso-pimpliguedinosa repletur, in qua secretus humor oleosus et mucilaginosus, superficie

es osium irrigat, et ligamenta, qui-
us calcaneus vel cum talo et cuboide,
el talus mediante nauculari cum cu-
biformibus adunatur, humectat, ne
rebrrioribus et validioribus pedis mo-
bus exsiccentur.

§. DCXXXVI.

Retrorsum longa prominens apophysis, eius apophy-
sis retrorsum
prominens,
diuersis in
locis muscu-
los educens
et excipiens
in ima parte latior, posteriore superfi-
cie, cui firmiter *tendo Achillis* omnium
maximus, et *plantaris* tenuissimus, im-
plantantur, aspera, latere externo la-
tor, et ab eminentiis tuberculisque
inaequalis, *musculos* locat hinc inde
procedentes: nimirum ab *antica* facie
versus coniunctionem cum cuboide
extensorem digitorum breuem; prope
articulationem cum talo *extensorem*
breuem pollicis; a parte anteriore et in-
teriore *abductorem digiti minimi*; inter-
o vero sinuato arterias, venas, ner-
uos, ad plantam digitosque pedis pro-
cedentes, admittit, et *abductorem*
pollicis educit. *Inferius massam car-*
neam, et obuia ibidem foiea *flexo-*
rem communem breuem firmat, at-
que priora versus *tuberculo oblongo*,
ligamento lato ac robusto, quod a cal-
caneo margini sinus ossis naucula-
ris inferiori inseritur, et ad cubiforme

os ac metatarsum pertingit, origine sedemque fixam praestat.

§. DCXXXVII.

Os naviculare,

Tertium tarsi os oblongum, a figura naviculare, Graecis σκαφοειδής audit. Posterius profunde excavatum, cartilagine incrustatum, caput tali recipit (§. DCXXVIII.), ligamento valde capsulari cum illo copulatur, ac ligamento, ad talum calcaneumque religatum (§. DCXXXVI.), retinetur. Anteriorius conuexum duabus lineis transversalibus, superius late a se invicem distantibus, inferius coeuntibus, tres diuersae magnitudinis superficiae, anteriorem gibbosam, mediam vero exteriorem magis planas, distinguunt. Superiore inaequali superficie tendineus tibialis antici excipit; exigua extremitatis exterioris portione ad cubiformem accedit; interiore vero liberum est.

§. DCXXXVIII.

Ossa cuneiformia in genere.

Anteriora tarsi ossa, in vnam serie positae (§. DCXXIII.), tria cuneiformia et externum cuboides constituunt. Cuneiformia, Graecis χαλκοειδής, magnitudine in maximum, medium et minimum dispescuntur. Omnia vel se invicem diuersis contingunt superficiibus:

el *anterius* tribus prioribus metatarfi-
 sibus comittuntur; vel *posterioribus* ossis navicularis superficiebus
 (§. DCXXXVII.) ita iunguntur, vt
anteriori maximum, *mediae* minimum,
exteriori directae medium insit.
 se vero e sede facile dimoueri pos-
 unt, in punctis, quibus vel se inuicem,
 vel alia ossa contingunt, cartilaginibus
 uiter crustata, breuissimis arte com-
 muntur ligamentis.

§. DCXXXIX.

Horum maximum, siue *anterius* et in-
teriorius, *posteriorius* angustum, ac, intui-
 gibbosae ossis navicularis superficiei
 (§. DCXXXVII.), *sinuosum* est. *Ante-*
us latissimum exacte congruit cum su-
 perficie capituli posterioris ossis meta-
 rsi pollicis, et exteriora versus, *par-*
laterali breuissima, ad *latus internum*
 pituli posterioris ossis metatarfi se-
 andi admouetur, *reliqua* autem huius
 superficiei portione interno superiori
 longitudinali ossis cuneiformis mi-
 ni applicatur parieti. *Superius* in-
 quale et *gibbum* tendinem tibialis an-
 i insimul firmat, et versus articulum
 um osse metatarfi *intumescens*, obli-
 ue introrsum ac deorsum fertur, *infe-*
us vero *concauum* est.

Cuneiforme
 primum, set
 maximum;

Z §. DCXL.

§. DCXL.

*secundum,
seu mini-
mum,*

*Alterum, minimum, in medio pos-
tum, superius modice latum ac planum
inferius acuminatum, veram cunei figu-
ram exprimit. Anteriore minore su-
perficie posteriori ossis metatarsi se-
cundi extremitati; posteriore, medi-
prioris ossis navicularis superficie
(§. DCXXXVII.); lateribus vero non
totis, sed ex parte tantum, vel inter-
no externo cuneiformis maximi (§.
DCXXXIX.), vel externo interno ter-
tii cuneiformis nequitur (§. DCXLI.).*

§. DCXLI.

*et tertium,
seu medium,*

*Tertium maius secundo, superius la-
tius et planius, deorsum et extrorsum
inclinat, inferius obtuse acuminatum
in medio parum eminens educit flexu-
rem pollicis breuem, interna exigua la-
terali parte externum medii cunei-
formis (§. DCXL.) latus, et extremita-
tem superiorem ossis metatarsi securi
di attingit; externo latere minimam ossi
cubiformis partem suscipit (§. DCXLII.).
anteriorius cum tertio metatarsi osse et
posteriorius cum tertia, extrorsum directa
prioris ossis navicularis superficiei par-
te articulatur (§. DCXXXVII.).*

§. DCXLII.

§. DCXLII.

Quartum anteriorum ossium (§. Os suboides
CXXXVIII.) vltimumque tarfi (§.
CXXIII), κυβοειδές, ad latus externum
riori et maiori calcis processui prae-
positum est, vtpote quem laeuigata,
ta, et in medio gibba superficie exci-
t (§. DCXXXIV.). Anterior oblon-
a ipsius superficies eminente transuer-
ali linea inaequaliter bipartitur: mino-
et internae quartum os metatarsi ad-
licatur; maiori os metatarsi extimu.
internum et inaequale latus ad exter-
um tertii cuneiformis admouetur
§. DCXLI.). Superius os planum ac
extrorsum decliue, exigua angulari
arte posterius et introrsum nauiculari
ungitur (§. DCXXXVII.); inferius de-
um latissimo, crasso, ac oblongo gau-
et tuberculo, et ante illud notabili si-
u. Eminentiae huic tuberosae liga-
mentum a calcaneo procedens (§.
DCXXXVII.), anterieusque tendo tibia-
s postici, inferuntur; in sinu autem
blique ad vltima metatarsi ossa directo
am tendo prioris musculi reflectitur,
uam vagina eius eminenti cuidam
arti ibidem adnascitur.

§. DCXLIII.

Metatarsus.

Pars *altera* et *media*, tarsum inter et digitos posita, Graecis μεταπόδιο vel μετατάτος, Latinis *planta*, *vestigium*, *pecten*, appellatur. Ex quinque componitur *ossibus*, fistulosis, oblongis, crassitie et magnitudine inaequalibus, obsequiosis, aliis iuxta alia positis, singulis digitis respondentibus, se inuicem distantibus, et cratem quam superius gibbam inferius cauam efficiuntibus.

§. DCXLIV.

*Ossificatio
tars.*

Eadem est eorum *ossificationis ratio* quae *ossum metacarpi* (§. DLV.); hinc in tenerioribus embryonibus corporis iam perfecta sunt (TAB. I. FIG. III. et TAB. II. FIG. I. et II.); interea additamenta, initio cartilaginea, circa pubertatis tempus perfecta, cum truncis conflunt, et in apophyses spurias mutantur; citius quidem appendices superiores, tardius inferiores, citissima vero omnium utraque *ossis metatarsi primi*, pollicem sustentantis, *extremitas*

§. DCXLV.

*Capitula ossium meta-
tarsi posterio-
riora,*

Capitula omnium posteriora inaequalia, multiformia, cartilaginibus tenuibus

us crustata, *superius* superficiebus os-
um tarfi, cum quibus articulantur
(§. DCXXXVIII - DCXLII.), *lateribus*
ero *lterioribus, tuberculatis, et sinuatis,*
inuicem contingunt, tamque in his,
quam superioribus partibus, ligamentis
reuisimis continentur.

§. DCXLVI.

Extremitas primi ossis posterior, latif-
na, in similem fere, inferius intror-
um directam, et cuneiformis. primi
perficiei apprime respondentem, ab it
ophysin, qualis superius in basi vlti-
i ossis metatarfi extrorsum ac deorsum
pra cubiforme protuberat, et cui cor-
oris moles multum insistit (§. DCXXII).
eliquorum intermediorum ossium po-
teriora extrema parum a se inuicem
fferunt.

*eorumque in primo et quinto a reliquis differe-
rentia,*

§. DCXLVII.

Ab his ossium metatarfi extrema-
bus *corpora triangularia* antrorsum
endunt, modice *incuruantur* et *gra-*
lescent, in extremis vero rursus tumi-
ula fiunt, ac a secundo ad vltimum
sque anterieus in capitula minora, la-
teraliter depressa, a superiori ad infe-
riorem partem orbiculata, et tenui car-
tila-

*Corpora, et extrema os-
sum meta-
tarfi ante-
riora.*

Z 3

tilagine obducta abeunt, quibus ossa finibus primarum phalangarum mouentur, et, ne a se inuicem recedant, peculiaribus vinculis firmantur, ac in se retinentur. *Pollicis* autem *truncus* crassissimus omnium, reliquis tam paullo breuior, *capite* gaudet *deorsum* magis producto, ibidem in medio *pro* osficulis sesamoideis (§. DCLII) *eminente*, et *lateraliter sinuato*.

§. DCXLVIII.

Quibusnam
musculis ce-
dant, et lo-
cum atque
originem
praebeant?

Omnia haec ossa musculos locant, et *rumque* interstitia ab *interosseis super* *rioribus* seu *externis*, et *inferioribus* siue *internis*, replentur. Ex illis, *com* *extrinsecus* conspiciuntur, *duo* ad *in* *dicem*, *tertius* ad medium digitum, *quartus* ad vltimum, pertinent; *int* *riorum* vero, situ laterali ad pollicem *directorum*, *vnus* est *digiti medii pr* *mus*, *alter* *primus quarti*, et *tert* *quinti primus*. Praeterea *tibialis an* *ticus* et *peronaeus posticus* parti infimae et posteriori ossis metatarsi pollicis *in* *feruntur*. *Peronaeus anticus* protuberanti apophysi ossis metatarsi minimi *digiti* infigitur. Ab eadem quoque *abductor digiti minimi* et *flexor eiusdem* *brevis* proueniunt; *transuersalis super* *extrema* ossium metatarsi anteriora

qua

uartum vsque inferius transuersim in-
edit; a secundo denique et tertio ab-
ductor pollicis oritur.

§. DCXLIX.

Pars pedis extremi tertia et anterior *Digiti pedis.*
complectitur *digitos*, quorum *maximus*
pollex est, reliqui vero sensim minores
sunt, et vel *numero*, vel *situ* distin-
guuntur; hinc *secundus pollicis* *proxi-*
mus, *tertius medius*, *quartus medio pro-*
ximus, et *quintus minimus*, adpellan-
tur. *Quilibet*, excepto pollice (§.
DCLII.), tribus constat ossiculis fistu-
osis, oblongis, superius leuiter gibbis,
inferius sinuosis, quorum idem *ossifica-*
onis modus ac manus (§.DLXVI) ob-
seruatur, (conf. TAB. I. FIG. III.
TAB. II. FIG. I. et II.).

§. DCL.

Vi huius compositionis, in *tres or-* *Horum ar-*
dines et *articulos* diuiduntur, qui vel *ticuli,*
inter se, vel cum capitulis anteriori-
bus ossium metatarfi iunguntur, in ex-
tremis et internodiis cartilagine incru-
stantur, ligamentis arcte comprimun-
tur, et in extremitatibus vnguibus mu-
iuntur.

§. DCLI.

et ratione fi-
gurae ac ar-
ticationis
cum digitis
manuum
conuenien-
tia.

Primi ordinis ossa longissima, secundi breuiora, et tertii breuissima sunt, quorum tamen examini, cum ratione articulationis et figurae in extremis cum digitis manuum, nisi quod breuiora paullulum, conueniant, diutius non immoror, sed id tantum moneo articulos digitorum pedis, ob strictiorem, quem exercent, motum, medios in primis cum anterioribus vel posterioribus etiam ossibus saepissime con- crescere, si vel maxime a causis externis compressi in motu impediuntur.

§. DCLII.

Pollex.

De pollice adhuc notari meretur, ipsum duobus tantum ossibus oblongis crassis, magnitudine inaequalibus, superius conuexis, inferius concavis constare, quorum posterius cum ossi metatarsi pollicis per ἀρθερῶδιαν, et anteriorius cum posteriori ipsius per γλῦμον articulatur, vinculisque probemunitur. Intuitu musculorum, posterius recipit et firmat extensorem breuem proprium, superius extensori longo, et inferius flexori longo stabilitatem dat.

§. DCLIII.

§. DCLIII.

Ubi pollex osi metatarsi committitur, *duo* ut plurimum inueniuntur *ossa sesamoidea*, quae ad infimam posteriorem partem religantur (§. CXLVII.); raro autem in tarso. *Haec* igitur sunt pollicis appendices, et hypomochlia fixa, quibus musculorum ipsis insertorum vis augeatur (§. DLXXVIII.). Infiguntur autem illis *thenar* et *antithenar*, nec non *flexor brevis* pollicis.

Quo in loco
ossa sesamoi-
dea ad pol-
licem reli-
gantur?

§. DCLIV.

Reliquis digitis praeter interosseos *metatarsii* adhuc inferuntur. Etenim *lumbricales* ad interiorum quatuor digitorum superficiem, eorumque primas phalangeas pertingunt; *extensor brevis communis* superius articulis secundis, et *flexor brevis communis* iisdem inferius inferuntur. *Flexor longus* anterioribus inferne, et *extensor longus* mediis articulis superne, implantantur. *Abductor minimi digiti* in superiore primi ossis minimi digiti extremitate, et *flexor brevis eiusdem digiti*, in primo internodio finiuntur.

Quales mu-
sculi digitis
pedum infe-
rantur?

§. DCLV.

Quid de luxationibus et fracturis ossium pedis extremi sentiendum?

Caeterum *luxationes ossium pedis* extremi plus minus periculosae, et curatione difficiles sunt. In primis vero canei et tali *luxationes* maiorem supponunt violentiam, quibus nervi tendinesque, immo vasa ad rapturam usque distenduntur. Pariter quoque *fracturae* et comminutiones ossium pedis non raro lethales sunt, quum, observante iam HIPPOCRATE, collisis partibus tendineo-nervosis et ligamentosis, ruptisque vasculis, *febres peracutae, continuae, tremulae, singultuosae paucorum dierum, mortiferae* denique superuenire soleant. In specie etiam *fracturas* circa malleolos, vel malleolorum a tibia et fibula *solutiones*, graves inflammationes, ulcerosae et sinuosae excauationes, ossiumque caries sequuntur, ac totius pedis oritur immobilitas.



CAPVT VI.

DE

ARTICVLATIONIBVS.

§. DCLVI.

Expositis iam iis , quae ad intelli- Nexus.
gendam miram omnium corpo-
ris humani ossium structuram, et
sceleti, diuino artificio ac singulari
sollertia, ex pluribus mobilibus com-
positi, fabricam pertinent; paucis ad-
huc demonstrandum, *qua ratione ossa*
inter se cohaereant, et ad tot, tamque
mirabiles vniuersales particularesque
praestandos motus, cum firmitate mo-
bilia sint.

§. DCLVII.

Genus articulationum summum est Σύνδεσις
σύνδεσις siue *σύν/αξις*, seu *coniunctio* quid? eius-
ossium inter se. Haec autem uel im- que species.
mediata, uel *mediata* est. Priori casu
dicitur *ἀεθρον*; posteriori *σύνφυσις*.

§. DCLVIII.

Immediata igitur ossium coniunctio ἀε- "Αεθρον est
θρον vocatur (§. antec.); quod quidem vocabulum
vocabulum apud Graecos *ambiguum* ambiguum.
ualde significatum habuit, quum inter
alia per illud uel articulum in genere,
vel

vel in specie ossium commissuram
quae motum edit manifestum, intelli-
xerint,

§. DCLIX.

Huius species

διαρθρωσις

et συνάρ-

θρωσις.

Duae huius, dantur species: Δια-
ρθρωσις et συνάρθρωσις. Διαρθρωσις
perarticulatio, est coniunctio ossium a-
motum edendum diuersimode figu-
rata: συνάρθρωσις, coarticulatio, siue
commissura ossium absque motu, a-
partes intime firmandas artificiose fa-
brefacta et accommodata. Ex his in-
telligitur, nos hic in sensu latiori no-
tione διαρθρώσεως, συνάρθρωσι
tae, celeberr. quorundam Anatomico-
rum auctoritate nixos, uti; quamui-
etiam sint, qui arctiori nimis significa-
tu διαρθρωσιν per articulationem cum
motu distincto, quibusdam tantum
ipsius speciebus competente, expli-
cent.

§. DCLX.

Διαρθρω-

σις plani-

formis et or-

bicularis

quid?

Διαρθρωσις igitur est articulatio ac-
motum edendum apta (§. DCLIX.)
In illa autem considerare possumus
uel figuram ossium coniunctorum, uel
motum, ad quem edendum apta est.
Si figuram ossium spectamus, uel ossi-
coniuncta superficiem fere planam ha-
bent

ent, vel non. *Priori casu διάρθρωσις planiformis; posteriori διάρθρωσις orbicularis dicitur.*

§. DCLXI.

In διάρθρωσι orbiculari ossa coniuncta superficiem planam non habent (§. *Species διάρθρωσεως orbicularis.* praeced.); hinc coniunctio talis esse debet, vt, vi oppositorum, caput unius ossis cavitati alterius iungatur. Vel igitur caput magnum profundae cavitati iungitur, vel non adeo magnum. *prius ἐνάρθρωσις; si posterius ἀρθρωδία vocatur.*

§. DCLXII.

Itaque διάρθρωσις ratione figurae considerata vel planiformis, vel orbicularis; haecque iterum vel ἐνάρθρωσις vel ἀρθρωδία est (§. DCLX. DCLXI.). Ad διάρθρωσιν planiformem pertinent: connectiones vertebrarum inter se, quoque processus obliquos (§. CCCCIV. CCCCXVII.); processuum obliquos descendantium ultimae lumborum cum adscendentibus primae ossis sacri (§. CCCCXVII.), et decliuium ultimae sacri cum accliuibus primae iliacis (§. CCCCXXV.); clauiculae cum duobus processibus scapulae (§. CCCCXVI. DIV.) et costa prima (DIV.):

(*DIII.*); ossum carpi inter se (*DLIII-DXLVI. §. DXLVIII-DLI.*) exceptis nauiculari et lunato cum capitato (*§. DL.*); nec non ossum metacarpi tam cum ossibus carpi (*§. DLVI-DLVIII.*), quam inter se inuicem (*§. DLXI.*); phalangae primae pollicis qua ad latus internum secundi metacarpi digiti superius adinouetur (*§. DLXXIV.*); malleoli interni cum interno tali latere (*§. DCXI.*); extremitatis fibulae superioris cum tibia (*DCXV.*) et inferioris cum latere tali externo (*§. DCXVII.*); ceruicis talii eiusque capituli partis inferioris cum processibus calcanei (*§. DCXXXI.*) calcanei cum cuboide (*§. DCXXXIV.*) ossum trium cuneiformium inter se secundi tertiique cum media ac exterioriore ossis nauicularis superficie, et tertium cum latere interno cubiformi (*§. DCXXXVIII.*), metatarsi tam cum anterioribus tarso ossibus, quam inter se inuicem (*§. DCXLV.*).

§. DCLXIII.

Ἐνάρθρως
quid?

Ἐνάρθρως est species διαρθρώσεως orbicularis (*§. DCLXI. DCLXII.*); fe-
talis, qua caput magnum profundae ca-
uitati iungitur, seu, vt cum Graeco
loquar, κοτύλη κεφάλαιον suscipit. *He*

in

unicum exemplum articulatio fe-
oris cum coxa exhibet (§. CDLXXX.).

§. DCLXIV.

Ἀρθρώδια est cospecies cum ἐναρθρώ- Continuatio
(§. DCLXI. DCLXII.). Hac caput
on adeo magnum cavitati iungitur (§§.
tt). Articulantur autem hoc modo:
caput humeri cum superficiali scapulae
cavitate (§. CCCCXCIV.); condyli ma-
illae inferioris cum cavitatibus tem-
orum (§. CCCXXXVI.); clauicula
um sterno (§. DIII.); radius cum ca-
itulo humeri externo (§. DXXVIII.),
el cum prima ossium carpi serie (§.
DXXXII.); prima digitorum manus
ternodia cum ossibus metacarpi (§.
DLXIX.); priores digitorum pedis ar-
culi cum ossibus metatarfi (§.
DCLVII.); prima phalanga pollicis
manus cum secunda (§. DLXXIV.
DLXXV.); articulus primus pollicis
edis cum osse primo metatarfi (§.
DCLII.).

§. DCLXV.

Quodsi autem διαρθρώσειν *ratione mo-* Διαρθρώσεως
laxa et stri-
cta quid?
us consideremus, ad quem edendum
coniunctio haec apta est (§. DCLX.);
unc uel motus fieri potest *distincte*,
el *non*. Priori casu nominatur διαρ-
θρώσεως

ῥεωσις laxa; posteriori vero διάῤῥεωσις stricta.

§. DCLXVI.

Διάῤῥεωσις planiformis est stricta; orbicularis vero vel laxa vel stricta,

Διάῤῥεωσις planiformis est διάῤῥεωσις stricta; orbicularis vero vel laxa, vel stricta esse potest. Etenim διάῤῥεωσις planiformis est coniunctio ossium, quae superficiem fere planam habent (§. DCLX.): ergo fieri nequit, ut ossa hoc modo coniuncta distincte moueantur; adeoque exhibet saltim διάῤῥεωσιν strictam (§. DCLXV.). Quum uero in διάῤῥεωσι orbiculari ossa non habeant superficiem planam, sed caput unius cavitati alterius ossis iunctum sit (§. DCLX.); fieri poterit, ut ossa uel distincte vel obscure tantum moueantur; adeoque διάῤῥεωσις orbicularis poterit esse vel laxa, vel stricta (§. DCLXV.).

§. DCLXVII.

quod ad ἐνάῤῥεωσιν et ἀῤῥεωδίαν applicatur.

Ἐνάῤῥεωσις et ἀῤῥεωδία sunt species διάῤῥεώσεως orbicularis (§. DCLX.); ergo utraque poterit esse vel laxa vel stricta (§. DCLXVI.).

§. DCLXVIII.

Exempla de διάῤῥεωσι orbiculari stricta.

In διάῤῥεωσι orbiculari stricta tam figura ossium, quam motus determinatur.

tu

ur (§. DCLXV). Nimirum ratione
figuræ requiritur, vt vnum os capita-
 um sit, atque cavitati alterius iunga-
 ur (§. DCLX. DCLXI.): ratione
motus autem ita determinatum est, vt
 motus non nisi obscure fieri possit (§.
 DCLXV.). Hac ratione vero copu-
 antur: capitulum mallei cum incude
 (§. CLXXXVII.), et orbiculare cum
 incude et stapede (§. CLXXXVIII.);
 os occipitis cum atlante (§. CXXXV.);
 capitula costarum cum vertebrais dorsi
 (§. CCCCLXI.); nauculare et lunatum
 cum capitato (§. DL.); talus cum cal-
 caneo (§. DCXXX.) ac nauculari (§.
 DCXXXVIII.); cuneiforme maxi-
 mum cum nauculari (§. DCXXXVII-
 DCXXXIX.).

§. DCLXIX.

In διαρθρωσι *laxa* ossa coniun- γίγγλυμος
 ta ad motum distinctum produ- quid?
 cendum apta sunt (§. DCLXV.).
 Vel igitur tantum flexioni et extensio-
 ni inferuiunt, vel non. Priori casu vel
 plures eminentiæ pluribus cavitatibus
 iunguntur, vel non. Si *prius*, coniun-
 ctio ossium dicitur γίγγλυμος. Est ita-
 que γίγγλυμος διαρθρωσις *laxa*, qua
 plures eminentiæ pluribus cavitatibus
 iunguntur, vt ossa tantum flexioni

*et extensioni inseruire possint. Emi-
nentiae hae, cavitatibus iunctae, simi-
litudinem habent cum figura ossium
in ἀρθρώδια, quippe qua caput non
adeo magnum cavitati iungitur (§.
DCLXI.); hinc γίγγλυμος etiam duple-
alterna, vel reciproca ἀρθρώδια vocari
solet.*

§. DCLXX.

*Exempla
huc perti-
nentia.*

*In γίγγλυμῳ ossa tantum extensioni
et flexioni inseruiunt (§. DCLXIX.)
si itaque mouentur, vel extendendo
vel flectendo moueri debent. Prior
casu ossa in lineam rectam exporrigun-
tur; posteriori pro diuersa flexione an-
gulum efficiunt, vel rectum, vel obli-
quum. Sic copulantur: vlna cum hu-
mero (§. DXXI.); secunda et tertia
internodia tam digitorum manus (§.
DLXX - DLXXIV.), quam quatuor
pedis (§. DCLI.); articulus primus pol-
licis manus cum multangulo maiori (§.
DLXXIV.), et os metacarpi, quod
digitum minimum sustentat, cum ha-
mato (§. DLIX.); phalanga prima pol-
licis pedis cum secunda (§. DCLII.);
tibia cum femore (§. DCVI. DCVII.);
patella cum osse femoris (§. DCL.);
talus cum tibia (§. DCX.).*

§. DCLXXI.

§. DCLXXI.

Praeter enumeratas species adhuc *Τροχοειδής* *ad διάρθρωσιν* refertur *Τροχοειδής*, quae *quid?* talis ossium coniunctio est, qua os vnum circa alterum, ceu rota circa axin, moueri potest. Differt ergo, prouti motus rotatorius diuersus est. Hic autem talis est, vt os se circa alterum mouens integrum circulum, vel saltem partem circuli describat. Priori casu dicitur *rotatio perfecta*: posteriori *rotatio imperfecta*.

§. DCLXXII.

In *Τροχοειδῇ* os vnum circa alterum, *pertinet ad* ceu rota circa axin, moueri potest (§. *διάρθρωσιν* DCLXXI.); consequenter ad motum *orbicularem* distincte edendum apta est; atque *ratione figurae,* *pertinet ad διάρθρωσιν* (§. DCLIX). Quum autem in illa os vnum circa alterum, ceu rota circa axin, moueri possit (§. DCLXXI.), et eiusmodi motus fieri nequeat, si ossa superficiem planam habent (per experientiam); *Τροχοειδής* non poterit ad *διάρθρωσιν* planiformem referri (§. DCLX.); ergo *ratione figurae* *pertinet ad διάρθρωσιν orbicularem* (§. cit.).

§. DCLXXIII.

*ratione mo-
tus autem ad
διάρθρωσιν
laxam.*

Τροχαιδὴς ad eiusmodi motum ro-
tatorium apta est, quo os vnum circ-
alterum se mouens integrum circulum
describit (§. DCLXXI.). Si autem
os vnum circa alterum se mouendo in-
tegrum circulum describere ualet, mo-
tus etiam illius distincte fieri potest
(per definit. circuli.). Quam ob rem
cum διάρθρωσις, qua motus distincte
fieri potest, διάρθρωσις laxa dicatur (§.
DCLXV.); sequitur, Τροχαιδὴν perfe-
ctam et imperfectam ratione motus perti-
nere ad διάρθρωσιν laxam. Ad Τροχαι-
δὴν perfectam itaque referuntur articula-
tiones, quae per ἀρθρωδίαν fiunt (§.
DCLXIV.); ad imperfectam autem
potissimum versio atlantis circa axim
epistrophei (§. CCCXCVIII.), et
supinatio ac pronatio manus (§.
DXXVII.). Etenim in pronatione bra-
chium torquetur, et immobilis manet
vlnae in duobus extremis articulatio;
radius autem introrsum vel in condy-
lo externo, vel super lateraliter sinua-
tam apophysin arcuatim flectitur. Si-
milis, priori tamen contraria, et ex-
trorsum vergens, accidit in supina-
tione.

§. DCLXXIV.

§. DCLXXIV.

Haec quidem de diuersis διαρθρώ- *Species de*
 ρως speciebus. Iam ad alteram imme- *συνάρθρωσι,*
harmonia,
γόμφοσι et
futura, euol-
uuntur.
 liatae ossium coniunctionis speciem συν-
 άρθρωσιw progredimur (vid. §. DCLIX.);
 quae erat immediata ossium coniunctio
 ad motum edendum haud apta (§. cit.).
 Hac igitur ossa ita coniuncta sunt, vt ea
 vel linea recta intercedat, vel non. Si
 prius, harmonia vocatur: sin poste-
 rius, vel vnum os alterius cavitati iun-
 gitur tanquam cuneus, vel ita, vt linea
 dentata illa intercedat. Priori casu
 γόμφοσις, conclauatio; posteriori παφῆ,
 futura, appellatur.

§. DCLXXV.

Est itaque harmonia coniunctio ossium
 immediata absque motu talis, vt linea *Harmonia*
etiam ad
futuras spu-
rias refertur.
 recta ossa intercedat, qualis apparet in
 coniunctione ossium faciei inter se, et
 in quibusdam cranii (§. CCLVIII.).
 Quum vero eiusmodi linea, quae ossa
 in harmonia intercedit, vt plurimum ad
 sensum tantum recta sit; harmonia
 etiam in latiori ambitu ad futuras spu-
 rias referri poterit (§. CCLVIII.).

§. DCLXXVI.

*Exempla de
γάμφωσι.*

Γάμφωσις est coniunctio ossium imm-
ediata absque motu, qua vnum os alte-
rius cavitati tanquam cuneus iungitur
(§. DCLXXIV.). Hoc modo dentes
omnes alueolis (§. CCCXXXIII.), et
portiones pterygoideae ossium palati
foueis quibusdam ossium maxillae su-
perioris proprie sic dictorum, in-
guntur (§. CCLXXXIII.).

§. DCLXXVII.

*Sutura vera
et spuria
quid?*

Sutura tandem immediata vocatur
ossium coniunctio absque motu, talis, v-
elut linea dentata ossa intercedat (
DCLXXIV.). hinc partes ossium con-
iunctae ipsae dentatae esse debent. Den-
tes autem ossium vel omnes alternati-
ue complicati sunt, vel non : prior
casu *sutura vera*; posteriori *spuria* di-
citur. (§. CCLV.). Ad veras igitur
pertinent: *coronalis, sagittalis, lam-*
doides. *Prima* vnitur os frontis cum
ossibus bregmatis (§. CV.); *altera* os
sagittale bregmatis inter se (§. CXXVI.).
tertia os occipitis cum ossibus bregma-
tis (§. CXXXVI.). *Spuriis* adnum-
rantur squamosae ossium conglutina-
tiones (§. CCLVII.), quales v.g. in con-
iunctione ossium squamosorum cum
ossibus bregmatis etc. (§. cit.) conspici-
untur.

iuntur; nec non sic dictae *suturae communes* (§. CCLVIII.).

§. DCLXXVIII.

Ossium *coniunctio mediata* σύμφυσις *Σύμφυσις*
audet (§. DCLVII.). *Mediate* autem *quotuplex?*
ossa aliter in *statu perfecto*, aliter in
imperfecto iunguntur. In *priori* aut
per *ligamenta*, aut per *musculos*, aut
per *cartilagines*, aut per *tendines*: in
posteriori tam hoc *quadruplici modo*,
quam *membrana* etiam, vel *ossa ipsa*,
vel eorum *partes* colligante.

§. DCLXXIX.

Coniunctio ossium per ligamenta (§. συνδέσμων
DCLXXVIII.) proprie dicitur συνδέσ- *ως τίς quid?*
ωσις, alias etiam συνεύρωσις; sed non
tatis congrue. Quamuis enim liga-
menta naturam habeant tendineo-ner-
ueam; nervi tamen proprie non sunt.
Ligamenta autem, quibus disloca-
tio ossium praecauetur, vel totum
ossium articulum ambiunt, vel ossa in
quibusdam tantum punctis iungunt;
hinc συνδέσμωνωσις vel *totalis* vel *par-*
tialis est. Ad *priorem* omnia pertinent
ligamenta capsularia et articularia, la-
xa, stricta, plus minus robusta,
elastica, plana, expansa, immo etiam
productiones eorum, quae cartilagi-

nes mobiles in quibusdam articulis a
 ossa religant, quemadmodum lamellae
 cartilagineae maxillae inferioris interia
 cet articulo (§. CCCXXXVI.), et femi
 lunares cartilagineae tibiae femorisque
 iuncturae interpositae sunt (§. DCVII.)
 ad *posterio*rem vero: interarticularia, annu
 laria, femiannularia, rotunda, plana
 na, cruciformia, transuersalia, suspens
 foria, graciliora, lata, crassa, inteross
 fea, ceruicalia, obturatoria, interspi
 nalia, ischiadico-sacra etc. ratione
 figurae, structurae, ac ossium, quae
 iungunt, et quibus inferuntur, di
 uersa.

§. DCLXXX.

Συσσάγκω-
 σις quid?

Nexus ossium per musculos (§. DCLXXVIII.) συσσάγκωσις nuncu
 patur. Per hanc variis ossibus com
 mittuntur scapulae (§. CCCCLXXXVIII.)
 os hyoides, per ligamenta et musculos
 laryngi insimul nexum (§. CCCLXIX.)
 et denique larynx (§. cit.).

§. DCLXXXI.

Συνχόνδεα-
 σις quid?

Iunctura ossium per cartilagineas συν
 χόνδεωσις (§. DCLXXVIII.) vocatur.
 Hanc videmus in coniunctione uerte
 brarum omnium inter se quoad corpora
 ra (§. CCCCLXXXVII.), excepta primi
 co

colli cum osse occipitis (§. DCLXVIII.);
 ultimae lumborum cum osse sacro (§.
 CCCCXXV.); sacri cum coccyge (§.
 CCCCXXXI.) et innominatis (§.
 CCCCLXXI.); ossium pubis inter se (§.
 CCCCLXVIII.); costarum cum sterno
 (§. CCCCLX.). *In statu autem ossium
 imperfecto (§. DCLXXVIII.), quo ossa
 generantur et perficiuntur, eandem
 obseruamus in cohaesione ossium squa-
 mosorum cum petrosis (§. CLII.);
 partium lateralium ossis sphenoidalis
 cum ipsius corpore (§. CCXXIII.);
 portionum, ex quibus uertebrae con-
 stant, exceptis colli, in plures diui-
 duis (CCCLXXXIII. CCCLXXXIV);
 vertebrarum tam ossis sacri (§.
 CCCCXXIII.), quam coccygis (§.
 CCCCXXX.) compositarum; frusto-
 rum, quae sternum conficiunt (§.
 CCCCLII.); ilium cum pubis et
 coxarum ossibus (§. CCCCLXVII.);
 corporis ossis hyoidis cum ipsius cor-
 nibus (§. CCCLXVII. CCCLXVIII.).*

§. DCLXXXII.

*Vnio ossium per tendines (§. Συνένωσις
 DCLXXVIII.) est συνένωσις. Hoc quid?*
 modo patella, per συνδέσμων cum fe-
 more et tibia copulata (§. DCVIII.),

tibiae tuberculo in specie affigitur (§. DC.), et ossa sesamoidea in manibus (§. DLXXVII. DLXXIX. DLXXX. pedibusque (§. DCLIII.), ad articulos quosdam religantur.

§. DCLXXXIII.

*συνόμεναις
quid?*

Cohaesio ossium in statu imperfecto per membranas (§. DCLXXVIII.) in specie dicenda συνόμεναις. Haec obtinet in coniunctione ossium cranii, ob defectum futurarum verarum inque caeteris omnibus futuris spuriiis (§. CCLX.) nec non partium maxillae inferioris inter se (§. CCCXXXII.): quo etiam sensu arctiori referri a quibusdam solet immediata ossium per futuras coniunctio (§. DCLXXVII.), quatenus illa obscura periostei membrana futuras perreptante, quasi vnita videntur. Porro appendices omnes lateribus extremitatibusque ossium hoc modo adnascuntur (§. LXXXVII.), quaecumque ipsis veluti per γόμφωσιν cohaerent (§. LXXXVIII.), et non satis commode a quibusdam συνχόνθωσιν adnumerantur. Huc denique pertinent quatuor ossis occipitis (§. CXXXI.), duae ossis frontis (§. CVII.), et tres ossis temporum (§. CXLVIII.)

EXLVIII.) partes, quae in quolibet, interveniente externa durae matris lamenella tam diu uniuntur, donec portiones cuiusvis successive inter se coalescentes, ossa continua constituent.

§. DCLXXXIV.

Ex his itaque *articulationis et conjunctionis ratio* probe intelligitur, quae satis superque demonstrat, *corpus nostrum* non lapideae cuiusdam statuae modo *os unicum continuatum*, sed ex plurimis, diuersis, obsequiosis, sibi inuicem adaptatis ossibus esse compositum. Omnia autem clariora fient, si tam in *exsiccatis ac praeparatis*, quam *recentibus ossibus* eorum ostendatur σύνθεσις, et in his ea insimul, quae ad articulationem requiruntur, v. g. *ligamenta, cartilagines, membranae, intermedius unctuosus liquor, ac ipsa substantia glanduloso-pinguedinosa*, ex qua humor articularis separatur, ad examen anatomicum reuocentur, et sic quidem hisce exercitationibus exoptatus
imponatur

F I N I S.

E M E N D A N D A.

§. 25. lin. 15. lege *ipsemet*. §. 38. l. 11. *qua*
 §. 68. l. 9. *proprium*. l. 12. *zygomatiko*. §. 7
 l. 1. *quam*. §. 95. l. 7. *symphysi*. §. 97. l.
acuminatum. §. 98. l. 12. *acuminantur*. §. 12
 l. 3. *membranacea*. §. 128. l. 20. *semicanaler*
 §. 153. l. 3. *αιδοειδές*. §. 234. l. 15. *carotides*
 §. 237. l. 12. *qui*. §. 240. l. 7. *vulnus*. §. 25
 l. 7. *lambdiformis*. §. 258. l. 3. *illarum*. §. 31
 l. 5. *reddente*. §. 328. l. 6. *mammillares*. §. 34
 l. penult. lege: *biuenter inseritur, ibidemque*
tubere aspero genioboyoides et genioglossus oriun
tur. §. 347. l. 18. *hebetior*. §. 361. l. 2. *cor*
ferre. §. 405. l. vlt. *ipsumque*. §. 454. l. :
embryone. §. 497. l. 15. *del. ambae*. l. 16. *po*
folet; adde: *ambae*. §. 505. l. 5. *coracoidea*
 §. 523. l. 6. *supinationis*. §. 540. l. 6. *atque*
 §. 627. l. 2. *obices*. §. 648. l. penult. *adductor*
 In expl. Tabb. Tab. I. Fig. II. l. 13. et Fig. V
 l. 5. Tab. IV. Fig. VII. lin. 1. et penult.
sphenoidale.


TABV.

TABULA

omnes συνδέσεις ossium species complectens.

ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΟΣΣΙΩΝ (§. 657.)

est
Coniunctio ossium inter se





INDEX.

NUMERI INDICANT PARAGRAPHS.

A.

Abductor indicis manus,
muscle. origo 562. in-
sertio 580.

minimi digiti ma-
nus, muscle. origo 553.
insertio 580.

- - pedis, muscle. ori-
go 636. insertio 654.

pollicis manus muscle.
origo 553. insert. 580.

- - pedis, muscle. origo
636. 648. insert. 653.

Efforrii Stenonis, muscle.
463.

Tabulum: eius structura
et usus 480. minor ca-
vitas in ima parte 481.

Abductor minimi digiti ma-
nus, muscle. origo 553.

62. insert. 580.

Adductor pollicis manus,
muscle. vid. *abductor* in-
dicis manus.

- - pedis, muscle. origo
648. insert. 653.

Aegilops, morbus, 250.

Ἀκρωμίων, vid. summus hu-
merus.

Alveoli dentium superiores
269.

- - interiores 333.
334.

Anatomica ossium contem-
platio 38.

Anconaeus, muscle. origo
516. insert. 526.

Ancylosis carpi 552.

Annuentes Cowperi muscle.
vid. recti antici minores.

Annularis cartilago 374.

Annu-

I N D E X.

- Annulus* 160. eius diu-
 sio 161. superficies 162.
 163. circumferentia ful-
 cata 161.
- Antibypotherar* minimi di-
 giti manus, vid. adduc-
 tor eiusdem.
- Antithenar* pollicis manus,
 musc. origo 562. in-
 fert. 580.
- - pedis, musc. vid.
 adductor eiusdem.
- Antrum* Highmori 261.
 271.
- Apophysis* 82. 83. eius sy-
 nonyma 84. diuisio 85.
 vsus 86.
- Aquaeductus Fallopii* 198.
 205. eius principium
 et directio 206. perio-
 steum 207. orificium
 pro musculo stapedis
 177. extremitas infe-
 rior s. foramen stylo
 mastoideum 198. exi-
 tus 155.
- * *Ἀεθῶδία* quid? 661. 664.
- * *Ἀεθῶν* quid? 658. eius
 species 659.
- Ary-arythaenoides* musc.
 377.
- Ary-epiglottaeus* musc. ori-
 go et insert. 377.
- Arythaenoides* musc. 377.
- * *Ἀρεάγᾱλος* vid. talus.
- Atlas* 394. eius processus
 395 - 397. connexio
 395.
- Auditus* quid? 216. quomodo
 fiat 214 sqq. eius
 organa 181. officium
 181. 182. 187 - 191.
 musculi 192. post ste-
 nutationem acutior 1
 217. ex consensu auris
 internae et externae de-
 monstrandus 211. de au-
 ditu observationes 220.
- Auris* externae structura et
 vsus 212.
- Aurium* sensibilitas 220.
 n. 111.
- Axis* vid. epistropheus.
- Azygos* musc. 288.
- B.
- B**asilare os vid. sphenoi-
 dale os.
- Biceps*, flexor cubiti musc.
 origo 499. 516. insert.
 535.
- flexor tibiae musc. origo
 484. 595. insert. 612. 618.
- Biunter* musc. origo 221.
 insert. 342. 370.
- Brachiaeus externus*, musc.
 origo 516. insert. 526.
- *internus*, musc. origo
 516. insert. 526.
- Brachiale*, vid. carpus.
- Brachium* 509.
- Bracteae* osseae, vid. lami-
 nae osseae.
- Bregmatis ossa* 101. 121.
 eorum magnitudo, cras-
 sities et ossificatio 122.
 mar-

I N D E X.

margines, anguli et connexio 126. superficies 127. 128. obseruationes de illis 129.
accinator musc. origo 239. 279. 342.

C.

calua f. *caluaria* 104.
caluariae regiones 102.
calcaneus f. calcis os 623. 624. - 633. eius processus 633. 634. fulcrumque sinus 635. apophysis retrorsum emittens 636. musculi ib.
canales pro neruorum cervicalium egressu, et vertebrarum vertebrarum aduentu 409.
semicirculares 198.
 eorum diuisio et foramina 200.
canalis Fallopii, vid. aquae ductus Fallopii.
canalis osseus infra radices dentium 340.
 pro carotidibus et neruis intercostalibus 155. 158. 330.
 - chorda tympani 178.
 - medulla spinali 381. 426. seq.
 - musculo mallei interno 175.
caninus musc. origo 279.
caninum os 541. 542. 550.

Caput sceleti 96. eius diuersa figura 97. fabrica eiusque vsus 98. 99.

Carpus 539. eius articulatio ibid. ossicula, ex quibus componitur 540. sqq. horum ossificatio, coniunctio et immobilitatis causae 542. 552. musculi ad carpum pertinentes 553.

Cartilagine quid? 9. cur ossibus sint flexiliores 10. aemulantur ossa imperfecta 11. earum vsus ib.
 - semilunares 607.

Casserii musculus 193.

Caudae os, vid. *coccygis os*.

Cavitates ossium internae et externae 74. 75.

- articulationum causae factae quotuplices 76.

Cephalo-pharyngaens, musc. origo 143.

Cerato-basio-glossus, musc. origo 370.

Cerebri receptaculum 251. bipartitur a processu faliformi 252.

Cervicalis descendens *Diemerbr.* musc. origo 433.

Chemica ossium consideratio 37.

Chorda tympani eiusque directio et vsus 191.

Clauiculae 501. earum ossificatio 502. extremitates 503. 504. corpora 505.

I N D E X.

- ra 505. vsus 506. musculi 507. fractura et luxatio 508.
Claviculi ex mente Gagliardi 44.
Clinoides processus 225.
Coccygæus musc. 431.
Coccygis os 429. eius compositio et ossificatio 430. coniunctio et vsus 431.
Cochlea 198. eius ossificatio 180. structura situs et figura 201. compositio 202.
Coecum foramen 115. 329.
Complexus musc. origo 433. insert. 143.
Conclauatio, vid. γόμφωσις.
Coraco - brachiaens musc. origo 499. insert. 516.
 - *hyoides musc.* origo 499. insert. 370.
Coracoides processus 495.
Coronale os, vid. frontis os.
Coronalis sutura 256. 677.
Corporis humani partes solidæ 1. earum diuisio 2. soliditatis ratio 4.
Corpus ossis, vid. Διάφωσις.
Costæ 450. earum utilitas et necessitas 451. motus sub respiratione 452. ossificatio 454. numerus et diuisio 454. 455. longitudo 456. corpora 457. margines, collum, anguli 458. fulci 459. extremitates 460. 461. musculi 463. mala conformatio, distortio, fractura, luxatio 464. 465. mero interdum variat ibid.
Cotyla, cotyle 76.
Coxarum ossa, vid. innominata ossa.
 - - proprie sic dicta vid. ischia ossa.
Cranii ossa 101. eorum dispositio 98. diuisio 103. coniunctio 2.
Cranium 100. eius structura 104. fundus 105. plex 253. 254. foramina 327-330.
Cribiforme os 101. 2. eius substantia 243. uisio 244. partes 245. vsus 248. foramina 249. ozaena corruptum diuicillime curatur 250.
Crico - arythænoides laryngalis, musc. 377.
 - - posticus, ibid.
 - - superior, vid. arythænoides.
Crico - pharyngæus musc. 377.
 - *thyreoides musc.* origo et insert. 377.
Crista galli 244.
Cristatum os, vid. cribiforme.
Crotaphites musc. vid. temporalis musc.

I N D E X.

Cruciformia ligamenta 608.
Cruralis musc. origo 595.
Crus 603. *crurum* incur-
 uatio et distortio 619.
Cubitus 518. 519. eius lu-
 xatio 536.
Cuboides os 623. 642.
Cuneiforme os cranii, vid.
Sphenoidale.
 - manus, vid. tri-
 quetrum.
Cuneiformia ossa pedis 623.
 638 sqq.

D.

Deltoides, musc. origo
 499. 507. insert. 516.
Dentes 344. eorum figura,
 color, coniunctio 345.
 numerus, sedes, dispo-
 sitio, proportio 346. ma-
 gnitudo, incrementum,
 decrementum 347. sub-
 stantia 348. materia ex
 qua, generatio, regenera-
 tio 349. eruptio 350.
 364. casus, renouatio 351.
 diuisio 354. vsus 360.
 361. affectiones 363.
 pars eorum sensibilis
 353. euulsio 365.
 - *canini* 375. eorum
 vsus 360.
 - *incisores* 354. eorum
 vsus 361.
 - *molares* 356. eorum
 structura 357-359. vsus
 360. cur plures sint ho-

minibus, quam ceteris
 animalibus 346. rarius
 post secundorum casum
 renascuntur 352.

Dentes oculares 355.

- praeternaturaliter con-
 stituti 362.

- sapientiae 352.

Dentiformis processus 404.

Depressor alarum nasi, musc.
 origo 279.

- palpebrae inferioris,
 musc. origo 279.

Diaphragma 647.

Διάφραγμα 659. eius spe-
 cies ibid. sqq.

- *laxa* 665.

- *orbicularis* 660. sqq.
 laxa et stricta est 666.
 668.

- *planiformis* 660.

- *stricta* 665.

Διάσασις 619.

Διάφωσις 38.

Digastricus musc. vid. bi-
 uenter.

Digitimanuum 564. eorum
 numerus, nomina, com-
 positio 565. composi-
 tionis ratio 568. ossifi-
 catio 566. magnitudo,
 ordo, dispositio 567.
 articuli 569-571. vsus
 572. musculi 580.

- pedum 649. eorum os-
 sificatio ibid. articuli
 650. conuenientia cum
 digitis manuum 651.

Bb

Diploe

I N D E X.

Diploe, vid. *meditullium*.

Dorsum manus 560.

- *pedis* 621.

Ductus Alcmeonis, vid. *tuba Eustachii*.

E.

E*lenator* auris, musc. 221.

- *labii inferioris* Cowperi, musc. origo 342.

- *scapulae*, musc. origo 433. insert. 499.

Eminentiae ossium 82.

Ενάρθρωσις 661. 663.

Επιγλωττίς 372.

Epiphysis 82. 87. eius connexionis modus cum ossibus 88. initio cartilaginea 89. medium distinctionis et mutatio in apophysin 90. vsus 91.

Epistropheus 398. eius corpus 399. processus 400-402. connexio 403.

Erectores penis et clitoridis, musc. origo 484.

Ethmoidale os, vid. *cribriforme os*.

Eustachii musc. 193.

Extensor capitis minor, musc. vid. *trachelio-mastoideus*.

- *communis* digitorum manus, musc. origo 516.

526. 535. insert. 580.

- *cubiti brevis*, musc. origo 516. insert. 526.

Extensor cubiti longus, musc.

origo 499. 516. insert. 526.

- *digitorum pedis brevis*, musc. origo 636. insert. 654.

- - - *longus*, musc. origo 612. 618. insert. 654.

- *pollicis manus propria brevis*, musc. origo 535. insert. 580.

- - - *longus* ibid. ibid.

- - *pedis brevis*, musc. origo 636. insert. 652.

- - - *longus*, musc. origo 612. 618. insert. 652.

Extensores quatuor tibiae musc. insert. 600. 612.

Externus capitis musc. vid. *rectus lateralis*.

Extremitates scheleti inferiores 486. 582. earum vsus 583.

- - superiores 486. earum vsus 487.

F.

F*aciei foramina* 330.

- *ossa* 262. sqq. eorum dispositio 98.

Fascia lata, musc. origo 484. insert. 618.

Femoris ossa 585. eorum ossificatio et perfectio 586. caput 587. 588.

590.

I N D E X.

590. collum, 589 sq.
 pars maxima 592. ex-
 tremitas inferior 593.
 394. musculi 595. ra-
 ro luxantur 596. fre-
 quentius franguntur 597.
Fenestra cochleae s. for-
 amen rotundum 179.
 180.
Fenestra ovalis s. labyrin-
 thi vel foramen oua-
 le 179.
Fibrae 3. earum directio
 39. 40.
Fibula 613. eius ossifica-
 tio 614. extremitates
 615. 617. truncus 616.
 musculi 618. luxatio
 619.
Fistula lacrymalis quando
 insanabilis 250.
 - spiralis 376.
Fistulosu ossa : eorum ge-
 neratio 27. 32. fibra-
 rum directio 40. dif-
 ferentia a spongiolis
 36.
Flexor brevis digiti minimi
 pedis, musc. origo 648.
 insert. 654.
 - communis digitorum
 manus s. profundus s.
 perforans, musc. origo
 526. 535. insert. 580.
 - - - - sublimis s.
 perforatus musc. origo
 516. 526. 535. insert.
 580.

Flexor communis digitorum
 pedis brevis, s. perfora-
 tus, s. sublimis musc.
 origo 636. insert 654.
 - - - - longus s. per-
 forans, s. profundus
 musc. origo 612. in-
 sert. 654.
 - longus colli, musc. ori-
 go et insert. 432.
 - pollicis manus brevis,
 musc. vid. hypothenar
 manus.
 - - - longus, musc.
 origo 535. insert. 580.
 - pollicis pedis brevis,
 musc. origo 641. insert.
 653.
 - - - longus, musc.
 origo 612. 618. insert.
 652. 654.
Foramina ossium, vid. ossa
 in specie.
Folii musculus 162. 193.
Fons pulsabilis, 1. fontanel-
 la 124. eius ossificatio
 125. laesio 129. pul-
 satio non percepta num
 signum sit foetus mor-
 tui ibid.
Fossa pituitaria, vid. sella
 Turcica.
Frontalis musc. origo et
 insert. 119.
Frontales sinus III. eo-
 rum usus 112.
Frontis os 101. 105. eius
 ossificatio 106. bifidum
 B b 2 est

I N D E X.

est in infantibus 107.
 125. crassities et magnitudo 108. extensio 109. 110. superficies 110. 113. connexio 114. foramina 115. eminentia vel impressio pro trochlea 116. observationes de illo 120.

G

Gastrocnemius, musc. origo 595. insert. vid. tendo Achillis.

Gemini musc. origo 484. insert. 595.

Genae ossa, vid. iugalia.

Genarum vulnera 297.

Genio glossus, musc. origo 342. insert. 370.

- **hyoides**, musc. origo 342. insert. 370.

Gibbosi ob malam pectoris configurationem anhelosi fiunt 449. 464.

Gibbus, eiusque species 436.

Γιγλυμος 669 sq.

Glandulae muciparae 77. earum definitio 78. positus et magnitudo 79.

Glene, γλήνη, γληνοειδής 76.

Glossa-epiglotticus, musc. origo et insert. 370.

Glossa-mylo-pharyngeus, musc. vid. mylo-glossus.

Glutaeus maximus, musc. origo 431. 435. 484. insert. 595.

- **medius**, origo 484. insert. 595.

Glutaeus minimus origo 484. insert. 595.

Γόμφωσις 674. 676.

Gracilis, musc. origo 484. insert. 612.

Γραφοειδής processus, vid. styloides processus.

Gutturiformis cartilago 375.

Gutturium 375.

H

Hamatum os 541. 551. eius ossificatio 542.

Harmonia 258. 674. etiam ad futuras spurias referatur 675.

Hiatus rhomboides, vid. fontanella.

Humeri os 509. 510. eius ossificatio et perfectio 511. connexio et caput 512. 513. truncus 514. extremitas inferior 515. musculi 516. luxatio 517.

Humerus differt ab osse humeri 509.

Hyo-epiglotticus, musc. vid.

Glossa-epiglotticus.

Hyoides os 366. frusta eius in statu imperfecto 367. corpus ibid. cornua 367. 368. musculi 370.

Hyo-pharyngeus, musc. origo et insertio 370.

Hyo-thyreoides, musc. origo 370. insert. 377.

Hypo-

I N D E X.

Hypothenar manus, musc.
origo 553. 502. insert.
580.
- *minimi digiti* manus,
vid. *abductor* eiusdem.

I.

Iliacus externus musc. vid.
pyramidalis.

- *internus*. origo 484.
insert. 595.

Ili ossa 469. eorum su-
perficies et crassities 470.
apophyses 671. margi-
nes et tubera 672 sq.

Incisivus musc. origo 279.

Incus 187.

Indicator, musc. origo 526.
insert. 580.

Infrascapularis f. *subscapu-*
laris superficies 497.

- musc. origo 499. in-
sert. 516.

Infraspinata cavitas 497.

Infraspinatus musc. origo
499. insert. 516.

Innominata ossa 465. 466.
469. eorum ossificatio
et compositio 467. mu-
tatio et perfectio 468.
musculi 484.

Intercostales musc. 463.

Interossei manus, musc. ori-
go et insert. 562.

- *pedis* musc. origo et
insert. 648.

Interspinales colli musc. 434

Intertransversales colli
musc. 433.

- *lumborum* ibid.

Intervertebrales *Douglasii*
musc. 432.

Intestinorum procidentia an
per foraminis ovalis hia-
tum fieri possit 485.

Ischia ossa 475. eorum di-
rectio et tubera 476.
connexio et margines
477. 478. superficies
479. acetabulum 480.
foramina ovalia 482.

Ischii incisura 478.

Iugalia ossa 264. 290. eo-
rum corpora 291. apo-
phytes 292. 293. con-
iunctio 293. utilitas 294.
foramina 295. musculi
296.

Iugalis cavitas 292. eius
usus 294.

Iugula f. *iugularia* ossa, vid.
claviculae.

Iugulum 443.

L.

Labyrinthus auris 196.

eius ossificatio 197.
divisio 198. membrana
mucosa 210.

- *narium* 248.

Lacrymalia ossa 264. 305.
eorum superficies 306.
coniunctio 307. usus
308. perforatio in fistu-
la lacrymali 310.

Lambdoides futura 256. 677

Lamellae osseae 31. in im-
per-

I N D E X.

- perfectis ossibus distinctae 42. earum pori 46. diuissio a Gagliardi facta, et quid de illa sentiendum 49-54. cohaesio 42. coniunctio ex mente Gagliardi, et quid de illa statuendum 43-45. cur porosae ac peruiiae sint 46.
- corrugatae 50. 51.
 - peruiiae s. cribriformes 52.
 - reticulatae 53.
- Lamina* ensiformis 440. eius structura 445.
- spiralis cochleae 203.
- Lapidesactio* ossium 34.
- Latissimus* dorsi musc. origo 434. 435. 484. insert. 499. 516.
- Larynx* 371. eius compositio 372. cartilagineae 373-375. musculi 377.
- Lenticulare* os, vid. Pisiforme
- Leuatores* ani, musc. origo 484.
- costarum musc. origo 433. finis 463.
- Linguale* os vid. hyoides os.
- Liuidus* musc. origo 484. insert. 595.
- Longissimus* dorsi musc. origo 435. insert. 433. 463.
- Lumbricales* manus musc. insert. 580.
- pedis insert. 654.
- Lunare* s. lunatum os 541. 544.
- M.
- Malae* ossa vid. jugalia ossa.
- Malleoli* pedis 611.
- Malleus* 182. eius capitulum 183. collum 184. processus 184-186. musculi 193.
- Mammaria* vasa: num laesio eorum periculosa 449.
- Mammillaris* processus vid. mastoideus processus.
- Mandibula*, vid. maxilla inferior.
- Manubrium* sterni 440. eius finis 443.
- mallei, vid. malleus.
- Manus* 537. eius partes et figura 538.
- Massa* carnea 636.
- Masseter* musc. origo 221. 296. insert. 342.
- Mastoideus* processus 157.
- Maxilla* inferior 331. eius structura 332. alueoli 333. margo 335. processus 336-339. coniunctio 336. utilitas 341. musculi 342. luxatio quomodo reponenda 342.
- superior 263. eius compositio 264.
- Maxillaria* ossa proprie dicta 265. illorum structura

I N D E X.

perfcies externa 266 -
 268. quae orbitae par-
 tera inferiorem consti-
 tuit 270. alveoli 269.
 superficies superior 270.
 interna 271. posterior
 272. inferior 273. con-
 nexio 274. vfus 278.
 279. mufculi 279.
Maxillaris finuofitas vid.
 antrum Highmori.
Meatus auditorius externus
 163. 164. 212. eius ftru-
 ctura et vfus 213.
 - internus 156. 198. 205.
 eius fundus 205. 206.
Mediastini abfcelfus diffi-
 cillime fanatur 449.
Meditullium 104.
Medulla 63. quibus par-
 tibus et cavitatibus con-
 tineatur 62. 64.
Membrana tympani eius-
 que refonitus 172. 214.
 fqq. differt a tympano
 164. diftinguit mea-
 tum offeum a tympano
 165. retinet fitum an-
 nuli 166. eius tensionis
 gradus varius 167. com-
 pofitio 168. 169. humo-
 re oleofa humectatur
 170. fpuria eius lamel-
 la 169. ruptura 220.
Metacarpus 554. eius os-
 fificatio et perfectio 555.
 offa, ex quibus conftat,
 eorumque ftructura 556-

561. articulatio 561.
 mufculi 562. luxatio
 563.
Metatarsus 643. eius os-
 fificatio 644. capitula
 645. corpora 647. mu-
 fculi 648.
Modiolus vid. nucleus.
Mucus articularis 80. eius
 debita temperies et vfus
 81.
Multangulum maius 541.
 548.
 - minus 541. 549.
Multiforme os, vid. fpheno-
 idale os.
Mylo-gloffus mufc. origo
 342. infert. 370.
Mylo-byoides mufc. origo
 347. infert. 370.
Mylo-pharyngaeus mufc.
 origo 342.
Myrtiformis mufc. origo
 342.

N.

N*ares*: earum vfus 324.
 325. fundus 282.
 cur in tenellis perpetuo
 ftillent 304. cur con-
 tufiones earum violen-
 tiores periculofae ibid.
 cur in lue venerea in-
 terdum confumantur ib.
Nafales canales: eorum
 formatio 306.
 - cavitates: earum figura
 et ftructura 322. for-
 matio 306. directio 299.
 B b 4 323.

INDEX.

323. septo diuiduntur
 322. a finibus ossibus au-
 gentur 324.
 - portiones 272. 284.
Nasalis processus superior
 267.
 - - inferior 273.
Nasi ossa f. nasalia 264. 298.
 eorum structura et usus
 299. 300. unionis mo-
 dus 300. 301. forami-
 nula 302. musculi 303.
Nasus osseus: eius figura
 et structura 322. diffor-
 mitas a destructione septi
 ossei 319.
Naviculare os manus 541.
 543.
 - - pedis 623. 637.
Nervus acusticus 208. eius
 portio dura et mollis
 208. 209. quomodo in
 auditu afficiatur 219.
Nodi quomodo in ossium
 superficiebus generen-
 tur 59.
Nucha 102.
Nuchae processus 133.
Nucleus 202. eius canalis
 conicus 203.
Nutritio ossium 55. in quo
 consistat 61. post accre-
 tionis tempus eueniens
 57.
 O.
Oblivus abdominis ad-
 icendens f. internus
 musc. origo 434. 484.
 insert. 447. 463.
 - - descendens f. externus
 musc. 463. 484.
 - capitis maior f. inferior
 musc. origo 279. 433.
 insert. 433.
 - - minor f. superior musc.
 origo 433. insert. 143.
 - mallei musc. vid. Folii
 musculus.
Obturator internus et ex-
 ternus, musc. origo 484.
 insert. 595.
Occipitis os 101. 102. 130.
 eius structura 131. su-
 perficies externa et cras-
 sities 132. 199. superfi-
 cies interna 137. con-
 nexio 136. eminentiae
 cruciformes earumque
 excauationes 137. 139.
 sinus longitudinalis 137.
 fossa pro illo 138. situs
 et usus processuum eius
 minorum spinosorum
 140. foramina 140.
 141. musculi 145. te-
 rebratio eius cur peri-
 culosa 144.
 Ὀλέκρانون 518. 522.
Olfactus sensus quando he-
 betior fiat 278. in qui-
 busnam animalibus ex-
 quisitior sit 280. in qui-
 bus obtusior 304.
Orbiculare os auris 188.
 - - manus, vid. piliforme.
 Orbi-

I N D E X.

Orbicularis musc. origo
279. 296. insert. 119.
Orbitae: earum figura et
compositio 321. portio-
nes fractae periculosa
120.

Orbitales fissurae 237. 238.
277. 295. qualia earum
vulnera periculosa 241.
Orbitalia foramina eorum-
que vsus 115. 117. 275.

Ossa: eorum diuisio 8. 9.
vsus 7. cognitio quo-
tuplex 12. genesis 25.
27. structura 28. 29.
formatio ex squamulis
lamellisque 29. sub-
stantiae solidae reparatio
in fracturis 58. firmi-
tas et infirmitas vnde 26.
qualitates 17. 18. quan-
titates 17. 20. differen-
tia ratione compositionis
et directionis fibrarum
36. an omnia initio sint
cartilaginea 27.

Osteogenia 22.

Osteologia in genere 5.
- corporis humani 5. 6.

Ozaena 250. 315. Drakii
methodus eam curandi
280.

P.

P*aedarthrocace*, morbus
80.

Palatinae portiones 282.

Palatina ossa 264. 281. eo-
rum diuisio in diuerfas

portiones 282. sqq. vsus
et coniunctio 286. fo-
ramina 287. musculi
288. corruptio in lue
venerea 289.

Palatinum foramen anti-
cum s. incisium 276.
posticum 287.

Palatinus s. palato-staphi-
linus musc. origo 288.

Palatum 326.

Palma manus 560.

Palmaris brevis, musc.
516.

- longus, musc. 562.

Palmula costarum 457.

Papyracea ossa vid. plana
ossa ethmoid.

Paracenthesis pectoris: cau-
telae circa illam 464.

Paragomphosis capitis foe-
tus 129.

Patella 598. eius figura et
substantia 599. super-
ficies 600. 601. vsus
602.

Pectinis ossa, vid. pubis ossa.

Pectoralis maior, musc. ori-
go 448. 463. 507. insert.
516.

- minor, musc. origo 463.
insert. 499.

Pectoris os, vid. sternum.

Pelvis formatio et vsus 483.

Periosteum 67. eius origo
et extensio 68. 69. sy-
nonyma 70. quatenam
partes a capite remotae

I N D E X.

- ad formationem eius
concurrent 71. con-
nexionis modus cum ossi-
bus 72. vsus 73.
- Peronaeus* anticus maior
musc. origo 618. insert.
648.
- minor musc. 618.
- posticus musc. origo
618. insert. 648.
- Pes* extremus 620. 621.
eius vsus 622. luxatio
et fractura 655.
- Petrificatio* lignorum 33.
- Petro-pharyngeus* musc.
origo 221.
- Petrosa* pars ossis tempo-
porum vid. temporum
ossa.
- Pisiforme* os 541. 546.
- Plana* ossa 247. eorum ge-
neratio 32. differentia
a spongiosis 36. lamel-
larum et fibrarum series
41.
- ethmoidalis 247.
- Planta* pedis 621. 643.
- Plantaris* musc. origo 595.
insert. 636.
- Pollex* manus 565. 573.
coniunctio et articulatio
574. motus et vsus
575. musculi 680.
- pedis 652. eius articu-
latio ibid. musculi 652
- Polyporum* generatio in fi-
nibus maxillaribus fre-
quens 280.
- Pomum* Adami 373.
- Popliteus* musc. origo 595.
insert. 612.
- Porta* labyrinthi 180.
- Postbrachiale*, vid. metacar-
pus.
- Poupartii* ligamenta 484.
- Processus*, productio, protu-
berantia vid. apophysis.
- Pronatio* manus 527. 573.
- Pronator* quadratus, musc.
origo 526. insert. 535.
- rotundus, musc. origo
516. insert. 535.
- Psoas* magnus, musc. origo
432. insert. 595.
- Pterygoideae* portiones 283.
- Pterygoidei* processus 230.
eorum diuisio 231. fi-
gura et vsus 232.
- Pterygoides* externus et in-
ternus, musc. origo 239.
insert. 342.
- Pterygo-pharyngeus* musc.
vid. spheno-pharyn-
gaeus musc.
- Pterygo-staphylinus* exter-
nus et internus musc.
origo et insert. 239.
- Pubis* ossa 474. eorum con-
nexio ibid. ossificatio
468. foramina ovalia
482.
- Pulli* formatio in ovo 24.
- Punctum* ossificationis 38.
- Pyramidalis* abdominis
musc. origo 483.
- nasi musc. origo 303.
- Pyra-

I N D E X.

Pyramidalis f. *Pyriformis*
 musc. origo 435. 484. insert. 595.

Q.

Q*uadratus* femoris musc.
 origo 484. insert. 594.

- *lumborum* musc. origo 484. insert. 433. 463.

- *maxillae inferioris* musc. origo 342.

Quadrilatera ossa, vid. *brachii* ossa.

R.

R*achitis* quales mutationes in ossibus producat 60.

Radius externus, musc. origo 516. 535. insert. 553. 562.

- *internus*, musc. origo 516. 526. insert. 562.

Radius 528. eius articulatione ibid. ossificatio 529. extremitates 530. 532. corpus 531. usus 535. musculi 534. 535.

Ramianus processus vid. *mallei* processus minimus.

Rectus abdominis musc. origo 484. insert. 448. 463.
 - *femoris* musc. origo 484
 - *lateralis capitis* musc. origo et insert. 433. 143.
 - *maior capitis anticus* musc. origo 432. insert. 143.

Rectus maior capitis posticus musc. origo 434. insert. 143.

- *minor anticus* musc. origo 432. insert. 143.

- *posticus* musc. origo 434. insert. 143.

Remus costarum 457.

Retractores auris, musc. 221.

Rhomboides musc. origo 434. insert. 499.

Riini foramen 171.

Rotatio 671. quando ad *didagdegwiv* orbicularem et laxam referenda 672. 673.

Rotundus maior musc. origo 499. insert. 516.

- *minor* musc. origo 499. insert. 516.

S.

S*acro-lumbaris* musc. origo 433. insert. 435. 463.

Sacrum os 420. eius natura in statu imperfecto et ossificatio 423. figura et structura in perfecto statu 421. diuersae denominationes 422. latera et connexio 424. 425. canalis osseus et foramina 426. usus 427. musculi 435. num in partu retrocedat 436.

Sagittalis futura 256. 677. non pro fissura habenda 120.

Sar-

I N D E X.

- Sartorius* musc. origo 484.
 insert. 612.
Scalae cochleae 204.
 - tympani ibid.
 - vestibuli ibid.
Scalenus musc. origo 463.
 507. insert. 433.
Scapulae 468. earum numerus et connexio ibid.
 situs et figura 489. ossificatio, perfectio 490.
 substantia 491. margines 492. anguli 493.
 collum eiusque cavitas superficialis 494. processus 495. 496. superficies 497. usus 498.
 musculi 499. fracturae ipsis contingentes 500
Skeleton 13. eiusque divisio 39.
 - artificiale 15. quomodo praeparetur 16.
 - femininum 94. eius differentia a virili ibid.
 - naturale 14.
 - vitile 94.
Scutiformis cartilago 373.
Sella Turcica 225. eius foraminula 235.
Semilunare os, vid. orbiculare os.
Semimembranosus musc. origo 484. insert. 612.
Semimeruosus musc. origo 484. insert. 612.
Semispinosus musc. origo 435. insert. 434.
Septum osseum 245.
Serratus anticus maior musc. origo 463. insert. 499.
 - minor, vid. pectoralis minor.
 - posticus inferior musc. origo 434. insert. 463.
 - superior ibid.
Sesamoidea ossa manus 577. eorum divisio et usus 578. situs 579. musculi 580.
 - pedis 653.
Sinciput 102.
Solaus musc. origo 612. insert. vid. tendo Achillis.
Solidi corporis principia constitutiva liquido animali inexistunt 35. et praexistunt in animalculo 23. 24.
Sphenoidale os 101. 222. partes eius in statu imperfecto 223. substantia et ossificatio 224. protuberantiae 226. corpus 227. processus 225. 228 sqq. connexio 233. foramina 234-236. musculi 239. de fissura eius observatio 240.
Sphenoidales sinus 227.
Spheno-maxillaris fissura 277.
 - palatina foramina 287.
 - pharyngaeus musc. origo 239.

Spin-

I N D E X.

Spinsteres ani musc. origo
431.

Spina dorsi 379. eius com-
positio 380. connexio
381. figura in recens
natis et adultis 382.
vsus 428. 381. musculi
432-434.

- bifida 436.

Spinalis colli musc. origo
433. insert. 434.

Splenius musc. origo 433.
434. insert. 143. 221.

Spongiosa ossa 36. eorum
generatio 27. 32. textu-
ra et lamellae 143. os-
sificatio 48. differentia
a planis et fistulosis 36.
- inferiora 311. 264. eo-
rum structura et superfi-
cies 312. situs et con-
nexio 313. vsus 314.
carie corrupta perfectam
sanationem non admit-
tunt 315.

- superiora 246. eorum
processus 246.

Squamosae conglutinatione-
nes 257.

Squamosa pars temporum
vid. temporum ossa.

Stapedis musculus 194.

Stapes 189.

Sterno-costales musc. vid.
triangulares sterni.

- hyoides musc. origo
448. 507. insert. 370.

- mastoideus musc. origo

448. 507. insert. 221.

- thyreoides musc. origo

448. insert. 377.

Sternum 439. eius figura
et partes 440. ossifica-
tio 441 442. foveae la-
terales pro articulatione
cum costis 444. extre-
mitas mucronata 446.
sq. vsus 447. musculi
448. fractura et depres-
sio periculosa 449. tre-
panatio ibid.

Sternutatio: eius causae et
vsus 309.

Stylo-glossus musc. origo
221.

- hyoides musc. origo 221.
insert. 370.

- pharyngaeus musc. ori-
go 221. duplicis in dexte-
ro latere observatio ib.

Styloides processus 158.

Subclavius musc. origo 507.
insert. 463.

Subcutaneus musc. origo
448. insert. 342.

Succus medullosus: eius
natura et receptaculum
62. secretionis modus
et vsus 66.

- osseus 32. in fracturis
saepius luxuriat 34. in
morbofis afflictionibus
alteratur 35.

Summus humerus 496.

Supercilia 110.

Superorbitales portiones
285. Su-

I N D E X.

Supinatio manus 527. 673.
Supinator brevis, musc.
 origo 516. 526. insert.
 535.
 - longus, musc. origo
 516. insert. 535.
Supraspinata cavitas 497.
Supraspinatus musc. origo
 499. insert. 516.
Surdi quomodo aliqualem
 sonum percipiant 220.
Surditatis verae et spuriae
 causae diuersae 220.
Suspensorium ligamentum,
 vid. teres ligamentum.
Suturae quid et quotupli-
 ces 255. 677. earum
 utilitas 261. communes
 258. verae 256. spu-
 riae 257. 258.
Σύνφυσις quid? 678.
Συνέσθλωσις quid? 659.
 674.
Σύνδεσις quid? 657.
Συνέστροφωσις quid? 679.
Συντένωσις quid? 682.
Συνύμενσις quid? 683.
Συνχόνθλωσις quid? 681.
Συσσάκνωσις quid? 680.

T.

T*alus* 623. 625. eius
 partes 626-631. ossi-
 ficatio 624.
Tarsus 620. 623. eius ossi-
 ficatio 624.
Tempora 102.
Temporales processus 226.
 eorum diuisio 228, 229.

Temporalis cavitas, vi-
 iugalis cavitas.
 - musculus: origo 22
 239. insert. 342.
Temporum ossa 101. 147.
 continent organa aud-
 tus 147. eorum situs
 connexio ibid. figura
 substantia et diuisio i
 statu perfecto et impe-
 fecto 148. musculi 22
 pars petrosa eiusque su-
 perficies 153. 154-155.
 pars squamosa s. mendo-
 sa 149. eiusdem stru-
 ctura in foetu et adult
 150. externa superficiei
 transversalis eminentia
 et cavitas glenoidea 151.
 interna, eiusque cur-
 parte petrosa nexus 152.
 num ipsi adplicari possu-
 terebra 220.
Tendines diaphragmatis 432.
Tendo Achillis insertio
 636.
Teres ligamentum 481.
 583.
 - musc. 377.
 - - maior, vid. rotun-
 dus maior musc.
 - - minor, vid. rotun-
 dus minor.
Thenar pollicis manus, vid.
 abductor pollicis manus.
 - - pedis, vid. abdu-
 ctor pollicis pedis.
Thorax 437. denomina-
 tionis

I N D E X.

- tionis et compositionis illius ratio 438. figurae eius mutatio sub respiratione 453. vtilitas 462.
- Thyreο-arythaenoides*, musc. origo et insert. 377.
- Thyreο-pharyngaeus*, musc. 377.
- Tibia* 604. eius ossificatio et perfectio 605. extremitates 606. 610. ligamenta 608. truncus eiusque spinae et latera 609. musculi 612.
- Tibialis* anticus musc. origo 612. insert. 637. 639. 648.
- posticus musc. origo 612. insert. 642.
- Trachelio-mastloideus*, musc. origo 433. insert. 221.
- Transuersalis* abdominis musc. origo 433. 484. insert. 647.
- capitis vid. rectus lateralis capitis.
 - ceruicis musc. 433.
 - pedis musc. 648.
- Trapezium*, vid. multangulum maius.
- Trapezius* musc. origo 143. insert. 499. 507.
- Trapezoides*, vid. multangulum minus.
- Tremuli motus* communicatio cum labyrintho, et quid ad eam requiratur 217. 218. propagatio ad sensorium commune 219.
- Triangulares* sterni, musc. origo 447. 448.
- Triangularis* lumborum musc. vid. quadratus lumborum.
- maxillae infer. musc. origo 342.
- Triceps* brachialis, musc. insert. 526.
- femoris, musc. origo 484. insert. 595.
- Triquetra* ossa cranii, vid. Wormiana ossicula.
- Triquetrum* os manus 541. 545.
- Trochanteres* processus 591
- Τροχοειδὴς*, vid. rotatio.
- Truncus* sceleti 378.
- Tuba* Eustachii 174. obstructa soni perceptionem impedit, et naturae nisibus repurgatur 220.
- Tubuli* medullares, vid. vesiculae medullares.
- Tunica* Schneideriana 227.
- Turbinata* ossa, vid. Spongiosa ossa.
- Tympanum* 173. eius periosteum 168. latera 173. diuisio in tres partes 174-180. 195.
- V.
- V**asa arteriosa saepius lapidescunt 34.
- Vastus* externus, musc. 595.
- Vastus*

I N D E X.

- Vastus* internus, musc. ibid.
Veli palatini pars musculo-
 sa 288.
Venae ceruicales 330.
Vertebrae 382. earum ossi-
 ficatio 383. compositio 384
 structura 385. descriptio
 generalis 386. specialis 391
 corpora, iisdemque inter-
 iectae cartilaginee 387.
 processus 388. canalis os-
 sei formatio et vsus 389.
 coniunctio 390. luxatio,
 subluxatio et fractura
 quando periculosa 436.
 interdum numero va-
 riant ib.
 - *colli*: earum numerus,
 dispositio et distantia 392.
 processus 388. 393. 405-
 407.
 - *dorsi* 410. earum cor-
 pora 411. processus 388.
 412-414.
 - *lumborum* 415. earum
 corpora 388. 416. proces-
 sus 417-419.
 - *thoracis*, vid. *vertebrae*
dorsi.
Verticis ossa, vid. *bregmatis*
ossa.
Vesicalae medullares 63.
 communicatio earum in-
 ter se 65. origo 66.
Vespiforme os, vid. *Sphe-*
noidale os.
Vestibulum 198. 199.
Vlna 520. eius ossificatio
 ibid. extremitates et con-
 iunctio 521. 525 sqq. pro-
 cessus 522. sinus lateralis
 523. corpus, eiusque mar-
 gines 525. musculi 526.
Vlnaris externus musc. ori-
 go 516. 526. 535. insert.
 562.
 - internus musc. origo
 516. 526. insert. 553.
Vnciforme os, vid. *hamatum*.
Vnguis ossa, vid. *lacrymalia*
ossa.
Vomer 264. 316. diuersa
 eius in infantibus et adul-
 tis structura 317. margines
 318. est fundamentum se-
 pti ossei ibid.
 W.
Wormiana officula 259.
 eorum generationis
 modus 260.
 X.
Xiphoides cartilago 440.
 eius structura 446.
 musculi, qui ad illam vsque
 producantur, et vsus
 647.
 Y.
Ypsiloides os, vid. *hyoi-*
des os.
 Z.
Zona cochleae 203.
Zygomatica ossa, vid. *iuga-*
lia ossa.
Zygomatici musculi: ori-
 go 279. 296.
Zygomaticus processus 151.

- 2

(199)

C119





